

המערך הגסטרו-כירורגי Digestive Disease Institute

דף הסבר והוראות לבדיקת סיגמואידוסקופיה

סיגמואידוסקופיה הינה בדיקה של הקטע הסופי של המעי הגס, אורכו כ-50 ס"מ. הבדיקה נעשית באמצעות אנדוסקופ, שהיגו צינור ארוך וגמיש, המאפשר הסתכלות על דופן המעי ולקחת דגימות במידת הצורך.

הנחיות לקראת הבדיקה

- עליך להביא כל חומר אבחוני הקשור לבדיקה:
 - צילומים שונים - C.T., רנטגן, חוקן בריום.
 - בדיקות דם.
- במידה והינך נוטל תרופות נוגדות קרישה כגון: אספירין, פלוויקס או קומדין, עליך להפסיק ליטול את התרופה שבוע לפני הבדיקה אך ורק בתיאום עם הרופא המטפל.**
- תרופות המכילות ברזל, פחם או ביסמוט יש להפסיק שבוע ימים לפני הבדיקה.
- במידה והינך סובל מלחץ דם גבוה או ממחלות לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך כסדרן.
- חולי סוכרת: אין להזריק אינסולין או ליטול תרופות לסוכרת בבוקר הבדיקה, אך יש להביא את התרופות ואוכל.
- עליך לבוא לבדיקה עם מלווה.** נהיגה ברכב אסורה מספר שעות לאחר הבדיקה, עקב מתן תרופות הפוגעות בערניות. **הנעה ללא מלווה תגרום לאי ביצוע הבדיקה.**

החכמה

- על מנת לבצע את הבדיקה יש לנקות את החלק הסופי של המעי הגס באמצעות חוקן מקדים. במידה והמעי אינו נקי מספיק לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה.
- יש לעשות שני חוקני פליט אנמה **כשעתיים** לפני הבדיקה לפי ההנחיות הבאות:
- הסר את מכסה הפיה ומרח אותה במעט וזלין.
 - הכנס בעדינות לפי הטבעת את החוקן וסחט את תוכן החומר פנימה.
 - המתן לפחות עשר דקות עד שתתנקה בשירותים.
 - לאחר 15 דקות יש לבצע, על פי אותן ההנחיות, את החוקן השני.

לאחר הבדיקה

- לאחר הבדיקה תוכל להתלבש ולהמתין מספר דקות להשגחה.
- יתכן ותרגיש תחושת לחץ בבטן המלווה באי נוחות, עקב אויר שהוכנס לחלל המעי במהלך הבדיקה, על כן יש לשחרר גזים.
- בתום ההשגחה תקבל תוצאות הבדיקה והנחיות להמשך טיפול על ידי הרופא המטפל.

אם מסיבה כל שהיא אין באפשרותך להגיע לבדיקה, **חובה** עליך לבטל את התור על מנת לאפשר הקדמת תור למטופל אחר.

לברורים: 02-6666116
בהצלחה ובריאות שלמה!
צוות מכון גסטרו-כירורגי

