

例：プレタール OD錠 100mg 1 回 0.5 錠 ⇒ プレタール OD錠 50mg 1 回 1 錠
 アムロジピン OD錠 2.5mg 1 回 2 錠 ⇒アムロジピン OD錠 5mg 1 回 1 錠
 マイザー軟膏 5g 2 本 ⇒ マイザー軟膏 10g 1 本（全量が変わらない場合に限る）

④ 用法

外用薬において、薬歴や患者面談から、医師の口頭指示による使用部位が明確である場合、使用部位の追記を可とする。

⑤ 一包化調剤

「患者希望あるいはアドヒアランス不良で一包化による服薬アドヒアランスの向上が見込まれる」等の理由がある場合、各薬剤の安定性を考慮のうえで、一包化調剤を可とする。ただし、患者負担額について十分な説明を行い、同意を得ること。なお、上記以外の理由や、複数診療科にまたがる一包化調剤は対象外とする。

⑥ 処方日数

薬歴上、継続処方されている処方薬に残薬がある場合、処方日数の短縮（外用剤の本数減少も含む）を可とする。ただし、「短縮」ではなく「削除（0 日分など）」は対象外とする。なお、服薬アドヒアランスが投与量に影響を及ぼす等、残薬内容から医師への情報提供が必要な場合は、その都度、必ず疑義照会を行う。

3. プロトコル適用時の報告対象とする項目と連絡方法

報告不要の項目：①銘柄、②剤形、③規格

報告対象とする項目：④用法、⑤一包化、⑥処方日数

「Dr.JOY」で連携している薬局	薬業連携→院外処方箋の問い合わせ簡素化プロ トコル報告書 を利用して報告
「Dr.JOY」で連携していない薬局	FAX で 088-880-2456 に送信

4. 保険調剤薬局からの報告期限

翌営業日の午前 9：00 までとする。

2026 年 4 月 1 日（第 1 版）

●運用開始：2026 年 5 月 11 日

【問い合わせ先】

高知大学医学部附属病院薬剤部

TEL：088-866-5811

FAX：088-880-2456