



問題.1

88.9%


関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で正しい方法はどれか。




1. 肩甲帯屈曲




2. 肩屈曲



3. 肩外旋



4. 肘屈曲




5. 前腕回外

問題.2

38.9%

Danielsらの徒手筋力テストを図に示す。


段階5の抵抗を加える位置が正しいのはどれか。2つ選べ。




1. 肩甲骨下制と内転




2. 肩関節外旋



3. 肘関節伸展



4. 手関節背屈



5. 母指 MP 関節屈曲

← 対象者の運動方向

← 検査者の抵抗を加える方向

問題.3

77.8%

Daniels らの徒手筋力テスト（足関節底屈の検査）を図に示す。正しいのはどれか。



図 1




図 2




図 3

1. 図1で完全な底屈運動ができるが抵抗に耐えられなければ段階2である。
2. 図1で完全な底屈運動ができて最大抵抗に負けずに保てれば段階3である。
3. 図2で疲れなしに完全な底屈運動が1回行えれば段階3である。
4. 図2で完全な底屈運動が20回行えれば段階5である。
5. 図3は腓腹筋単独のテスト肢位である。

問題.4

97.2%

右股関節の可動域を表に示す。
予想される歩行時の特徴はどれか。

部 位	運動方向	他動可動域
股(右)	屈 曲	90 度
	伸 展	－15 度
	外 転	0 度
	内 転	15 度

- 1. 左Trendelenburg 徴候
- 2. 上肢の振り幅の増加
- 3. 左の歩幅の減少
- 4. 腰椎後弯
- 5. 右鶏歩

問題.5

46.3%

反射検査の刺激部位で正しいのはどれか。




1. 掌オトガイ反射




2. 把握反射



3. Babinski 反射



4. Chaddock 反射



5. Oppenheim 反射

問題.6

51.9%

6歳の男児。1か月前から左足部痛を訴えた。エックス線写真を別に示す。
最も考えられるのはどれか。



1. Sever 病
2. 舟状骨骨折
3. Freiberg 病
4. 足根骨癒合症
5. 第1Köhler 病

問題.7

94.4%

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。

評価の組合せで正しいのはどれか。



上 肢



手 指




下 肢

1. 上肢Ⅳ－手指Ⅳ－下肢Ⅳ
2. 上肢Ⅳ－手指Ⅴ－下肢Ⅳ
3. 上肢Ⅳ－手指Ⅳ－下肢Ⅴ
4. 上肢Ⅴ－手指Ⅴ－下肢Ⅳ
5. 上肢Ⅴ－手指Ⅴ－下肢Ⅴ

問題.8

88.9%

正常な胸部エックス線写真を別に示す。
番号と解剖学的名称の組合せで正しいのはどれか。




1. ①———肺静脈
2. ②———肋骨
3. ③———下行大動脈
4. ④———気管支
5. ⑤———左房縁

問題.9

78.7%

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像Aと水平断像Bとを別に示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。

この患者にみられる所見はどれか。




1. 左下腿内側の感覚障害
2. 左足部の感覚障害
3. 左大腿四頭筋の筋力低下
4. 右下腿外側の感覚障害
5. 右長母指伸筋の筋力低下

問題.10

35.2%

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。



1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

問題.11

93.5%


65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS<Japan comascale> I-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理（リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく）を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1. ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。
2. ベッドアップ前、安静時SpO₂が85%であったので実施する。
3. ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。
4. ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。
5. ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHg から170 mmHg に上昇したので中止する。

問題.12

55.6%

65歳の女性。慢性心不全。自宅でめまいと失神発作とを認めたため来院した。来院時の心電図を別に示す。
この患者にみられるのはどれか。




10mm/mV 25mm/s

1. 洞性頻脈
2. 心室頻拍
3. 心室期外収縮
4. I度房室ブロック
5. III度房室ブロック

問題.13

65.7%

他の筋への影響を最小限にしてハムストリングスの伸張運動を行う場合、適切でないのはどれか。



問題.14

88.9%

図のようなハンドリングを実施することで運動発達促進効果として期待されるのはどれか。



1. Galant 反射の抑制
2. 下肢のキッキング促進
3. 正中位指向の促進
4. 体幹伸展筋の促進
5. 頭部回旋運動の促進

問題.15

71.3%

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。

理学療法で適切なのはどれか。

1. 車椅子操作の練習
2. 下肢の漸増抵抗運動
3. 両松葉杖での歩行練習
4. 感覚再教育によるバランス練習
5. プラスチックAFOを装着した歩行練習

問題.16

76.9%

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。

Frankel分類はどれか。

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

問題.17

54.6%

80歳の男性。胸部CTを別に示す。
この患者で予想されるのはどれか。




1. 肥満
2. 残気量の低下
3. 一秒率の低下
4. 気道抵抗の低下
5. 肺コンプライアンスの低下

問題.18

73.1%

右外側肺底区の痰に対する体位排痰法（体位ドレナージ）で最も適切な体位はどれか。



問題.19

12.0%

24歳の女性。2日前に室内での火災に巻き込まれ救急搬送された。35 %の範囲の熱傷と診断され入院中。意識は清明。顔面から前頸部も受傷し煤のような色の痰がでる。肩甲帯から上腕にかけては植皮が必要な状態。骨盤と下肢とに傷害はみられない。

この時期の理学療法として適切なのはどれか。

1. 患部局所の浮腫に対する弾性包帯による持続圧迫
2. 下肢に対する80 % MVC での筋力増強
3. 背臥位での持続的な頸部伸展位の保持
4. 尖足予防のための夜間装具の装着
5. squeezing による排痰

問題.20

64.8%

46歳の男性。健康診断で身長170 cm、体重75 kg、BMI 26.0、腹囲88 cmであった。運動習慣に関するアンケートで以下のように回答した。

この段階の対応として最も適切なのはどれか。

あなたは現在1回30分以上の運動を週2回以上実施していますか？	
はい	☐ いいえ
あなたは定期的でなくても健康のために運動を行っていますか？	
はい	☐ いいえ
あなたは今後健康のために運動を始めるつもりはありますか？	
☐ はい	☐ いいえ

1. 仲間づくりを促し、周囲からのサポートを受けやすくする。
2. 具体的な目標を提示し、運動を継続するための動機づけを図る。
3. 達成感や楽しみが感じられることなど運動習慣の意味を認識させる。
4. 運動不足の害や生活習慣病に関する知識を与え、運動への関心を高める。
5. 実行可能で無理のない運動から開始し、成功体験を積めるように工夫する。

問題.21

88.0%

関節可動域測定時の足部の内転の基本軸はどれか。

1. 第1中足骨の中央線
2. 第1中足骨と第2中足骨との間の中央線
3. 第2中足骨の中央線
4. 第2中足骨と第3中足骨との間の中央線
5. 第3中足骨の中央線

問題.22

62.0%

筋とその短縮の有無を調べる検査との組合せで正しいのはどれか。

1. 腸腰筋————Speed テスト
2. 縫工筋————SLR テスト
3. 大腿直筋————Thomas テスト
4. 大腿筋膜張筋————Ober テスト
5. ハムストリングス————Thompson テスト

問題.23

72.2%

健常者で最も歩行率が大きいのはどれか。

1. 5歳 2. 10歳 3. 20歳 4. 40歳 5. 80歳

問題.24

96.3%

加齢に伴う生理的变化について正しいのはどれか。

1. 胸腺が肥大する。
2. 筋の収縮速度が速くなる。
3. 視覚の明順応時間は変化しない。
4. 筋量は下肢より上肢の方が減少する。
5. 低音域より高音域が聞こえにくくなる。

問題.25

78.7%

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1. 内反尖足の予防
2. 立位感覚の向上
3. 覚醒レベルの向上
4. 体幹筋筋力の維持
5. 膝関節伸展筋の痙縮抑制

問題.26

72.2%

左半側空間無視の治療法として適切でないのはどれか。

1. 視覚探索練習
2. 体幹の右への回旋
3. プリズム適応療法
4. 後頸部経皮的通電刺激
5. カロリック刺激<Caloric stimulation>

問題.27

26.9%

伝導失語の言語的特徴はどれか。

1. ジャーゴン
2. 音韻性錯語
3. 非流暢性発話
4. 重度な理解障害
5. 良好な復唱機能

問題.28

45.4%

注意障害で、料理中にかかってきた電話に気付くことができないという現象が認められるのはどれか。

1. 注意の選択性障害
2. 注意の持続性障害
3. 注意の転換性障害
4. 注意の配分性障害
5. 方向性の注意障害

問題.29

95.4%

Parkinson 病のHoehn&Yahr の重症度分類ステージで適切なのはどれか。

1. ステージ I では両側の機能障害がみられる。
2. ステージ II では姿勢反射障害がみられる。
3. ステージ III では機能障害の左右差が顕著となってくる。
4. ステージ IV では日常生活に制限があり転倒しやすい。
5. ステージ V では日常生活に制限が大きいが手すり歩行は可能である。

問題.30

53.7%

四肢遠位部の筋力低下を特徴とするのはどれか。

1. 肢帯型筋ジストロフィー
2. 福山型筋ジストロフィー
3. 筋強直性ジストロフィー
4. Duchenne型筋ジストロフィー
5. 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

問題.31

43.5%

Guillain-Barré 症候群でみられにくいのはどれか。

1. 誤嚥
2. 運動時痛
3. 温痛覚脱失
4. 起立性低血圧
5. 拘束性換気障害

問題.32

31.5%

末梢性めまいに対する理学療法で適切なのはどれか。

1. めまいを生じないよう服薬後に運動療法を行う。
2. 椎骨脳底動脈循環不全に準じた運動療法を行う。
3. Ménière病にはEpley法が有効である。
4. 回復期には注視眼振が出現しやすいので固視を促す運動を行う。
5. 寝返りや振り向き動作などによる回転刺激で前庭代償を促す。

問題.33

96.3%

脊髄損傷患者（第5頸髄節まで機能残存）が可能な動作はどれか。2つ選べ。

1. 肩関節外転
2. 肘関節伸展
3. 前腕回外
4. 手関節背屈
5. 指伸展

問題.34

71.3%

関節リウマチに合併しやすいのはどれか。

1. 内反足
2. 脊椎分離症
3. Heberden結節
4. Dupuytren 拘縮
5. 指伸筋腱皮下断裂

問題.35

69.4%

遠城寺式乳幼児分析的発達検査において、つたい歩きをする時期に可能なのはどれか。

1. 2語言える。
2. ボールを前に蹴る。
3. まねて直線を引く。
4. 積み木を2つ重ねる。
5. コップを自分で持って飲む。

問題.36

96.3%

脳性麻痺の痙直型両麻痺で生じやすい肢位はどれか。

1. 踵足
2. 外反母趾
3. 股関節外転位
4. 股関節外旋位
5. クラウチング肢位

問題.37

58.3%

切断と断端長の計測部位との組合せで正しいのはどれか。

1. 上腕切断———上腕骨大結節から断端末
2. 前腕切断———肘頭から断端末
3. 大腿切断———坐骨結節から断端末
4. 膝関節離断———大転子から断端末
5. 下腿切断———膝蓋骨上縁から断端末

問題.38

89.8%

頸椎の可動性を最も制限するのはどれか。

1. SOMI 装具
2. ネックカラー
3. ハローベスト
4. Milwaukee装具
5. フィラデルフィアカラー

問題.39

85.2%


神経筋再教育について正しいのはどれか。

1. 随意運動を促通する。
2. 他動運動を用いることはない。
3. 骨関節障害には適用できない。
4. 意識がない状態でも適用できる。
5. 完全脱神経筋の治療として有効である。

問題.40

63.0%

極超短波治療の図を示す。a に対するbの強度はどれか。



1. 1/2 2. 1/4 3. 1/6 4. 1/8 5. 1/16

問題.41

85.2%

心筋梗塞の再発危険因子として誤っているのはどれか。

1. 加齢
2. 肥満
3. 高血圧
4. 身体活動量の低下
5. 高HDLコレステロール血症

問題.42

85.2%

呼吸機能検査で求められる値について正しいのはどれか。

1. %肺活量＝肺活量÷全肺気量
2. 肺活量＝予備吸気量＋予備呼気量
3. 1秒率＝予測値に対する1秒量の割合
4. 機能的残気量＝残気量＋予備吸気量
5. 最大吸気量＝予備吸気量＋1回換気量

問題.43

57.4%

血液透析中の慢性腎臓病＜CKD＞の生活指導で適切なのはどれか。

1. 有酸素運動を行う。
2. 蛋白質の摂取は制限しない。
3. カリウムの摂取は制限しない。
4. ナトリウムの摂取は制限しない。
5. シェント側の手の運動は禁忌である。

問題.44

82.4%

成人に対する喀痰の吸引について適切なのはどれか。

1. 理学療法士は行わない。
2. 吸引圧は最大で20 kPa とする。
3. 1回の吸引は20 秒以上かけて行う。
4. 吸引カテーテルは気管分岐部まで挿入する。
5. 吸引カテーテルは吸引圧をかけながら素早く挿入する。

問題.45

24.1%

ICFで身体構造・心身機能の第一評価点（小数点1桁）が示すのはどれか。

1. 障害の程度や大きさ
2. 阻害因子の有無
3. 障害された範囲
4. 時間的な経過
5. 実行状況

問題.46

76.9%

新しい運動を学習するときに患者の手続き記憶に変換される段階はどれか。

1. 患者に理想とする運動パターンを言葉で教示しているとき。
2. 患者に運動課題を提示しつつ説明しているとき。
3. 患者が運動を試行錯誤しているとき。
4. 患者が正しい運動パターンを反復練習しているとき。
5. 患者が実際の生活環境で実践しているとき。

問題.47

46.3%

地域包括ケアシステムで特に重視されるのはどれか。

1. 自助の軽減
2. 互助の推進
3. 共助の拡充
4. 要介護度の細分化
5. 国が主体の取り組み

問題.48

14.8%

我が国の産業衛生について正しいのはどれか。

1. 死亡災害は平成20年以降半減している。
2. メンタルヘルス不調による休職者の復職率は10 %程度である。
3. 4日以上休業事由で最も多いのは、転倒による死傷災害である。
4. 体調不良であるが出勤する＜presenteeism＞割合は諸外国に比べて少ない。
5. 職場における腰痛予防対策指針では重量物の扱いの具体的な記載はない。

問題.49

24.1%

介入研究に該当するのはどれか。

1. 特定の集団での継続的な治療の観察
2. 通常行われている治療の効果判定
3. 2群に分けた治療の前向き比較
4. 複数データによる横断的比較
5. 過去の治療成績間の比較

問題.50

12.0%

事故・過誤に関連した用語の説明で適切なものはどれか。

1. 有害事象とは生命に直結する事故である。
2. インシデントとは重大な事故の発生である。
3. コンプライアンスとは法令を逸脱する行為である。
4. アクシデントでは医療従事者の過誤の有無を問わない。
5. Heinrichの法則では重篤な事故の数は軽微な事故の数と反比例する。

問題.51

93.8%


内胚葉に由来するのはどれか。

1. 中枢神経
2. 腸管
3. 血管
4. 筋
5. 骨

問題.52

100%

手根骨を図に示す。矢印の部位はどれか。



1. 有鉤骨
2. 有頭骨
3. 舟状骨
4. 小菱形骨
5. 大菱形骨

問題.53

75.9%

脊髄について正しいのはどれか。

1. 下端は第5腰椎までである。
2. 後根は脊髄神経節をつくる。
3. 終糸は尾骨前面に付着する。
4. 中心管の周囲に白質が存在する。
5. 脊髄円錐は脳と脊髄の移行部である。

問題.54

96.9%

閉鎖神経に支配されるのはどれか。

1. 薄筋
2. 縫工筋
3. 半腱様筋
4. 半膜様筋
5. 大腿二頭筋長頭

問題.55

97.2%


痛覚の脊髄神経路で正しいのはどれか。

1. 薄束
2. 楔状束
3. 赤核脊髄路
4. 外側脊髄視床路
5. 外側皮質脊髄路

問題.56

-%

脳底における脳の動脈枝の模式図を示す。主な分布が後頭葉、側頭葉の内側面と下面である動脈はどれか。



1. ①
2. ②
3. ③
4. ④
5. ⑤

問題.57

59.3%

上大静脈と下大静脈とを結ぶ静脈はどれか。

1. 奇静脈
2. 腎静脈
3. 脾静脈
4. 鎖骨下静脈
5. 上腸管膜静脈

問題.58

96.9%

消化器系について正しいのはどれか。

1. 食道は気管の前方に位置する。
2. 胃体の下端部を胃底という。
3. 十二指腸は粘膜ヒダに富む。
4. 空腸に続いて回腸がある。
5. 横行結腸右端は下行結腸に連なる。

問題.59

90.6%

平衡聴覚器について正しいのはどれか。

1. 半規管は頭部の回転運動を感知する。
2. 半規管は蝸牛神経の支配を受ける。
3. 半規管にはコルチ器が存在する。
4. 蝸牛管は内リンパの流れが受容器の刺激となる。
5. 蝸牛管には耳石が存在する。

問題.60

75%

皮膚について誤っているのはどれか。

1. 立毛筋は横紋筋である。
2. 表皮には基底層が含まれる。
3. 真皮には感覚受容器が分布する。
4. エクリン腺は全身の皮膚に分布する。
5. 皮下組織は脂肪細胞で占められている。

問題.61

25%

破骨細胞について正しいのはどれか。

1. 骨小腔に存在する。
2. 骨芽細胞を破壊する。
3. 不動で活性が低下する。
4. 巨大な多核細胞である。
5. プロテオグリカンを合成する。

問題.62

37%

骨格筋の収縮について誤っているのはどれか。

1. 電気刺激を与えた場合に筋活動電位が収縮に先行して生じる。
2. 支配神経に単一刺激を加えて起こる収縮を単収縮という。
3. 単収縮が連続して起こると階段現象がみられる。
4. 刺激頻度を5～6Hzに上げると強縮が起こる。
5. 速筋は遅筋に比べ強縮を起こす刺激頻度の閾値が高い。

問題.63

100%

神経筋接合部の神経伝達物質はどれか。

1. ドパミン
2. セロトニン
3. アドレナリン
4. γ アミノ酪酸
5. アセチルコリン

問題.64

93.8%

運動時の変化について正しいのはどれか。

1. 脳の血流量が増加する。
2. 皮膚血流量が減少する。
3. 内臓血管の拡張が起こる。
4. 骨格筋の血管収縮が起こる。
5. 心臓への静脈還流量が増加する。

問題.65

96.9%

強制呼気時に働く筋はどれか。

1. 胸鎖乳突筋
2. 外肋間筋
3. 大胸筋
4. 横隔膜
5. 腹斜筋

問題.66

97.2%

胆汁について正しいのはどれか。

1. pHは酸性である。
2. 消化酵素が含まれる。
3. 胆細管から分泌される。
4. 総胆管から小腸内に排出される。
5. 小腸内の胆汁は大半が大腸で再吸収される。

問題.67

47.2%

体温について正しいのはどれか。

1. 甲状腺ホルモンは熱産生を減少させる。
2. 末梢血管収縮で熱放散が低下する。
3. 体温調節中枢は小脳にある。
4. 食物摂取により低下する。
5. 夜間睡眠時に上昇する。

問題.68

97.2%


排卵を誘発するのはどれか。

1. 黄体ホルモン上昇
2. オキシトシン上昇
3. 卵巣ホルモン低下
4. 黄体形成ホルモン上昇
5. 卵胞刺激ホルモン低下

問題.69

54.6%

図のような輪軸を利用して、力Fで18kgの物体を引き上げた（ひもの摩擦と重さは無視できるものとする）。ひもを引く最小限の力Fはどれか。ただし、100gの物体を引き上げるのに必要な力を1Nとする。



1. 20N 2. 60N 3. 180N 4. 540N 5. 1,620N

問題.70

61.1%

肩関節の外旋筋はどれか。

1. 肩甲下筋 2. 広背筋 3. 三角筋前部 4. 小円筋 5. 大胸筋

問題.71

40.6%

手について正しいのはどれか。

1. 側副靱帯はMP 関節屈曲で緊張する。
2. 母指のCM 関節は3度の自由度をもつ。
3. 手のアーチ構造は横アーチのみからなる。
4. 手掌の皮膚は手背の皮膚に比べ伸展性に富む。
5. 鉤形握りは母指と他の指の対立運動により可能となる。

問題.72

93.8%

足部縦アーチの保持に関与する筋・靱帯で正しいのはどれか。

1. 虫様筋
2. 後脛骨筋
3. 前距腓靱帯
4. 短母指伸筋
5. 浅横中足靱帯

問題.73

59.3%

顔面の筋の作用で正しいのはどれか。

1. 頬筋は頬壁を歯列に押し付ける。
2. 大頬骨筋は下唇を下制する。
3. オトガイ筋は口裂を閉じる。
4. 口輪筋は口角を挙上する。
5. 鼻根筋は鼻孔を広げる。

問題.74

-%

次の歩行周期で足関節が最も底屈位となるのはどれか。

1. 加速期
2. 足底接地
3. 立脚中期
4. 爪先離地
5. 遊脚中期

問題.75

33.3%

輸血時に移植片対宿主病が起こる可能性が最も高いのはどれか。

1. 血小板濃厚液
2. 新鮮血
3. 新鮮冷凍血漿
4. 赤血球濃厚液
5. 保存血

問題.76

48.1%

良性腫瘍と比較した悪性腫瘍の特徴はどれか。

1. 出血壊死が少ない。
2. 細胞の分化度が高い。
3. クロマチンが増加する。
4. 膨脹性発育がみられる。
5. 細胞質に対して核の占める割合が小さい。

問題.77

37.5%

心尖部の聴診で心室収縮期に持続する逆流性雑音を聴取するのはどれか。

1. 大動脈弁狭窄症
2. 心室中隔欠損症
3. 心房中隔欠損症
4. 肺動脈弁狭窄症
5. 僧帽弁狭窄症

問題.78

57.4%

転移・逆転移で適切なのはどれか。

1. 転移は逆転移を誘発する。
2. 陰性転移の解釈は避ける。
3. 逆転移は治療の阻害因子となる。
4. 逆転移は治療者の意識的反応である。
5. 心理治療の目標は陽性転移の出現である。

問題.79

93.8%

「自分が幼稚園に行っている間にお母さんがいなくなってしまう」と思いこみ、登園をしぶる心理はどれか。

1. 退行
2. 抑圧
3. 置き換え
4. 反動形成
5. 分離不安

問題.80

62%

遅延再生を含まないのはどれか。

1. リバーミード行動記憶検査<RBMT>
2. Mini Mental State Examination<MMSE>
3. 改訂長谷川式簡易知能評価スケール<HDS-R>
4. Rey Auditory Verbal Learning Test<RAVLT>
5. Raven's Colored Progressive Matrices<RCPM>

問題.81

56.3%

技法としてホームワーク<宿題>を用いるのはどれか。

1. 内観療法
2. 森田療法
3. 現存在分析
4. 認知行動療法
5. 精神分析療法

問題.82

93.5%

長期の安静臥床によって上昇するのはどれか。

1. 免疫能
2. 耐糖能
3. 静脈還流量
4. 尿中カルシウム
5. クレアチニン・クリアランス

問題.83

100%

Gerstmann 症候群に認められるのはどれか。

1. 健忘
2. 失算
3. 失構音
4. 遂行機能障害
5. 半側空間無視

問題.84

57.4%

Barthel Indexで正しいのはどれか。

1. 歩行には坂道歩行を含まない。
2. 100点であれば社会生活に支障はない。
3. トイレ動作にはトイレの出入りを含まない。
4. 食事動作は補助具を使用しない状態で評価する。
5. 車椅子からベッドへの移乗には車椅子操作は含まない。

問題.85

28.1%

赤血球沈降速度が低下するのはどれか。

1. 貧血
2. 肝硬変
3. 悪性腫瘍
4. 細菌感染
5. 播種性血管内凝固症候群<DIC>

問題.86

18.8%

食道静脈瘤について正しいのはどれか。

1. 食道の中下部に好発する。
2. 吐血はコーヒー残渣様である。
3. 門脈圧の低下が原因で形成される。
4. 治療は食道離断術が第一選択である。
5. 初期のものは内視鏡で観察すると赤色に見える。

問題.87

25%

アルコール性肝障害について正しいのはどれか。

1. アルコール性肝炎は自覚症状に乏しい。
2. アルコール性脂肪肝では腹痛がみられる。
3. アルコール積算飲酒量と肝障害の発症率は無関係である。
4. アルコール性肝硬変では断酒を続けても組織病変は正常化しない。
5. アルコール性肝硬変では肝細胞癌の発症率が健常者の3倍以上である。

問題.88

100%

心不全に特徴的な呼吸はどれか。

1. 下顎呼吸
2. 陥没呼吸
3. 奇異呼吸
4. 起座呼吸
5. 鼻翼呼吸

問題.89

59.4%

6～12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1. I ——— 階段で手すり使用
2. II ——— 装具なしで歩行
3. III ——— 不整地の歩行
4. IV ——— 通常の椅子で座位保持
5. V ——— 寝返り可能

問題.90

75%

福山型筋ジストロフィーについて正しいのはどれか。

1. 男児のみに発症する。
2. 初発症状は3歳前後でみられる。
3. 精神遅滞はDuchenne 型に比べて少ない。
4. 発症頻度はDuchenne 型に比べて少ない。
5. 15歳以降も歩行が可能であることが多い。

問題.91

93.8%

加齢による身体構成成分の変化において若年時と比べて体重比が増加するのはどれか。

1. 骨塩
2. 脂肪
3. 細胞外液
4. 細胞内液
5. 細胞性固形物

問題.92

87.5%

認知症をきたす疾患で脳外科的手術によって認知機能が改善する可能性があるのはどれか。2つ選べ。

1. Lewy小体型認知症
2. 進行性核上性麻痺
3. 慢性硬膜下血腫
4. Wernicke 脳症
5. 正常圧水頭症

問題.93

70.4%


頸椎後縦靱帯骨化症の症候で正しいのはどれか。

1. 鉛管様固縮
2. 間欠性跛行
3. 膀胱直腸障害
4. 下肢腱反射消失
5. Wright テスト陽性

問題.94

83.3%

突然の左不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後3時間の頭部MRIの拡散強調像を別に示す。
最も考えられるのはどれか。



1. 脳出血 2. 脳梗塞 3. 脳腫瘍 4. 脳動静脈瘻 5. くも膜下出血

問題.95

34.3%

病態とその治療薬の組合せで正しいのはどれか。

1. 関節リウマチ———メトトレキサート
2. ジスキネジア———L-dopa
3. 重症筋無力症———抗コリン薬
4. 前立腺肥大症———男性ホルモン
5. 消化管出血———アスピリン

問題.96

100%

病名と症状の組合せで正しいのはどれか。

1. 前頭側頭型認知症———脱抑制
2. 進行性核上性麻痺———取り繕い
3. 皮質基底核変性症———認知の変動
4. Lewy 小体型認知症———肢節運動失行
5. Alzheimer 型認知症———垂直性眼球運動障害

問題.97

40.6%

統合失調症の前駆期にみられるのはどれか。

1. 聴覚過敏 2. 奇異な妄想 3. 滅裂な思考 4. 感情の平板化 5. 緊張病症状候群

問題.98

25%

笑いなどの強い情動で突然に筋緊張が低下し脱力する。
このような症状がみられるのはどれか。

1. 欠神てんかん
2. 側頭葉てんかん
3. ナルコレプシー
4. 血管迷走神経失神
5. Jackson 型てんかん

問題.99

100%

見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1. 依存性パーソナリティ障害
2. 演技性パーソナリティ障害
3. 回避性パーソナリティ障害
4. 境界性パーソナリティ障害
5. 自己愛性パーソナリティ障害

問題.100

90.6%

全般的な知能に大きな低下はなく、文字を読めば分かるが書くことができない。このような症状がみられるのはどれか。

1. 学習障害
2. 行為障害
3. 広汎性発達障害
4. Tourette 症候群
5. 注意欠如・多動性障害

問題.1

76.9%

下肢長の計測結果を表に示す。関連性の高いテストはどれか。


	右	左
棘果長[cm]	77.5	76.0
転子果長[cm]	75.0	75.0

- 1. Patrick テスト
- 2. Buerger テスト
- 3. Gaenslen テスト
- 4. McMurray テスト
- 5. Posterior drawer テスト


問題.2

77.8%


関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で正しいのはどれか。




1. 股外転




2. 股外旋



3. 足背屈



4. 足部内がえし




5. 股屈曲

問題.3

53.7%

Danielsらの徒手筋力テストで各筋の筋力2のテストとして正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 前鋸筋



2. 菱形筋群



3. 僧帽筋下部線維



4. 僧帽筋上部線維




5. 僧帽筋中部線維

問題.4

84.3%

Danielsらの徒手筋力テストで股関節内転筋の段階3を測定する際、図のような代償動作がみられた。代償動作を生じさせている筋はどれか。




1. 腸骨筋 2. 梨状筋 3. 中殿筋 4. 大腿二頭筋 5. 内側広筋

問題.5

26.9%

身体計測を行った結果を図に示す。

標準型車椅子を作製するにあたり、車椅子基本寸法として正しいのはどれか。2つ選べ。なお、座面にクッションは入れないものとする。



1. 座幅は50 cm とする。
2. 座奥行きは41 cm とする。
3. バックサポート（バックレスト）高は46 cm とする。
4. アームサポート（アームレスト）高は18 cm とする。
5. フットサポート・シート間距離は30 cm とする。

問題.6


46.3%

40歳の男性。2週前から腰痛と右殿部から大腿前面にかけてのしびれが生じ、徐々に右下肢の筋力低下を自覚するようになってきた。

この患者に行う検査として適切なのはどれか。



1



2



3



4



5

← 検査者が加える
力の方

問題.7

87.0%


79歳の女性。脳卒中後の左片麻痺。プラスチックAFOを装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。左立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。歩容を改善するために有用な方法はどれか。

1. 外側フレアを付ける。
2. 足部のベルクロの固定を緩める。
3. 装具の高さを下 腿中央付近まで低くする。
4. 装具の中足指節関節部から遠位部を切除する。
5. 足関節部の固定性を強化（コリュゲーション）する。

問題.8

97.2%

つまずきやすさを主訴に来院した70歳の患者の頭部MRI のT1強調矢状断像を別に示す。この患者で主訴に関連のある症状はどれか。




1. 運動失調
2. 感覚障害
3. 視野障害
4. 前庭障害
5. 歩行失行

問題.9

81.5%

患者の鼻 (A) から目標 (B) に向かって患者の示指を動かしたときの水平面上の軌跡を図に示す。
この患者にみられる可能性が高いのはどれか。




1. 折りたたみナイフ現象
2. Romberg徴候陽性
3. はさみ脚歩行
4. 断綴性発語
5. 筋強剛

問題.10

70.4%

52歳の女性。関節リウマチ。発症して17年が経過している。手指関節に痛みを訴えており、図のような変形がみられる。

手指に対する最も適切な物理療法はどれか。




1. 超音波 2. 遠赤外線 3. 極超短波 4. パラフィン浴 5. ホットパック

問題.11

65.7%

35歳の男性。実業団の長距離選手だったが、ランニング中の交通事故で左脛骨中央部での下腿 切断となった。切断術後4週が経過し、左膝関節に軽度の側方不安定性と軽度の筋力低下があるものの、断端は成熟し皮膚の状態は良好となった。スポーツ復帰を念頭に義足を製作することとした。

最適なソケットはどれか。



問題.12

57.4%

35歳の男性。実業団の長距離選手だったが、ランニング中の交通事故で左脛骨中央部での下腿 切断となった。切断術後4週が経過し、左膝関節に軽度の側方不安定性と軽度の筋力低下があるものの、断端は成熟し皮膚の状態は良好となった。スポーツ復帰を念頭に義足を製作することとした。


義足での歩行練習開始後、義足側の立脚初期に過度の膝屈曲がみられた。原因として考えられるのはどれか。

1. 左股関節に伸展制限がある。
2. 義足足部の底屈制動が強すぎる。
3. 義足足部のtoe-out 角が大きすぎる。
4. ソケットの初期屈曲角が小さすぎる。
5. ソケットに対して足部が前方に位置しすぎている。

問題.13

23.1%

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査 <JDDST-R> における粗大運動発達の順序で正しいのはどれか。




1. A→B→C 2. A→C→B 3. B→A→C 4. B→C→A 5. C→B→A

問題.14

75.9%

10歳の男児。二分脊椎。杖歩行が可能であり歩行時の様子を図に示す。
予測される残存レベルはどれか。



1. 第10 胸髄 2. 第12胸髄 3. 第2腰髄 4. 第4腰髄 5. 第1仙髄

問題.15

88.9%

60歳の女性。体重50 kg。急性心筋梗塞発症後、回復期に心肺運動負荷試験を施行した。最高酸素摂取量は毎分890 mLであった。


この患者の代謝当量はどれか。

1. 約3METs
2. 約4METs
3. 約5METs
4. 約6METs
5. 約7METs

問題.16

0%

大動脈弁閉鎖不全の雑音を最も聴取しやすい部位はどれか。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.17

75.0%

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS <modified Ashworth scale>で段階2である。

右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1. 赤外線療法
2. ホットパック
3. 電気刺激療法
4. アキレス腱延長術
5. 経頭蓋磁気刺激法

問題.18

47.2%

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5～6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。

理学療法で適切なのはどれか。



1. 寒冷療法
2. 極超短波療法
3. トレッドミル歩行練習
4. PNF による最大抵抗運動
5. 弾性ストッキングによる圧迫療法

問題.19

44.4%

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線（A）と頭部造影MRI（B）とを別に示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食思不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。

この時期に適切な理学療法はどれか。



1. 嚥下練習
2. 下肢促通運動
3. 屋外での歩行運動
4. 軽打法による排痰
5. 漸増的な持久性運動

問題.20

62.0%

78歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅲ及び下肢Ⅳ。高次脳機能障害あり。要介護2。娘と2人暮らしであるが、日中、自宅で1人で過ごす時間があるため、回復期リハビリテーション病棟退院後、通所リハビリテーションを受けることとなった。

通所リハビリテーションの目標として優先順位が低いのはどれか。

1. 家事動作の自立
2. 着衣動作の自立
3. 歩行能力の改善
4. 排泄動作の自立
5. 立位保持能力の改善

問題.21

93.5%

前腕回外の関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）について、正しいのはどれか。

1. 基本肢位は手掌面が水平面にある肢位とする。
2. 参考可動域は手関節屈曲角度と同じである。
3. 最終域で肩関節内旋運動が出現する。
4. 最終域感は骨性である。
5. 基本軸は尺骨とする。

問題.22

15.7%

Danielsらの徒手筋力テストにおいて座位で筋力3を判定できるのはどれか。2つ選べ。

1. 大胸筋 2. 肩甲下筋 3. 上腕三頭筋 4. 縫工筋 5. 下腿三頭筋

問題.23

0%

廃用症候群で生じる関節拘縮と部位の組合せで正しいのはどれか。

1. 外転拘縮——肩関節
2. 内転拘縮——母指CM関節
3. 内旋拘縮——股関節
4. 伸展拘縮——膝関節
5. 背屈拘縮——足関節

問題.24

92.6%

脳卒中片麻痺の上肢に対するCI療法（constraint-induced movement therapy）で正しいのはどれか。

1. 非麻痺側上肢を拘束する。
2. 理学療法士の近位監視下で行う。
3. 疼痛が少しでもあれば適応とならない。
4. 他動的関節可動域運動を長時間行う方法である。
5. 患側手指がBrunnstrom法ステージⅡで適応となる。

問題.25

70.4%

SteinbrockerによるステージⅠの肩手症候群に対する理学療法として適切でないのはどれか。

1. 交代浴の実施
2. ホットパックの実施
3. 他動的伸張運動の実施
4. 自己による介助運動の指導
5. 臥床時の上肢ポジショニングの指導

問題.26

46.3%

局所性脳損傷と比べた場合のびまん性軸索損傷の特徴として正しいのはどれか。

1. 脳幹部の症状が出現しやすい。
2. 急性硬膜下血腫を合併しやすい。
3. 重度の感覚障害を合併しやすい。
4. 行動障害は早期に改善しやすい。
5. バランス障害は軽度であることが多い。

問題.27

88.9%

観念失行に関連する行為はどれか。

1. 検査者のキツネの指を模倣することができない。
2. 杖を持つときに上下を逆さまにして使おうとする。
3. 麻痺が重度でもそれを意識せずに立ち上がろうとする。
4. 歩行時、右に曲がるべきところで曲がらずに通り過ぎる。
5. 「右足を先に出して」と教示してもできないが、自然な歩行は可能。

問題.28

76.9%

すくみ足現象がみられるParkinson 病患者的の歩行練習を理学療法士の近位見守り下で実施した。このときの練習法で適切でないのはどれか。

1. 横歩き
2. 階段昇降
3. スラローム歩行
4. 歩隔を狭めた歩行
5. メトロノームの音を活用した歩行

問題.29

70.4%

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1. 脱髄性疾患である。
2. 午前中に症状が悪化する。
3. 複視を生じることは稀である。
4. 感染はクリーゼの誘発因子である。
5. 四肢遠位筋の筋力低下を生じやすい。

問題.30

65.7%

糖尿病性の多発神経障害で早期から異常がみられやすいのはどれか。

1. 膝蓋腱反射
2. 徒手筋力検査
3. 内果の振動覚
4. 関節可動域検査
5. Timed Up and Go Test<TUG>

問題.31

79.6%

骨粗鬆症性骨折が最も起こりやすいのはどれか。

1. 頸椎
2. 鎖骨
3. 尺骨
4. 橈骨
5. 距骨

問題.32

96.3%

頸椎の椎間孔圧迫試験はどれか。

1. Adson テスト
2. Allen テスト
3. Morley テスト
4. Spurling テスト
5. Wright テスト

問題.33

73.1%

肘部管症候群の所見で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 小指球の筋萎縮
2. 示指のしびれ感
3. Tinel徴候陰性
4. Froment 徴候陽性
5. Phalen テスト陽性

問題.34

48.1%

健常人における椅子座位からの立ち上がり動作の運動学的な特徴で正しいのはどれか。

1. 体幹前傾後に座圧中心位置は後方へ変位する。
2. 離殿までの身体重心の前方移動は膝の屈曲によって起こる。
3. 体重心位置の上方への移動は前方のおよそ2倍である。
4. 体重心位置の方向制御には二関節筋が関与している。
5. 立位になる直前に足圧中心はいったん大きく後方へ変位する。

問題.35

38.0%

筋疲労時にみられるのはどれか。

1. 乳酸の減少
2. ADP濃度の増加
3. グリコーゲンの増加
4. 筋形質中のpHの上昇
5. 筋小胞体のカルシウムイオン取り込みの増加

問題.36

99.1%

異常歩行とその原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 酩酊歩行—————総腓骨神経麻痺
2. 小刻み歩行—————脊柱管狭窄症
3. 間欠性跛行—————Parkinson病
4. はさみ足歩行—————脳卒中片麻痺
5. Trendelenburg 歩行————変形性股関節症

問題.37

93.5%

スタティック・ストレッチングによる疼痛緩和について正しいのはどれか。

1. 高頻度に伸張する。
2. 素早く筋を伸張する。
3. 息を止めないで伸張する。
4. 強い痛みが生じるまで伸張する。
5. 伸張時間は5秒以内にとどめる。

問題.38

91.7%

水中運動療法の作用と効果について正しいのはどれか。

1. 静水圧は静脈還流を増大させる。
2. 動水圧の大きさは運動速度に反比例する。
3. 皮膚からの感覚フィードバックを受けにくい。
4. 水中での身体の熱喪失量は空気中に比べて小さい。
5. 静水圧は呼吸時の胸郭運動には抵抗として作用する。

問題.39

88.9%

車椅子からベッドへの移乗動作の練習で離殿を繰り返すのはどれか。

1. 恒常練習
2. 多様練習
3. 部分練習
4. 分散練習
5. ランダム練習

問題.40

50.9%

FIM の評定で修正自立となるのはどれか。2つ選べ。

1. 入れ歯の着脱が自立している。
2. シャワーのみで入浴が自立している。
3. スプーンを用いての食事が自立している。
4. パッドを用いての排尿管理が自立している。
5. 装具を装着して300 m 程度の歩行が自立している。

問題.41

54.6%

下肢装具とそのチェックアウト基準の組合せで正しいのはどれか。

1. 骨盤帯————腸骨稜頂点
2. 股継手————大転子上端
3. 膝継手————膝関節裂隙中央
4. 下腿 半月————腓骨頭上端
5. 足継手————内果下端

問題.42

98.1%

大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術（後方アプローチ）後、全荷重が可能な状態での理学療法で適切でないのはどれか。

1. 背臥位における膝伸展位での股関節外転運動
2. 腹臥位における他動的な股関節伸展運動
3. 座位における重錘を用いた大 腿四頭筋の筋力増強
4. 低い椅子から股関節内旋位での立ち上がり練習
5. 歩行器を用いた屋外歩行練習

問題.43

74.1%

小児の四肢切断の特徴として正しいのはどれか。

1. 後天性四肢切断は男児に比べ女児に多い。
2. 義手の装着開始時期は4歳ころが適切である。
3. 下腿切断では成長に伴い外反膝変形を生じやすい。
4. 後天性の切断における幻肢の頻度は成人より低い。
5. 骨肉腫が原因で切断になる頻度は増加傾向にある。

問題.44

50.0%

Down症候群の児の理学療法で適切なのはどれか。

1. 腹筋群の収縮を促す。
2. 不随意運動を抑制する。
3. 緊張性迷路反射を促通する。
4. シャフリングを移動手段とする。
5. 定頸後すぐに立位姿勢を経験させる。

問題.45

80.6%

心筋梗塞発症時にみられる左腕の痛みはどれか。

1. 深部痛 2. 表在痛 3. 関連痛 4. 内臓痛 5. 神経障害性疼痛

問題.46

93.5%

糖尿病患者における運動療法が禁忌となる合併症はどれか。

1. 高血圧症
2. 増殖性網膜症
3. 閉塞性動脈硬化症
4. ポリニューロパチー
5. ペースメーカー植込み後

問題.47

45.4%

長期臥床患者で測定値が1週以上前の状態を反映しているのはどれか。

1. AST 2. 単球 3. 血糖 4. 血清アルブミン 5. 尿中クレアチニン

問題.48

56.5%

介護保険制度の考え方として特に重視されているのはどれか。

1. 家族による介護
2. 公設介護施設の建設
3. 市町村による介護プランの作成
4. 入所型施設サービス
5. 予防とリハビリテーション

問題.49

93.5%

デザインの種類と説明の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. ユニバーサル————世界の基準に則った受注品
2. アクセシブル————異なる特性を持つ人でも使いやすい
3. バリアフリー————心身の障壁がない環境
4. レディーメイド————個別に作製した特注品
5. テーラーメイド————障害の特徴に応じた既製品

問題.50

82.4%

ある疾患に対する運動療法の再発予防効果を検討した研究のメタアナリシスを行った。その結果、運動療法を行った群の効果量は0.78（95%信頼区間：0.66～0.90）であった。

これに対する考察で正しいのはどれか。

1. 運動療法は生命予後を改善する。
2. 運動療法は再発予防効果がある。
3. 運動療法は再発危険因子を改善する。
4. このメタアナリシスは統計学的に有意でない。
5. 運動療法を行った78 %の人に再発予防効果がある。

問題.51

59.4%


膜性骨化で形成されるのはどれか。

1. 肋骨
2. 頭蓋骨
3. 上腕骨
4. 手根骨
5. 大腿骨

問題.52

62%

上腕骨遠位部の図を示す。
矢印の部位はどれか。



1. 肘頭窩
2. 外側上顆
3. 鈎状突起
4. 内側上顆
5. 上腕骨小頭

問題.53

100%

肩甲上神経に支配されるのはどれか。

1. 三角筋
2. 棘上筋
3. 小円筋
4. 大円筋
5. 肩甲下筋

問題.54

65.7%

腸骨翼の外面に付着する筋はどれか。

1. 大腰筋
2. 腸骨筋
3. 中殿筋
4. 梨状筋
5. 大腿筋膜張筋

問題.55

84.4%

大脳辺縁系を構成するのはどれか。2つ選べ。

1. 下垂体
2. 松果体
3. 線条体
4. 乳頭体
5. 扁桃体

問題.56

34.4%

後脊髄小脳路が通るのはどれか。

1. 大脳脚
2. 内側毛帯
3. 上小脳脚
4. 中小脳脚
5. 下小脳脚

問題.57

82.4%

リンパについて正しいのはどれか。

1. 乳び槽は横隔膜上部にある。
2. リンパ管には弁機構はない。
3. 胸管は右の静脈角に合流する。
4. リンパ節は毛細リンパ管にある。
5. 左上肢のリンパは左鎖骨下リンパ本幹に流れ込む。

問題.58

65.6%

泌尿器系について正しいのはどれか。

1. 尿は腎杯、腎盤、尿管の順に流れる。
2. 左腎動脈の方が右腎動脈より長い。
3. 左腎の方が右腎より低位にある。
4. 尿管は膀胱の前上面に開口する。
5. 腎は結腸の前方にある。

問題.59

37.5%

皮膚組織直下に触知できるのはどれか。

1. 軸椎の齒突起
2. 胸骨の頸切痕
3. 上腕骨の結節間溝
4. 尺骨の滑車切痕
5. 寛骨の寛骨臼切痕

問題.60

78.1%

核酸について誤っているのはどれか。

1. RNAにはチミンが含まれる。
2. RNAは1本鎖のポリヌクレオチドからなる。
3. コドンは3つの塩基からなる。
4. DNA にはシトシンが含まれる。
5. DNA は2本鎖のポリヌクレオチドからなる。

問題.61

78.1%

骨格筋の構造で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. A 帯を明帯という。
2. A 帯は筋収縮時に短縮する。
3. I 帯の中央部にZ 帯がある。
4. Z 帯は筋収縮時に伸長する。
5. Z 帯とZ 帯との間を筋節という。

問題.62

56.5%

単一筋線維が発生する張力の大きい順に並んでいるのはどれか。

1. タイプIIA > タイプIIB > タイプI
2. タイプIIB > タイプIIA > タイプI
3. タイプI > タイプIIA > タイプIIB
4. タイプIIA > タイプI > タイプIIB
5. タイプIIB > タイプI > タイプIIA

問題.63

63%

神経線維について正しいのはどれか。

1. A α 線維は錘外筋線維を支配する。
2. A β 線維は錘内筋線維を支配する。
3. A γ 線維は皮膚の痛覚を伝える。
4. A δ 線維は自律神経の節前線維である。
5. C 線維は圧覚を伝える。

問題.64

92.6%

眼球構成体の説明で正しいのはどれか。

1. 角膜は光信号を電気信号に変換する。
2. 虹彩は涙液を産生する。
3. 硝子体は網膜に入る光量を調整する。
4. 網膜は眼球の内圧を保つ。
5. 毛様体は水晶体の厚さを変化させる。

問題.65

100%

副交感神経の作用はどれか。

1. 瞳孔散大
2. 発汗促進
3. 心拍数減少
4. 気管支の拡張
5. 消化液の分泌抑制

問題.66

56.3%

呼吸循環調節系について正しいのはどれか。

1. 頸動脈小体は血中の酸素分圧の低下を感知する。
2. 頸動脈小体は総頸動脈と鎖骨下動脈の分岐部にある。
3. 大動脈弓の圧受容器からの求心路は舌咽神経である。
4. 頸動脈洞の圧受容器からの求心路は迷走神経である。
5. 血中の酸素分圧の低下は化学受容体を介して脊髄に伝えられる。

問題.67

82.4%

排尿機構で正しいのはどれか。

1. 排尿筋は平滑筋である。
2. 排尿の一次中枢は腰髄にある。
3. 外尿道括約筋は陰部神経活動で弛緩する。
4. 副交感神経を刺激すると排尿筋は弛緩する。
5. 排尿を我慢するときは副交感神経優位となる。

問題.68

84.4%

高齢者にみられる変化で正しいのはどれか。

1. 骨吸収は停止する。
2. 残気量は減少する。
3. 収縮期血圧は下降する。
4. 水晶体は蛋白変性する。
5. 皮膚の痛み閾値は低下する。

問題.69

61.1%

肩関節外転方向で上肢を挙上するとき最も関与が少ない筋はどれか。

1. 棘上筋
2. 三角筋
3. 前鋸筋
4. 僧帽筋
5. 肩甲挙筋

問題.70

75%

基本肢位からの股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 外転———薄筋
2. 外旋———半腱様筋
3. 屈曲———恥骨筋
4. 内旋———大殿筋
5. 内転———梨状筋

問題.71

75%

椅子座位姿勢で膝関節屈曲位から完全伸展したときにみられるのはどれか。

1. 外側側副靱帯の弛緩
2. 内側側副靱帯の弛緩
3. 前十字靱帯の緊張
4. 後十字靱帯の緊張
5. 半月板の後方移動

問題.72

93.5%

立位姿勢時の重心について正しいのはどれか。

1. 仙骨の後方にある。
2. 閉眼すると後方に移動する。
3. 小児は相対的に成人より足底に近い。
4. 重心線は膝関節中心の後方1～2cm を通る。
5. 重心動揺面積は老年期には加齢に伴い増大する。

問題.73

21.9%

エネルギー代謝率の計算式で正しいのはどれか。

1. 内的仕事量 ÷ 全仕事量
2. 基礎代謝量 ÷ 基準体表面積
3. 労作代謝量 ÷ 基礎代謝量
4. 作業時代謝量 ÷ 安静時代謝量
5. 作業時エネルギー消費量 ÷ 安静時エネルギー消費量

問題.74

95.4%

運動学習における結果の知識<KR>の提示について正しいのはどれか。

1. 難しい課題では1試行ごとに提示すると学習効率が低下する。
2. 運動の誤差修正を行えるようになっても継続する必要がある。
3. 成人では学習パフォーマンスを向上させない。
4. 誤りの大きさを提示すると有効である。
5. 動機付けには効果がない。

問題.75

97.2%

急性炎症の初期にみられるのはどれか。

1. 乾酪化
2. 線維化
3. 血管新生
4. 好中球遊走
5. 肉芽組織形成

問題.76

66.7%

虚血性心疾患の病態と最も関連があるのはどれか。

1. 心筋炎
2. 心臓弁膜症
3. 肺高血圧症
4. 冠動脈硬化
5. 深部静脈血栓症

問題.77

98.1%

重症熱傷について誤っているのはどれか。

1. イレウスを起こしやすい。
2. 胃十二指腸潰瘍を起こしやすい。
3. 気道熱傷時は窒息の危険が高い。
4. 熱傷深度が深いほど疼痛が強い。
5. 受傷直後は循環血液量が減少する。

問題.78

81.5%

抗凝固薬はどれか。

1. レボドパ
2. ビタミンK
3. アドレナリン
4. バクロフェン
5. ワルファリン

問題.79

35.2%

記憶のプライミングについて正しいのはどれか。

1. 学習によって習熟する。
2. 健忘症候群では障害される。
3. 潜在記憶の1つである。
4. 短期記憶に分類される。
5. 陳述記憶の1つである。

問題.80

75.9%

Eriksonによる幼児期の心理的発達課題はどれか。

1. 自律性の獲得
2. 勤勉性の獲得
3. 愛着関係の形成
4. 自我同一性の確立
5. 同年代との親密な関係の構築

問題.81

84.3%

投影法はどれか。2つ選べ。

1. CMI
2. MMPI
3. Rorschach test
4. SCT
5. TMT

問題.82

62.5%

ICF について正しいのはどれか。

1. 障害の分類である。
2. 活動は個人因子の1つである。
3. 参加は環境因子の1つである。
4. 機能障害という用語は使用されない。
5. 参加とは生活場面への関わりのことである。

問題.83

91.7%

IADLの項目に含まれるのはどれか。

1. 化粧
2. 義足の装着
3. バスの利用
4. 歩行器を使用した歩行
5. 椅子からベッドへの移乗

問題.84

89.8%

身体障害者障害程度等級表による内部障害でないのはどれか。

1. 小腸機能障害
2. 心臓機能障害
3. 代謝機能障害
4. 膀胱機能障害
5. 呼吸器機能障害

問題.85

13%

胃全摘出術後に起こりやすいのはどれか。

1. 脱水
2. 貧血
3. 脂肪便
4. 出血傾向
5. 低蛋白血症

問題.86

25.9%

痛風について正しいのはどれか。

1. 女性に多い。
2. 80代に多い。
3. 多臓器に症状を起こす。
4. るいそうに合併しやすい。
5. ピロリン酸カルシウム結晶が関節に沈着する。

問題.87

69.4%

CRPS＜複合性局所疼痛症候群＞に関連するのはどれか。

1. Dupuytren 拘縮
2. Volkmann 拘縮
3. Sudeck骨萎縮
4. 無腐性壊死
5. 異所性骨化

問題.88

93.5%

右後下小脳動脈の閉塞で発症した脳梗塞でみられないのはどれか。

1. 右片麻痺
2. 右眼瞼下垂
3. 右小脳性運動失調
4. 右顔面温痛覚障害
5. 左上下肢温痛覚障害

問題.89

88%

Guillain-Barré 症候群について正しいのはどれか。

1. 高頻度に再発する。
2. 痙性麻痺が中核症状である。
3. 運動麻痺は一側性に進行する。
4. 髄液に異常所見が認められる。
5. ステロイドパルス療法が有効である。

問題.90

71.9%

慢性閉塞性肺疾患の急性増悪時の動脈血ガス分析の所見はどれか。

1. 酸素分圧低下、二酸化炭素分圧低下
2. 酸素分圧低下、二酸化炭素分圧正常
3. 酸素分圧低下、二酸化炭素分圧上昇
4. 酸素分圧正常、二酸化炭素分圧低下
5. 酸素分圧正常、二酸化炭素分圧上昇

問題.91

46.3%

急性心筋梗塞で左冠動脈閉塞に比べて右冠動脈閉塞に特徴的なのはどれか。

1. 房室伝導ブロック
2. 心原性ショック
3. 心室中隔穿孔
4. 心室性頻拍
5. 肺うっ血

問題.92

90.6%

中枢神経発生に伴う先天奇形とその特徴の組合せて正しいのはどれか。

1. 滑脳症—————脳溝増加
2. 全前脳胞症—————顔面外側の欠損
3. 二分脊椎—————水頭症合併
4. Arnold-Chiari奇形—————脊髓の頭蓋内嵌入
5. Dandy-Walker症候群—————後頭蓋縮小

問題.93

92.6%

Down症候群で正しいのはどれか。

1. 転座型の場合は両親に転座があることは少ない。
2. 出現頻度は母親の出産年齢に影響されない。
3. 21番染色体の異常がみられる。
4. 両親に対する愛着は少ない。
5. 知的障害はみられない。

問題.94

87%


高齢者の筋で誤っているのはどれか。

1. 筋断面積が減少する。
2. 運動単位数が増加する。
3. 筋力増強効果はみられる。
4. タイプII線維の萎縮が強い。
5. 持久力は筋力に比較して維持される。

問題.95

71.3%

胸部CTを別に示す。
矢印の所見はどれか。



1. 肺炎 2. 胸水 3. 肺癌 4. 肺塞栓 5. 心嚢液貯留

問題.96

27.8%

双極性障害について正しいのはどれか。

1. 男性より女性が多い。
2. 単極性うつ病より自殺率が高い。
3. 単極性うつ病より有病率が高い。
4. 単極性うつ病より発症年齢が高い。
5. 単極性うつ病より遺伝素因の関与が低い。

問題.97

93.8%

酔うまでの飲酒量が徐々に増加するのはどれか。

1. 渴望 2. 耐性 3. 身体依存 4. 飲酒中心性 5. 山型飲酒サイクル

問題.98

67.6%

回避がみられるのはどれか。

1. 心気障害
2. 身体化障害
3. 強迫性障害
4. 全般性不安障害
5. PTSD＜外傷後ストレス障害＞

問題.99

46.9%

特発性正常圧水頭症で誤っているのはどれか。

1. 脳室拡大がみられる。
2. 小刻み歩行がみられる。
3. 自発性の低下がみられる。
4. 髄液で細胞増加がみられる。
5. 腰椎ー腹腔シャント術が用いられる。

問題.100

100%

悪性症候群の症状はどれか。

1. 筋弛緩
2. 高血糖
3. 高熱
4. 徐脈
5. 白血球減少