


問題.1

98%

スパイログラムを図に示す。
予備呼吸量はどれか。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.2

78%

Danielsらの徒手筋力テストについて正しいのはどれか。

1. 検査は段階5から実施する。
2. 徒手抵抗は検査する関節の近位部に加える。
3. 繰り返し実施することで筋持久力を評価する。
4. 段階2は重力の影響を最小限にした肢位で実施する。
5. 抑止（ブレイク）テストでは徐々に徒手抵抗を強くする。

問題.3

62%

動脈血ガス分析の結果を表に示す。
正しいのはどれか。

pH	7.473
PaCO ₂	33.4 mmHg
PaO ₂	60.2 mmHg
HCO ₃ ⁻	22.8 mEq/L

- 1. 呼吸性アシドーシス
- 2. 代謝性アルカローシス
- 3. 共用基準範囲
- 4. 代謝性アシドーシス
- 5. 呼吸性アルカローシス

問題.4

92%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 肩甲帯挙上




2. 肩伸展



3. 前腕回外



4. 手尺屈



5. 母指橈側外転

—— 基本軸
----- 移動軸

1. 2. 3. 4. 5.

問題.5

80%

Danielsらの徒手筋力テストの結果を表に示す。表以外の筋に異常はみられない。関節可動域はすべて正常範囲である。
通常速度で直線歩行したときに予想されるのはどれか。

筋	右	左
中殿筋	5	4
ハムストリングス	3	5
前脛骨筋	5	4
下腿三頭筋	2	4

- 1. 左の踵足歩行
- 2. 右の尖足歩行
- 3. 左遊脚中期の分回し
- 4. 右のTrendelenburg徴候
- 5. 右遊脚後期の膝過伸展傾向

問題.6


66%

74歳の男性。右利き。脳卒中後の右片麻痺。食事は食物を細かく刻めば左手でスプーンを用いて食べることができる。
入浴はシャワー使用で洗体に介助が必要。トイレ動作は衣服の操作に介助を要するがそれ以外は自力で行える。車椅子と
ベッド間の移乗は見守りが必要。移動は歩くことはできないが車椅子操作は自力で行え、50m以上連続駆動が可能。
Barthel Indexの得点が10点と評価される項目はどれか。

1. 食事
2. 入浴
3. 移動
4. トイレ動作
5. 車椅子とベッド間の移乗

問題.7

79% 30歳の男性。スキーで転倒して受傷した。エックス線写真を示す。肩脱臼整復後に肩関節内転・内旋位で固定されたが、上腕の外側上部に感覚鈍麻を訴えた。合併症の神経麻痺はどれか。



1. 腋窩神経 2. 肩甲上神経 3. 肩甲下神経 4. 尺骨神経 5. 正中神経

問題.8

17%

44歳の女性。関節リウマチ。エックス線写真を示す。身の回りのことはできるが、仕事は行えない。
この患者のSteinbrockerの分類はどれか。




1. ステージⅡ、クラスⅡ
2. ステージⅢ、クラスⅢ
3. ステージⅢ、クラスⅣ
4. ステージⅣ、クラスⅢ
5. ステージⅣ、クラスⅣ

問題.9

94%

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真とMRIとを示す。

この患者の病態はどれか。2つ選べ。



1. 骨粗鬆症
2. 脊椎分離症
3. 脊柱管狭窄症
4. 椎間板ヘルニア
5. 脊椎椎体圧迫骨折

問題.10

88%

62歳の男性。Parkinson病。起立と歩行は可能であるが、歩行中の方向転換時には不安定となり転倒しそうになる。姿勢反射障害もみられる。独居で日常生活はほぼ自立しているが、通院には介助が必要である。

この患者のHoehn & Yahrの重症度分類ステージはどれか。

1. I 2. II 3. III 4. IV 5. V

問題.11

67%

35歳の女性。橈骨遠位端骨折後に右上肢にCRPS〈複合性局所疼痛症候群〉を生じた。


この患者にみられる所見に合致しないのはどれか。

1. 浮腫 2. 痛覚鈍麻 3. 発汗異常 4. アロディニア 5. 皮膚温の変化

問題.12

49%

嚥下障害がある患者の胸部エックス線写真を示す。
予想される理学所見はどれか。



右

左

1. 胸痛
2. 乾性咳嗽
3. 頸静脈怒張
4. 右胸部打診で鼓音
5. 右胸部聴診で水泡音

問題.13

96%

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。
検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。


1. 立位体前屈 ―― 痛みの軽減
2. 足背動脈の触診 ―― リズムの不整
3. 足関節上腕血圧比 ―― 1.2以上
4. 両下肢の下垂試験 ―― 感覚異常の出現
5. トレッドミル歩行 ―― 間欠性跛行の出現

問題.14

81%

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感を訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。

受傷直後の処置として適切なのはどれか。



1. 足底板による固定
2. 足関節周辺の保温
3. 足関節底屈位での固定
4. 強擦法による下腿部のマッサージ
5. 端座位による下腿下垂位での安静

問題.15

32%

52歳の女性。7年前に右の乳癌に対して腋窩リンパ節郭清を伴う乳房部分切除術が行われ、術後に化学療法と放射線療法が行われた。5年前から右上肢リンパ浮腫が出現したため日常生活においては弾性スリーブを装着していた。リンパ浮腫が悪化してきたため受診し、リンパ浮腫重症度分類ステージⅡと診断された。

日常生活指導として適切なのはどれか。


1. むだ毛を処理する。
2. 皮膚の保湿をする。
3. 水分摂取を制限する。
4. 入浴は熱い温度で長湯をする。
5. 腕を締め付けるような服を着る。

問題.16

65%

46歳の男性。前日夜に冷たい風に当たり、翌朝目が覚めると右顔面の腫れぼったさを感じた。昼食時に食事が口からこぼれることに気が付き、近くの神経内科を受診した。開眼安静時の顔面の状態を図に示す。

この患者で正常に保たれる運動はどれか。




1. 額にしわを寄せる。
2. 眉をひそめる。
3. まぶたを閉じる。
4. 奥歯を噛む。
5. 口唇を閉じ突き出す。

問題.17

93%

右人工股関節置換術（後方侵入）後の患者の靴下の着脱動作として正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 2. 3. 4. 5.

問題.18

91%

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。

改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1. 荷重応答期 2. 立脚中期 3. 立脚後期 4. 遊脚中期 5. 遊脚後期

問題.19

77%

脊髄損傷患者の車椅子上での除圧動作を図に示す。
損傷レベルの上位から下位への順序で正しいのはどれか。



A



B



C



D


1. B→C→D→A
2. B→D→C→A
3. C→B→A→D
4. D→B→A→C
5. D→C→B→A

問題.20

95%

2歳の女兒。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。

この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。



1. 下肢の筋力増強
2. 介助下での歩行練習
3. 椅子からの立ち上がり練習
4. 立位での陽性支持反射の促通
5. 座位での体幹の立ち直り反応の促通

問題.21

12%

中枢神経障害の回復機序に関するアンマスキング〈unmasking〉の説明として適切なのはどれか。

1. 神経損傷で抑制シナプスが活動しなくなったために機能が発現する。
2. 脱神経のために受容体抗体ができ興奮性を高める。
3. 神経線維が脱神経領域に伸びてシナプス形成する。
4. 損傷部位より下位の組織が再編成されて機能する。
5. 軸索切断後、近位部から神経線維が再生する。

問題.22

75%

成人に対する一次救命措置で正しいのはどれか。

1. 呼吸数を測定する。
2. 人工呼吸は10回以上連続して行う。
3. 胸骨圧迫は1分間に10回の頻度で行う。
4. 人工呼吸は胸が上がる程度の空気を吹き込む。
5. 胸骨圧迫は胸が1cm程度沈む強さで圧迫する。

問題.23

59%

対象者を現在の生活習慣から喫煙群と非喫煙群とに分け、喫煙に起因する将来の脳血管障害の発生を明らかにする疫学研究法はどれか。

1. 横断研究
2. 記述的研究
3. コホート研究
4. 症例対照研究
5. 無作為化比較試験

問題.24

98%

嫌氣的代謝の過程で生成される物質はどれか。

1. クエン酸
2. コハク酸
3. フマル酸
4. ピルビン酸
5. αケトグルタル酸

問題.25

80%

フレイルの説明で正しいのはどれか。

1. サルコペニアと関連がある。
2. 体重は増加している者が多い。
3. 虚弱高齢者とは区別される病態を有する。
4. 地域在住高齢者での該当者は2%程度である。
5. 精神的な活力の低下は判断の要素に含まれない。

問題.26

88%

医療面接における自由質問法はどれか。

1. 「ご家族は何人ですか」
2. 「お名前を教えてください」
3. 「いつ頃から痛み出しましたか」
4. 「どのようなことでお困りですか」
5. 「痛いところは右ですか。左ですか」

問題.27

84%

延髄の障害でみられやすい症状はどれか。

1. 兔眼
2. 眼瞼下垂
3. 共同偏視
4. 舌の運動障害
5. 対光反射の障害

問題.28

89%

関節を他動的に動かしたときの正常な最終域感と関節運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 骨性 ―― 手指中手指節〈MP〉関節伸展
2. 靱帯の伸張 ―― 下肢伸展挙上〈SLR〉
3. 軟部組織の接近 ―― 膝関節屈曲
4. 筋の伸張感 ―― 肘関節伸展
5. 関節包の伸張 ―― 前腕回外

問題.29

98%

注意機能の評価はどれか。

1. SCT
2. MMPI
3. バウムテスト
4. TMT 〈trail making test〉
5. Kohs立方体組合せテスト

問題.30

47%

静的立位で下腿義足の足部内側が床から浮き上がった。
原因はどれか。

1. toe-out角が大きすぎる。
2. 初期内転角が不足している。
3. ソケットの外壁が高すぎる。
4. 足部が外側に位置しすぎている。
5. ソケットが内側に位置しすぎている。

問題.31

39%

杖のチェックアウトについて正しいのはどれか。

1. ロフトランド杖の前腕支え位置は前腕近位1/3とする。
2. T字杖の握りは肘関節が45度屈曲する位置とする。
3. 松葉杖の脇当て位置は腋窩から15cm下方とする。
4. 杖の長さは病態によらず同じ方法で決める。
5. 杖先ゴムの状態確認は年に1回行う。

問題.32

94%

鷺足をつくるのはどれか。

1. 大腿二頭筋
2. 内側広筋
3. 半腱様筋
4. 腓腹筋
5. ヒラメ筋

問題.33

75%

脳血管障害の評価として用いられる評価法について正しいのはどれか。

1. mRSの評価項目に筋緊張がある。
2. SIASの評価項目に意識障害がある。
3. GCSの評価項目に関節可動域がある。
4. NIHSSの評価項目にバランスがある。
5. Fugl-Meyer Assessmentの評価項目に感覚機能がある。

問題.34

92%

Parkinson病で主にみられる徴候はどれか。2つ選べ。

1. 眼振
2. 突進現象
3. 動作時振戦
4. 歯車様固縮
5. ミオクローヌス

問題.35

94%

Duchenne型筋ジストロフィーにみられる症状はどれか。

1. 踵足変形
2. 視力低下
3. 深部感覚障害
4. Babinski反射陽性
5. 下腿三頭筋仮性肥大

問題.36

71%

うっ血性心不全でみられるのはどれか。

1. 咳嗽
2. 皮膚紅潮
3. 頸動脈雑音
4. 心胸郭比40%
5. 初期の体重減少

問題.37

73%

工場生産労働者の腰痛対策として、産業理学療法の観点から優先度が低いのはどれか。

1. 作業姿勢の評価
2. 作業方法の変更
3. 職場の配置転換
4. ストレスの軽減
5. 労働生産性の維持

問題.38

97%

超音波治療が可能なのはどれか。

1. 金属プレートによる骨折固定部位
2. 血友病性関節症
3. 小児の大腿骨下端部
4. 深部静脈血栓症
5. 転移性骨腫瘍部位

問題.39

75%

脳卒中片麻痺者の応用歩行練習について麻痺側から行う場合が多いのはどれか。

1. エスカレーターに乗るとき
2. 低い障害物をまたぐとき
3. 急なスロープを上るとき
4. 階段を上るとき
5. バスに乗るとき

問題.40

62%

部分損傷をきたした靱帯と強化すべき筋の組合せて適切なのはどれか。

1. 二分靱帯 —— 後脛骨筋
2. 三角靱帯 —— 短腓骨筋
3. 前脛腓靱帯 —— 前脛骨筋
4. 前距腓靱帯 —— 長腓骨筋
5. リスフラン靱帯 —— 下腿三頭筋

問題.41

88%

関節リウマチの症状と理学療法の組合せて正しいのはどれか。

1. 肩関節痛 —— 持続伸張運動
2. 手指の変形 —— 超音波療法
3. 足の外反母指 —— 金属支柱付短下肢装具
4. 膝関節外反変形 —— 外側ウェッジ
5. 環軸関節亜脱臼 —— 頸椎前屈姿勢の予防

問題.42

46%

エネルギー蓄積機能によって大きな推進力を得る目的で使われる義足の足部はどれか。

1. 単軸足
2. SAFE足
3. SACH足
4. フレックス足
5. Greissinger足

問題.43

80%

3歳6か月の脳性麻痺児で、ロフストランド杖などの手に持つ移動器具を使用して歩行可能である。この児のGMFCSのレベルはどれか。

1. I 2. II 3. III 4. IV 5. V

問題.44

91%

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1. 運動によって腎血流は増加する。
2. 血液透析日にも運動療法が行われる。
3. 運動療法によって糸球体濾過量が改善する。
4. 下肢の浮腫には起立台での起立練習が有効である。
5. 病期分類ステージ5の症例では5～6METsの運動が適応となる。

問題.45

83%

がん患者の緩和ケア病棟におけるリハビリテーションで正しいのはどれか。

1. QOLより機能回復を優先する。
2. 肺癌では呼吸介助は禁忌となる。
3. 疼痛に対して温熱療法は禁忌である。
4. 病名告知を前提として理学療法を行う。
5. 骨転移の有無に合わせて理学療法の内容を変更する。

問題.46

83%

三次予防に含まれるのはどれか。

1. 早期発見
2. 早期治療
3. 予防接種
4. 健康増進
5. リハビリテーション

問題.47

34%

要介護認定の審査で、要支援2と要介護1の違いを判定する要素はどれか。

1. 歩行速度
2. 対象者の意欲
3. 状態の不安定性
4. 家族の介護負担感
5. 要介護認定等基準時間

問題.48

36%

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1. 片麻痺 ―― ボタンエイド
2. 片側上肢の切断 ―― プルトップオープナー
3. 脊髄小脳変性症 ―― リーチャー
4. 両側上肢の切断 ―― 台付き爪切り
5. アテトーゼ型脳性麻痺 ―― ソックスエイド

問題.49

77%

Heinrichの法則について正しいのはどれか。

1. 有害事象を6段階で示している。
2. 多くの人が関わると事故が多くなる。
3. 1つの大事故に対して多数の小さな事故が発生している。
4. およそ2割の人の努力で8割の事故を防ぐことができる。
5. 二重の確認によって事故を3割程度減少させることができる。

問題.50

62%

側方突進が出現する可能性が最も高い病変部位はどれか。

1. 小脳虫部
2. 黒質緻密部
3. 視床内側部
4. 延髄外側部
5. 内包後脚部

問題.51

88.0%

外胚葉から発生するのはどれか。

1. 脳 2. 心臓 3. 膀胱 4. 卵巣 5. 骨格筋

問題.52

100.0%

体表から触知できるのはどれか。2つ選べ。

1. 歯突起 2. 結節間溝 3. 胸骨角 4. 顎間隆起 5. 舟状骨粗面

問題.53

98.0%

回旋筋腱板を構成する筋はどれか。2つ選べ。

1. 棘上筋 2. 肩甲挙筋 3. 背広筋 4. 小円筋 5. 前鋸筋

問題.54

67.5%

第2中手骨底に付着する筋はどれか。

1. 円回内筋 2. 尺側手根屈筋 3. 浅指屈筋 4. 長掌筋 5. 橈側手根屈筋

問題.55

95.0%

胸椎に付着する筋はどれか。

1. 外腹斜筋 2. 肩甲挙筋 3. 前鋸筋 4. 僧帽筋 5. 内腹斜筋

問題.56

96.0%

二重神経支配の筋はどれか。

1. 長内転筋 2. 大内転筋 3. 中間広筋 4. 半膜様筋 5. ヒラメ筋

問題.57

56.0%

脳血管とその還流域の組合せで正しいのはどれか。

1. 前大脳動脈 —— 黒質
2. 中大脳動脈 —— 海馬
3. 後大脳動脈 —— 視床
4. 脳底動脈 —— Broca野
5. 椎骨動脈 —— 中心前回

問題.58

80.0%

大脳辺縁系とその働きの組合せで正しいのはどれか。

1. 海馬 —— 体温調節
2. 嗅球 —— 内分泌
3. 視床下部 —— 長期記憶
4. 帯状回 —— 運動学習
5. 扁桃体 —— 短期記憶

問題.59

83.0%

同一の臓器から分泌されるホルモンの組合せで誤っているのはどれか。

1. アルドステロン —— コルチゾール
2. インスリン —— グルカゴン
3. エリスロポエチン —— レニン
4. オキシトシン —— バソプレシン
5. カルシトニン —— パラトルモン

問題.60

80.0%

視覚器で正しいのはどれか。

1. 毛様体には血管がない。
2. 虹彩には瞳孔散大筋がある。
3. 眼動脈は外頸動脈の分枝である。
4. 眼球壁外膜は強膜と内膜からなる。
5. 角膜には血管が多数分布している。

問題.61

82.5%

細胞膜電位について誤っているのはどれか。

1. 静止膜電位は負の値である。
2. 活動電位は全か無の法則に従う。
3. 活動電位の発火直後には不応期が存在する。
4. 脱分極で極性が正の部分をオーバーシュートという。
5. カリウムイオンは脱分極のときに細胞外から細胞内に移動する。

問題.62

90.0%

運動単位について誤っているのはどれか。

1. 1個の運動ニューロンとそれに支配される筋線維群を運動単位という。
2. 1つの筋肉は多数の運動単位で構成される。
3. 1個の運動ニューロンが何本の筋線維を支配しているかを神経支配比という。
4. 上腕二頭筋より虫様筋の方が神経支配比は大きい。
5. 最も強い筋収縮は筋のすべての運動単位が同期して活動するとき起こる。

問題.63

89.0%

腱をたたいて骨格筋を急速に伸ばすと起こる単純収縮に関与するのはどれか。

1. 筋紡錘
2. Pacini小体
3. Ruffini終末
4. 自由神経終末
5. Meissner小体

問題.64

60.0%

健常者の安静時呼吸について正しいのはどれか。

1. 呼吸数は25/分程度である。
2. 呼気時の気道内圧は陽圧である。
3. 呼気時の胸腔内圧は陽圧である。
4. 呼気時に外肋間筋の収縮がみられる。
5. 吸気時に胸鎖乳突筋の収縮がみられる。

問題.65

91.0%

血液凝固因子はどれか。

1. アルブミン
2. トロンビン
3. ヘモグロビン
4. プラスミノゲン
5. エリスロポエチン

問題.66

76.0%

胃液の分泌を促進するのはどれか。2つ選べ。

1. 胃壁の伸展
2. 胃内pHの低下
3. 交感神経の緊張
4. ガストリンの分泌
5. 十二指腸内への酸性内容物の流入

問題.67

79.0%

尿の生成について正しいのはどれか。

1. 集合管では尿の希釈を行う。
2. 血漿蛋白は糸球体を透過する。
3. 血液の濾過は腎小体で行われる。
4. 近位尿細管ではアンモニアの再吸収を行う。
5. 抗利尿ホルモンは水の再吸収量を減少させる。

問題.68

92.5%

老化に伴う生理機能の変化で正しいのはどれか。

1. 血管抵抗は低下する。
2. 残気量は減少する。
3. 心拍出量は増加する。
4. 肺活量は増加する。
5. 予備呼気量は減少する。

問題.69

100.0%

立位姿勢が安定しているのはどれか。

1. 支持基底面が狭い。
2. 重心の位置が高い。
3. 床と足底の接触面の摩擦抵抗が小さい。
4. 上半身と下半身の重心線が一致している。
5. 重心線の位置が支持基底面の中心から離れている。

問題.70

92.5%

肩甲骨の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 挙上 ―― 小胸筋
2. 下制 ―― 鎖骨下筋
3. 外転 ―― 僧帽筋
4. 内転 ―― 菱形筋
5. 下方回旋 ―― 前鋸筋

問題.71

91.0%

前腕回外に作用する筋はどれか。

1. 長掌筋
2. 小指伸筋
3. 上腕二頭筋
4. 長母指屈筋
5. 橈側手根屈筋

問題.72

97.0%

股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 屈曲 ―― 梨状筋
2. 伸展 ―― 大腰筋
3. 内転 ―― 薄筋
4. 内旋 ―― 上双子筋
5. 外旋 ―― 半腱様筋

問題.73

80.0%

足部アーチについて正しいのはどれか。

1. 外側縦アーチの要石は外側楔状骨である。
2. 外側縦アーチは内側縦アーチよりも長い。
3. 内側縦アーチは外がえしで高くなる。
4. 内側縦アーチは中足指節関節の伸展時に高くなる。
5. 足根骨部の横アーチで高い位置にあるのは立方骨である。

問題.74

92.5%

フィードバックの説明で正しいのはどれか。

1. 平均フィードバックは試行ごとに与える。
2. 帯域幅フィードバックは何回分かをまとめて一度に与える。
3. 同時フィードバックは運動課題を実行している最中に与える。
4. 漸減的フィードバックは誤差が一定の幅を外れた場合に与える。
5. 要約フィードバックは学習の進行に伴い頻度を減らして与える。

問題.75

97.0%

病理学的な悪性度が最も高いのはどれか。

1. 海綿状血管腫
2. 下垂体腺腫
3. 神経膠芽腫
4. 神経鞘腫
5. 髄膜腫

問題.76

93.0%


急性炎症と比較した場合慢性炎症の特徴はどれか。

1. 血管内皮細胞の損傷
2. 血漿蛋白の滲出
3. 好中球の集積
4. サイトカインの分泌
5. 組織の線維化

問題.77

83.0%

頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。
矢印の部位はどれか。



1. 前頭弁蓋 2. 帯状回 3. 尾状核 4. 海馬 5. 島

問題.78

93.0%

自分自身が受け入れることができない衝動・観念を、他の人が持っているとする防衛機制はどれか。

1. 反動形成 2. 合理化 3. 否認 4. 投影 5. 抑圧

問題.79

75.0%

老年期における精神保健上の問題として適切なのはどれか。

1. 緘黙 2. 同一性拡散 3. 社会的孤立 4. 空の巣症候群 5. モラトリアム

問題.80

77.5%

行動療法の技法でないのはどれか。

1. 精神分析
2. 系統的脱感作法
3. 曝露反応妨害法
4. トークンエコノミー法
5. バイオフィードバック法

問題.81

90.0%

語の流暢性課題を含む検査はどれか。

1. MMPI
2. MMSE
3. WCST
4. HDS-R
5. Rorschachテスト

問題.82

93.0%

中心性脊髄損傷について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 高齢者に多い。
2. 骨傷に伴って生じることが多い。
3. 頸椎の過屈曲によって発生することが多い。
4. 肛門括約筋の収縮が障害されることが多い。
5. 下肢より上肢機能が強く障害されることが多い。

問題.83

100.0%

運動障害と評価方法の組合せで正しいのはどれか。

1. 運動失調 —— 指鼻試験
2. 筋力低下 —— Brunnstrom法ステージ
3. 持久力低下 —— 徒手筋力テスト
4. 錐体外路障害 —— Babinski反射
5. 錐体路障害 —— Romberg試験

問題.84

97.0%

観念運動失行の検査はどれか。

1. 「今、何時ですか」
2. 「右手の薬指はどれですか」
3. 「歯を磨くまねをしてください」
4. 「紙を折って封筒に入れてください」
5. 「このカードに描いてある絵を覚えてください」

問題.85

87.5%

上腕骨外側上顆炎について正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 高齢者に多い。
3. 自発痛はない。
4. 手関節伸筋腱の付着部の炎症である。
5. 物を持ち上げる際は前腕回内位で行うようにする。

問題.86

94.0%

変形性膝関節症について正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 膝関節液は混濁している。
3. 内側楔状足底板が有用な場合が多い。
4. 初期の疼痛は動作開始時に出現しやすい。
5. エックス線像では外側関節裂隙が狭小化している場合が多い。

問題.87

53.0%

第4腰椎変性すべり症の症候として誤っているのはどれか。

1. 頻尿
2. 下肢痛
3. 痙性歩行
4. 間欠性跛行
5. 会陰部の熱感

問題.88

34.0%

脳血管障害について誤っているのはどれか。

1. 高血圧は脳出血の危険因子である。
2. くも膜下出血は女性よりも男性に多い。
3. 発作性心房細動は脳塞栓の危険因子である。
4. 癌に付随する凝固異常は脳塞栓の原因となる。
5. 慢性腎臓病〈CKD〉は脳卒中の危険因子である。

問題.89

95.0%

平均的な発症年齢が最も低いのはどれか。

1. 筋強直性ジストロフィー
2. 福山型筋ジストロフィー
3. Becker型筋ジストロフィー
4. Duchenne型筋ジストロフィー
5. 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

問題.90

100.0%

多発性硬化症について正しいのはどれか。

1. 女性よりも男性に多い。
2. 再発と寛解を繰り返す。
3. 発症は50歳以上が多い。
4. 後遺障害を残すことは稀である。
5. 白色人種に比べて黄色人種に多い。

問題.91

100.0%

中枢神経の先天奇形とその特徴の組合せで正しいのはどれか。

1. 小頭症 — 脳圧亢進
2. 滑脳症 — 脳溝増加
3. 二分脊椎 — 水頭症合併
4. Dandy-Walker症候群 — 後頭蓋縮小
5. Arnold-Chiari奇形 — 脊髄の頭蓋内嵌入

問題.92

93.0%

高齢者の肺炎の特徴として正しいのはどれか。

1. 高熱がみられる。
2. 誤嚥性肺炎が多い。
3. 肺尖部の病巣が多い。
4. 咳反射の亢進がみられる。
5. 死因となる例は減少している。

問題.93

80.0%

急性心筋梗塞後の運動療法の効果として正しいのはどれか。

1. 梗塞範囲の減少
2. 心室破裂の減少
3. 心嚢液貯留の減少
4. 左室駆出率の増加
5. 急性期心臓死の減少

問題.94

77.0%

内分泌異常と病態の組合せで正しいのはどれか。

1. 下垂体前葉ホルモン欠損 — 先端巨大症
2. 甲状腺機能低下 — Basedow病
3. 抗利尿ホルモン分泌亢進 — 尿崩症
4. 副甲状腺機能低下 — テタニー
5. 副腎皮質機能低下 — Cushing症候群

問題.95

60.0%

医療法で規定されていないのはどれか。

1. 医療提供の理念
2. 医療従事者の責務
3. 病院開設者の資格
4. 医療行為に対する診療報酬
5. 都道府県における医療計画の策定

問題.96

92.5%

双極性障害と比較した場合のうつ病の特徴はどれか。

1. 有病率が低い。
2. 平均初発年齢が低い。
3. 有病率の男女差が小さい。
4. 一卵性双生児の罹患一致率が低い。
5. 状況要因が誘因となって発病することが少ない。

問題.97

82.0%

小児自閉症について正しいのはどれか。

1. 学童期に発症する。
2. 脊椎変形を生じる。
3. 女児より男児に多く出現する。
4. 精神遅滞を伴うことは稀である。
5. 大部分の症例でてんかんを認める。

問題.98

97.5%

アルコールの離脱症候群はどれか。2つ選べ。

1. 病的酩酊
2. けいれん発作
3. 複雑酩酊
4. 振戦せん妄
5. Wernicke脳症

問題.99

95.0%

神経性大食症について正しいのはどれか。

1. 女性より男性に多い。
2. 高カリウム血症がみられる。
3. 神経性無食欲症からの移行はない。
4. カロリーの低いものを過食することが多い。
5. 代償行動で最も多いのは自己誘発性嘔吐である。

問題.100

26.0%


再発に高EE〈Expressed Emotion〉が深く関与している統合失調症患者の治療に有効なのはどれか。

1. 自律訓練法
2. 認知行動療法
3. 生活技能訓練
4. 家族心理教育
5. レクリエーション

問題.1

95%

健常成人の平地歩行時の下肢筋活動を図に示す。
下腿三頭筋の筋活動に相当するのはどれか。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.2

90%

図1の検査で異常がみられた場合、図2の脊髓横断面の模式図において損傷が考えられる部位はどれか。




図 1




図 2


1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.3

75%

患者の股関節部エックス線写真を示す。大腿骨および下腿骨に骨折はなく、膝関節の変形や可動域制限はない。右大腿長44.0cm、両側の下腿長35.5cm、右下肢の棘果長83.0cmであった。

左下肢の肢長検査で正しいのはどれか。



	棘果長	転子果長
1.	81.0 cm	79.5 cm
2.	81.0 cm	78.5 cm
3.	81.0 cm	77.5 cm
4.	83.0 cm	79.5 cm
5.	83.0 cm	77.5 cm

1. 2. 3. 4. 5.

問題.4

69%

右股関節の可動域を表に示す。
快適速度で直線路を歩行した場合に予想される特徴はどれか。


部 位	運動方向	他動可動域
股(右)	屈 曲	50 度
	伸 展	15 度
	外 転	35 度
	内 転	-10 度

- 1. 歩隔の増加
- 2. 右の歩幅の減少
- 3. 左の遊脚時間の延長
- 4. 右立脚時の体幹の左側屈
- 5. 左立脚時の左股関節外転角度の増加

問題.5

94%

Danielsらの徒手筋カテストで肩関節屈曲（前方挙上）の段階3の測定をする際、図のような代償がみられた。
代償動作を生じさせている筋はどれか。




↓ 対象者の運動方向

1. 回外筋
2. 上腕二頭筋
3. 前鋸筋
4. 肩甲下筋
5. 広背筋

問題.6

93%

義肢の写真を示す。
使われている部品はどれか。




1. 吸着式ソケット
2. ターンテーブル
3. 多節リンク膝
4. トルク吸収装置
5. ドリンガー足部

問題.7

52%

病態と図に示す靴の補正との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。




1. 踵骨骨棘 —— ①
 2. 外反扁平足 —— ②
 3. 外反膝 —— ③
 4. 内反足 —— ④
 5. 槌指 —— ⑤

問題.8

84%

14歳の女子。第5胸椎を頂椎とする側弯症。Cobb角は18度である。体幹前屈時の様子を図に示す。
正しいのはどれか。




1. 右凸の側弯である。
2. 手術療法の適応である。
3. 側弯体操で矯正可能である。
4. Boston型装具の適応である。
5. 第5胸椎の棘突起は凸側へ回旋している。

問題.9

87%

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。

この食事動作の病態として考えられるのはどれか。



1. 観念失行
2. 視覚性失認
3. 運動維持困難
4. 右上肢運動麻痺
5. 右上肢深部覚障害

問題.10

93%

10歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩不可能で、屋外は車椅子で、室内では四つ這い移動が可能。上肢に拘縮はなく、座位で上肢の使用が可能である。


この時期に優先して行うべき評価はどれか。

1. 知能検査
2. 深部腱反射
3. 神経伝導速度
4. 呼吸機能検査
5. 前腕回内外試験

問題.11

89%

Down症候群で乳児期前半にみられる特徴的な姿勢はどれか。



1.
2.
3.
4.
5.

問題.12

81%

58歳の男性。歩行時のふらつきを訴えて受診した。歩隔はやや広いが左右方向は安定しており、前後方向への振り子様の歩容がみられる。検査結果を表に示す。

協調運動改善のための理学療法として適切なのはどれか。


注視方向性眼振	あ り
構音障害	あ り
鼻指鼻試験	測定異常あり
関節位置覚障害	な し
Romberg 徴候	な し

1. 自転車エルゴメーターによるペダリング運動
2. rhythmic stabilization
3. 下肢筋群の持続的伸張
4. Frenkel体操
5. Epley法

問題.13

75%

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。




1. 2. 3. 4. 5.

問題.14

56%

75歳の男性。冠動脈バイパス術後。病棟での運動療法中に胸部不快感を生じた。そのときのモニター心電図を示す。この患者にみられるのはどれか。



1. 心房細動
2. 洞性徐脈
3. WPW症候群
4. 心室性期外収縮
5. II度房室ブロック

問題.15

43%

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。線分抹消検査では紙面の左下方の線分抹消が行えず、車椅子駆動時には左側を壁にぶつけることがあった。

理学療法として適切なのはどれか。

1. 右側から聴覚刺激を与える。
2. 右後頸部筋へ振動刺激を行う。
3. 頭部は正面を向いたまま体幹を右に回旋させる。
4. 手がかりを与えながら左側にある視覚標的を右へ移動させる。
5. 視野が右へ偏位するプリズム付眼鏡をかけてリーチ動作を行わせる。

問題.16

99%

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。

実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性となったとき、損傷されたのはどれか。



1. 外側側副靱帯
2. 後十字靱帯
3. 前十字靱帯
4. 腸脛靱帯
5. 内側側副靱帯

問題.17

74%

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。（図に示した検査を実施し、陽性となった）

他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。



1. 安静固定
2. 水中歩行練習
3. 大腿四頭筋の強化
4. 超音波療法
5. ハムストリングスの強化

問題.18

90%

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一步前に出す運動を行っている。

この目的として誤っているのはどれか。



1. 歩幅の拡大
2. 歩隔の拡大
3. 右側の殿筋強化
4. 右側の下腿三頭筋の強化
5. 右側の上肢肩甲帯の安定化

問題.19

98%

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。

この時期に行う理学療法で適切なものはどれか。

1. 体位排痰
2. 痙縮の抑制
3. 体幹の漸増抵抗運動
4. 上下肢の高負荷の筋力増強運動
5. 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

問題.20

46%

多職種で構成される病院内のカンファレンスに出席する際に、先輩から「この会議は、チームビルディングは成熟していて活発な議論がなされるが、コンフリクトマネジメントに課題がある」と助言を受けた。

このカンファレンスにおける対応として最も優先すべきなのはどれか。

1. 自分の意見を積極的に述べる。
2. 参加者と打ち解けられるようにする。
3. 意見が衝突した際に注意深く対応する。
4. 他者の意見を傾聴することを優先する。
5. 他者の意見に異を唱えずに議論を進める。

問題.21

99%

医療機関における患者の個人情報の取扱いで誤っているのはどれか。

1. 本人に開示する。
2. 漏えい防止対策を行う。
3. 正確かつ最新の内容に保つ。
4. 利用目的をできる限り特定する。
5. 医療機関の判断で利用目的を変更できる。

問題.22

69%

陽性尤度比の説明で正しいのはどれか。

1. 検査的中率と同義である。
2. 陰性尤度比を足すと1になる。
3. 「感度÷(1－特異度)」で計算できる。
4. 値が小さいほど臨床導入の妥当性が高い。
5. 実際の該当者のうち検査で陽性となる割合である。

問題.23

83%

立位で外乱による体の前方への傾きを足関節の運動で制御する際、外乱直後に最も活動する筋はどれか。

1. 腓腹筋 2. 大胸筋 3. 腹直筋 4. 前脛骨筋 5. 大腿四頭筋

問題.24

25%

運動による疲労時に筋内で増えるのはどれか。2つ選べ。

1. ATP
2. 乳酸
3. グリコーゲン
4. 水素イオン (H⁺)
5. クレアチンリン酸

問題.25

13%

SF-36で正しいのはどれか。

1. 効用値を算出する。
2. 4つの下位尺度がある。
3. 疾患特異的尺度である。
4. アウトカムの指標となる。
5. 全般的に主観的満足感を評価する。

問題.26

16%

非圧痕性浮腫を生じる疾患はどれか。

1. ネフローゼ症候群
2. 甲状腺機能低下症
3. 肝硬変
4. 心不全
5. 熱傷

問題.27

96%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）において、基本軸または移動軸が橈骨であるのはどれか。2つ選べ。

1. 肩外旋
2. 肩屈曲
3. 肘伸展
4. 手背屈
5. 前腕回内

問題.28

47%

Danielsらの徒手筋カテストで、検査する筋の段階と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 腸腰筋の段階3 —— 側臥位
2. 中殿筋の段階1 —— 腹臥位
3. 大腿四頭筋の段階3 —— 座位
4. 前脛骨筋の段階4 —— 立位
5. 下腿三頭筋の段階2 —— 背臥位

問題.29

79%

FIMについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 運動項目の1つに排尿管理がある。
2. 認知項目の1つに問題解決がある。
3. 認知項目の完全自立は42点となる。
4. 補装具を使用して動作が自立していれば完全自立とする。
5. すべての評価項目が全介助の場合、評価点は0点となる。

問題.30

85%

骨盤帯付長下肢装具の適合判定で正しいのはどれか。

1. 骨盤帯は側方では腸骨稜と上前腸骨棘の間に設置する。
2. 下腿半月上縁は腓骨頭下端の直下である。
3. 股継手軸は前額面で小転子より2cm上方を通る。
4. 膝継手軸は矢状面で膝の前後径の1/2の点と後方1/3の点の中間点を通る。
5. 足継手軸は前額面で内果中央を通る。

問題.31

93%

肘関節脱臼で多いのはどれか。

1. 外側
2. 後方
3. 前方
4. 内側
5. 分散

問題.32

98%

腰椎椎間板ヘルニアで陽性となるテストはどれか。

1. Apleyテスト
2. Patrickテスト
3. Thomasテスト
4. McMurrayテスト
5. 大腿神経伸張テスト

問題.33

50%

脳卒中発症後2週間以内に生じにくい合併症はどれか。

1. 意識障害
2. 消化管出血
3. 肩手症候群
4. 摂食嚥下障害
5. 深部静脈血栓症

問題.34

100%

筋萎縮性側索硬化症で生じにくい症状はどれか。

1. 舌萎縮
2. 構音障害
3. 上下肢麻痺
4. 眼球運動障害
5. 摂食嚥下障害

問題.35

86%

末梢神経損傷で予後が最も良いのはどれか。

1. ニューロトメシス〈neurotmesis〉
2. アクソノトメシス〈axonotmesis〉
3. ニューラブラキシア〈neurapraxia〉
4. 神経根引き抜き損傷
5. Waller変性

問題.36

88%

水の物理的特性で水中運動療法における生理的な作用に影響しないのはどれか。

1. 水圧
2. 浮力
3. 抵抗
4. 屈折
5. 熱伝導率

問題.37

95%

持久カトレーニングの効果として正しいのはどれか。

1. 呼吸数の増加
2. 1回拍出量の減少
3. 安静時心拍数の減少
4. 末梢血管抵抗の増加
5. 最大酸素摂取量の減少

問題.38

11%

慢性非特異的腰痛の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドラインで強く推奨されているのはどれか。

1. 超音波
2. TENS
3. 腰椎牽引
4. 寒冷療法
5. 認知行動療法

問題.39

83%

慢性閉塞性肺疾患のADL動作で最も息切れが生じやすいのはどれか。

1. 食事
2. 排尿
3. 歯磨き
4. 洗髪
5. ズボンの着脱

問題.40

71%

転位のない大腿骨転子部骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法として優先度の低いのはどれか。

1. 早期からの歩行練習
2. 脱臼予防肢位の指導
3. 早期からのROM練習
4. 大腿四頭筋の等尺性運動
5. 足関節の自動的底背屈運動

問題.41

46%

腰椎分離症で分離するのはどれか。

1. 横突起
2. 棘突起
3. 椎間板
4. 椎弓
5. 椎体

問題.42

54%

Duchenne型筋ジストロフィーについて誤っているのはどれか。

1. 小学校3～4年では書字動作は保たれる。
2. 小学校高学年ではトイレ動作に介助が必要である。
3. 小学校高学年での歩行消失後は四つ這い生活を積極的に指導する。
4. 小学校高学年から中学校では美術の時間に補助具の工夫が必要である。
5. 中学校から高校ではパソコンの入力装置に工夫が必要である。

問題.43

65%

心不全のない急性心筋梗塞患者の退院後運動指導として適切なのはどれか。

1. 1日10分程度のジョギング
2. 等尺性収縮による筋力増強
3. 心拍数を増加させない運動
4. Borg指数16レベルの運動
5. 週3日以上の有酸素運動

問題.44

18%

白杖を使用している視覚障害者の介助について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 平地歩行時は、介助者の手を把持する。
2. バスに乗るときは、介助者が先に乗る。
3. 階段を下りるときは、介助者が一段先に下りる。
4. 混雑した電車に乗るときは、介助者が後から乗る。
5. 手前に引いて出入りするドアでは、介助者が先に入る。

問題.45

80%

生活習慣病に含まれないのはどれか。

1. 高血圧症
2. 脂質異常症
3. 糖尿病
4. 脳卒中
5. 肺炎

問題.46

30%

ICFの脳卒中Brief core setに含まれるのはどれか。

1. 歩行
2. 痛みの感覚
3. 運動耐容能
4. 関節の可動性
5. レクリエーションとレジャー

問題.47

84%

介護保険制度について誤っているのはどれか。

1. 在宅介護を推進する。
2. 健康の保持や増進に努力する。
3. 20歳以上の全国民が加入する。
4. 高齢者の自己決定権を尊重する。
5. ノーマライゼーションを実現する。

問題.48

54%

端座位で一側の股関節を屈曲する際に抵抗をかけたところStrümpell現象が出現し、歩行動作の練習に役立てようとした。

観察された動きはどれか。

1. 股関節外旋 2. 膝関節屈曲 3. 膝関節伸展 4. 足関節背屈 5. 足関節底屈

問題.49

24%

胸髄損傷者の褥瘡予防で正しいのはどれか。

1. 30度側臥位にする。
2. 体位変換は6時間ごとに行う。
3. 褥瘡の好発部位に円座を用いる。
4. ベッドアップは80度以上にする。
5. 褥瘡の好発部位をマッサージする。

問題.50

85%

栄養状態の評価として有用性が低いのはどれか。

1. 血小板数
2. 下腿周囲径
3. 体重減少率
4. Body Mass Index
5. 血清アルブミン値

問題.51

95.0%

上腕骨小結節に付着する筋はどれか。

1. 棘下筋 2. 棘上筋 3. 肩甲下筋 4. 小円筋 5. 上腕二頭筋

問題.52

55.0%

皮下組織の直下に筋腹を触知する筋はどれか。

1. 棘上筋 2. 方形回内筋 3. 小殿筋 4. 中間広筋 5. 長腓骨筋

問題.53

90.0%

腕神経叢の後神経束から分岐する神経はどれか。

1. 腋窩神経 2. 筋皮神経 3. 尺骨神経 4. 正中神経 5. 長胸神経

問題.54

95.0%

舌下神経について正しいのはどれか。

1. 舌筋を支配する。
2. 両側支配である。
3. 神経核は橋にある。
4. 脳の背側から出る。
5. 味覚の求心路である。

問題.55

23.0%

脛骨と腓骨の両方に付着する筋はどれか。2つ選べ。

1. 大腿二頭筋
2. 半腱様筋
3. 前脛骨筋
4. 後脛骨筋
5. 短腓骨筋

問題.56

60.0%

解剖学的構造のうち、白質に分類されるのはどれか。

1. 視床
2. 脳梁
3. 被殻
4. 淡蒼球
5. 脊髓前角

問題.57

88.0%

脳脊髄液の流路において、第三脳室と第四脳室の間に位置するのはどれか。

1. Luschka孔
2. Magendie孔
3. Monroe孔
4. 中脳水道
5. 脈絡叢

問題.58

95.0%

胃の解剖について正しいのはどれか。

1. 胃底は胃の下方をいう。
2. 胃の左縁を小弯という。
3. 食道と胃の境に噴門が位置する。
4. 大弯は肝胃間膜によって肝臓と結合している。
5. 胃酸を分泌する腺は幽門前庭に多くみられる。

問題.59

67.5%

腎臓の解剖について正しいのはどれか。

1. 糸球体は腎髄質に位置する。
2. 輸出細動脈は集合管につながる。
3. ネフロンは糸球体と尿細管からなる。
4. 輸入細動脈はHenle係蹄につながる。
5. 腎乳頭はBowman囊に覆われている。

問題.60

77.5%

細胞分裂の開始に関わるのはどれか。

1. Golgi 〈ゴルジ〉 装置
2. 中心小体
3. ミトコンドリア
4. リソソーム
5. リボソーム

問題.61

92.5%

1本の神経線維を電気刺激した場合の興奮伝導の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 興奮は一方向に伝わる。
2. 興奮は減衰せずに伝わる。
3. 興奮は太い線維ほど速く伝わる。
4. 興奮は並走する別の線維に伝わる。
5. 有髄線維では興奮が髄鞘に伝わる。

問題.62

65.0%

四肢からの感覚神経伝導路について正しいのはどれか。

1. 触覚の線維は中脳で交叉する。
2. 圧覚の線維は脊髄視床路を通る。
3. 温度覚の線維は脊髄節で交叉する。
4. 一次ニューロンの細胞体は後角にある。
5. 痛覚の伝導路は延髄で二次ニューロンになる。

問題.63

100.0%

運動時の循環反応で誤っているのはどれか。

1. 脳血流量は減少する。
2. 腎血流量は減少する。
3. 静脈還流量は増加する。
4. 分時心拍出量は増加する。
5. 骨格筋の血流量は増加する。

問題.64

100.0%

交感神経の作用はどれか。

1. 瞳孔の縮小
2. 膀胱の収縮
3. 心拍数の減少
4. 気管支の拡張
5. 膵液の分泌促進

問題.65

95.0%

右心不全の症候として正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 肺水腫 2. 肝脾腫 3. 起坐呼吸 4. 下腿浮腫 5. チアノーゼ

問題.66

77.0%

消化酵素について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. α アミラーゼはマルトースをブドウ糖に分解する。
2. トリプシンはトリペプチドをアミノ酸に分解する。
3. ペプシンは蛋白質をポリペプチドに分解する。
4. マルターゼはデンプンをデキストリンに分解する。
5. リパーゼは脂肪を脂肪酸とグリセリンに分解する。

問題.67

75.0%

排便機構について正しいのはどれか。

1. 外肛門括約筋は平滑筋である。
2. 結腸壁が伸展されることで便意が生じる。
3. 内肛門括約筋を収縮させることで排便する。
4. 排便中枢は大脳皮質からの抑制を受けている。
5. 食物で胃が伸展されると大腸の蠕動運動が抑制される。

問題.68

89.0%

分娩後の乳汁分泌に作用するホルモンはどれか。

1. ドパミン
2. エストロゲン
3. プロラクチン
4. プロゲステロン
5. ゴナドトロピン

問題.69

73.0%

代謝について正しいのはどれか。

1. エネルギー代謝率〈RMR〉は基礎代謝量を基準とした運動強度である。
2. 基礎代謝量〈BM〉は同性で同年齢ならば体重に比例する。
3. 呼吸商〈RQ〉は摂取する栄養素によらず一定である。
4. 代謝当量〈MET〉は安静臥位時の代謝量を基準とした運動強度である。
5. 特異動的作用〈SDA〉とは食物摂取後の消費エネルギーの減少である。

問題.70

94.0%

肩関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 屈曲 ―― 棘上筋
2. 伸展 ―― 大円筋
3. 外転 ―― 棘下筋
4. 外旋 ―― 肩甲下筋
5. 内旋 ―― 小円筋

問題.71

92.0%

手指の運動とそれに作用する筋の組合せで誤っているのはどれか。

1. 母指MP関節伸展 ―― 短母指伸筋
2. 小指MP関節屈曲 ―― 短小指屈筋
3. 環指MP関節外転 ―― 背側骨間筋
4. 小指MP関節内転 ―― 掌側骨間筋
5. 中指MP関節伸展 ―― 虫様筋

問題.72

93.0%

膝関節半月板について正しいのはどれか。

1. 外縁は内縁より薄い。
2. 外側半月板は外側側副靱帯に付着しない。
3. 大腿骨と膝蓋骨の適合性を高める。
4. 内側半月板は外側半月板より小さい。
5. 膝関節伸展時には後方に移動する。

問題.73

88.0%

足部の内がえしに作用する筋はどれか。2つ選べ。

1. 後脛骨筋
2. 前脛骨筋
3. 第3腓骨筋
4. 短腓骨筋
5. 長指伸筋

問題.74

37.5%

成人の安静開脚立位で正しいのはどれか。

1. 頭部は静止している。
2. 腓腹筋は持続的に活動している。
3. 腹直筋は持続的に活動している。
4. 大腿直筋は持続的に活動している。
5. 重心動揺は左右より前後方向が小さい。

問題.75

65.0%


疾患と病因・病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。

1. Creutzfeldt Jakob病 —— 感染性疾患
2. Parkinson病 —— 脱髄疾患
3. 肝性脳症 —— 神経変性疾患
4. 正常圧水頭症 —— 血行障害
5. 多発性硬化症 —— 腫瘍性疾患

問題.76

100.0%

突然の右不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後6時間の頭部CTを示す。
最も考えられるのはどれか。



1. 視床出血
2. 被殻出血
3. 皮質下梗塞
4. くも膜下出血
5. 慢性硬膜下血腫

問題.77

91.0%

ワルファリンの作用を減弱させるのはどれか。

1. ビタミンA
2. ビタミンB₆
3. ビタミンB₁₂
4. ビタミンC
5. ビタミンK

問題.78

30.0%

正常な肉芽の特徴はどれか。

1. 感染しやすい。
2. 乾燥している。
3. 出血しやすい。
4. 白色である。
5. 分泌物が多い。

問題.79

87.0%

意識することなく再生される記憶はどれか。

1. 即時記憶
2. 意味記憶
3. 近時記憶
4. 手続き記憶
5. エピソード記憶

問題.80

100.0%

Eriksonによる発達段階で老年期に獲得すべき課題はどれか。

1. 親密
2. 統合
3. 勤勉
4. 自律
5. 同一性

問題.81

100.0%

模擬場面でのリハーサルを技法として用いるのはどれか。

1. 内観療法
2. 箱庭療法
3. 森田療法
4. 認知行動療法
5. 支持的精神療法

問題.82

2.5%

脊髄損傷の自律神経過反射でみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 頻脈
2. 高血圧
3. 低血糖
4. 顔面紅潮
5. 損傷レベルより下の発汗

問題.83

97.5%

老研式活動能力指標の質問項目のうち、手段的ADLに該当するのはどれか。

1. 「本や雑誌を読んでいますか」
2. 「年金などの書類が書けますか」
3. 「バスや電車を使って1人で外出できますか」
4. 「家族や友だちの相談にのることがありますか」
5. 「健康についての記事や番組に関心がありますか」

問題.84

47.5%

摂食嚥下障害への対応で正しいのはどれか。

1. 飲水にはぬるま湯を用いる。
2. 咽頭期障害では頭頸部伸展姿勢で嚥下する。
3. 口腔期障害に対しては高粘度の食物を用いる。
4. 先行期障害に対して食事のペースを指導する。
5. 鼻咽腔閉鎖不全に対してはShaker法を用いる。

問題.85

66.0%

上腕骨顆上骨折で正しいのはどれか。

1. 老年期に多い。
2. 原則として手術を行う。
3. 外反肘を生じることが多い。
4. 前腕の循環不全を生じやすい。
5. 肘関節屈曲位での受傷が多い。

問題.86

60.0%

特発性大腿骨頭壊死症について正しいのはどれか。

1. 小児に多い。
2. 手術適応例は少ない。
3. 両側性病変は稀である。
4. ステロイド薬使用者に多い。
5. 股関節内外旋可動域は保たれる。

問題.87

47.5%

家族性が孤発性よりも多いのはどれか。

1. Parkinson病
2. 多系統萎縮症
3. Huntington病
4. Lewy小体型認知症
5. 筋萎縮性側索硬化症

問題.88

67.5%

重症筋無力症について正しいのはどれか。

1. 起床時に症状が強い。
2. 悪性腫瘍の合併が多い。
3. 自己免疫性疾患である。
4. 女性よりも男性に多い。
5. 40歳以前の発症は稀である。

問題.89

90.0%

てんかんについて正しいのはどれか。

1. 半数以上が遺伝性である。
2. 睡眠不足は発作の誘因である。
3. 年齢とともに発症率が減少する。
4. 成人では症候性よりも特発性が多い。
5. 発作の持続時間は後遺障害と相関しない。

問題.90

87.5%

眼疾患とその病態の組合せで正しいのはどれか。

1. 白内障 — 硝子体の混濁
2. 麦粒腫 — 眼瞼の悪性腫瘍
3. Behçet病 — ぶどう膜の炎症
4. 流行性角結膜炎 — 色素上皮の剥離
5. 緑内障 — 眼圧の低下

問題.91

99.0%

10か月の正常児でみられるのはどれか。

1. Moro反射
2. 手の把握反応
3. 緊張性迷路反射
4. パラシュート反応
5. 非対称性緊張性頸反射

問題.92

76.0%

高齢者にみられる病態のうち、低栄養の関与が低いのはどれか。

1. 貧血
2. 褥瘡
3. 大腿骨骨折
4. サルコペニア
5. 虚血性心疾患

問題.93

85.0%

2型糖尿病の運動療法について誤っているのはどれか。

1. 有酸素運動が用いられる。
2. インスリン感受性を上昇させる。
3. 食事療法との併用が基本となる。
4. 尿中ケトン体が陽性の場合においても推奨される。
5. 実施にあたってはインスリンが十分に補充されている必要がある。

問題.94

52.0%

血友病について正しいのはどれか。

1. 脾腫がみられる。
2. 血小板数が減少する。
3. 点状紫斑がみられる。
4. 膝に関節症をきたす。
5. 自己免疫性疾患である。

問題.95

43.0%

リンパ浮腫について正しいのはどれか。

1. 腹水を伴う。
2. 利尿薬で治療する。
3. 蜂窩織炎になりやすい。
4. 肺塞栓症の原因の1つである。
5. 皮膚が線維化を起こすことは稀である。

問題.96

73.0%

精神遅滞を生じる疾患のうち、先天性代謝異常が原因であるのはどれか。

1. Down症候群
2. 結節性硬化症
3. 神経線維腫症
4. Turner症候群
5. フェニルケトン尿症

問題.97

85.0%

疾患と病変の組合せで正しいのはどれか。

1. Lewy小体型認知症 ―― 白質の病変
2. Alzheimer型認知症 ―― アミロイドの沈着
3. 血管性認知症 ―― 黒質の神経細胞脱落
4. 大脳皮質基底核変性症 ―― 運動ニューロン病変
5. 前頭側頭型認知症 ―― 大脳皮質の腫大神経細胞

問題.98

100.0%

境界性パーソナリティ障害にみられないのはどれか。

1. 不安定な感情
2. 孤立への欲求
3. 持続的な空虚感
4. 不明瞭な自己像
5. 繰り返す自傷行為

問題.99

43.0%

てんかんについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 単純部分発作は意識障害がみられる。
2. 欠神発作は過換気によって誘発される。
3. 特発性てんかんは脳の器質的病変が特定できる。
4. 複雑部分発作は側頭葉てんかんに多くみられる。
5. 全般発作は発作開始時にてんかん放電が大脳半球の片側にとどまっている。

問題.100

80.0%

疾患と治療の組合せで正しいのはどれか。

1. 身体化障害 — 系統的脱感作法
2. 強迫性障害 — 曝露反応妨害法
3. PTSD〈外傷後ストレス障害〉 — フラッディング
4. 心気障害 — 持続エクスポージャー法
5. 解離性健忘 — バイオフィードバック法