

問題.1

100.0%

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。

この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。


1. 筋力検査 2. 形態計測 3. 疼痛検査 4. 反射検査 5. 関節可動域検査

問題.2

89.5%

心電図（①～⑤）を別に示す。

心電図と所見の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。




10mm/mV 25mm/s

1. ①——心房細動
2. ②——洞性徐脈
3. ③——心室性期外収縮
4. ④——心房性期外収縮
5. ⑤——発作性上室性頻拍

問題.3

93.7%


関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で正しいのはどれか。2つ選べ。




1. 手伸展




2. 手関節屈



3. 母指掌側外転



4. 股伸展



5. 肩外旋

基本軸 —————


移動軸 - - - - -

1. 2. 3. 4. 5.


問題.4

51.6%

Danielsらの徒手筋力テストにおける段階3の検査の開始肢位で誤っているのはどれか。2つ選べ。



1. 頸部伸展




2. 左肩関節内施



3. 左股関節内転



4. 左股関節外施



5. 左股関節伸展


1. 2. 3. 4. 5.

問題.5

49.5%

脳皮質の感覚野の片側前額断の模式図を示す。

Penfieldの感覚神経の脳地図における足の局在はどれか。




1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.6

96.8%

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を別に示す。

最も出現しやすい症状はどれか。



1. 片麻痺 2. 失語症 3. 運動失調 4. 嚥下障害 5. 視野障害

問題.7

46.3%

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在はADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車椅子への移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。

Barthel Indexの得点はどれか。

1. 35点 2. 45点 3. 55点 4. 65点 5. 75点

問題.8

73.7%
68歳の男性。胸部大動脈解離（Stanford分類B型）に対して経カテーテル的ステントグラフト内挿術が行われたところ、術後に麻痺症状がみられた。ASIA評価表の結果を示す。
この患者のASIAの重症度スケールと脊髄の損傷部位との組合せで正しいのはどれか。

運動機能			感覚機能							
	左	右			触覚		痛覚			
					左	右	左	右		
C2			0～5の数字は MMTに準ずる NT=テスト不能		2	2	2	2	0 = 脱失 1 = 鈍麻 2 = 正常 NT = テスト不能	
C3				2	2	2	2			
C4				2	2	2	2			
C5	5	5		2	2	2	2			
C6	5	5		2	2	2	2			
C7	5	5		2	2	2	2			
C8	5	5		2	2	2	2			
T1	5	5		2	2	2	2			
T2				2	2	2	2			
T3				2	2	2	2			
T4				2	2	2	2			
T5				2	2	2	2			
T6			2	2	2	2				
T7			2	2	1	1				
T8			2	2	1	1				
T9			2	2	1	1				
T10			2	2	1	1				
T11			2	2	1	1				
T12			2	2	1	1				
L1			2	2	1	1				
L2	2	2	2	2	1	1				
L3	2	2	2	2	1	1				
L4	1	1	2	2	1	1				
L5	1	1	2	2	1	1				
S1	1	1	2	2	1	1				
S2			2	2	1	1				
S3			2	2	1	1				
S4-5			有 肛門随意収縮 (有/無)		2	2	有 肛門感覚 (有/無)		1	1
総計 32 + 32 = 64 運動スコア				総計 { 41 + 41 = 82 痛覚スコア (最大: 112)						
(最大) (50) (50) (100)				{ 56 + 56 = 112 触覚スコア (最大: 112)						
				(最大) (56) (56) (56) (56)						

- 1. B――脊髄の後方
- 2. C――脊髄の前方
- 3. C――脊髄の後方
- 4. D――脊髄の前方
- 5. D――脊髄の中心部

問題.9

84.2%


42歳の女性。感冒症状が出現して1週後から対称性に両手のしびれを自覚し、脱力が急速に近位部へと広がったため神経内科を受診した。上肢遠位部優位の脱力と四肢の深部腱反射消失を認め、Guillain-Barré症候群と診断された。検査所見として正しいのはどれか。

1. 髄液検査で細胞数が増加する。
2. 頸髄MRI検査で髄内信号異常を認める。
3. 末梢神経伝導検査で伝導速度が低下する。
4. 末梢神経の連続刺激でM波の振幅が漸増する。
5. 末梢神経刺激で誘発されるF波の潜時が短縮する。

問題.10

43.2%

4歳の男児。顕在性二分脊椎症による脊髄髄膜瘤の術後。立位の様子を図に示す。短い距離であれば独歩可能である。



1. L2 2. L3 3. L4 4. L5 5. S1

問題.11

74.7%


55歳の男性。2型糖尿病。身長170cm、体重85kg。
BMI〈body mass index〉を24にするために目標とすべき体重に最も近いのはどれか。

1. 65kg 2. 67kg 3. 69kg 4. 71kg 5. 73kg

問題.12

92.6%

21歳の女性。バレーボールで着地時に足関節痛を訴えた。検査法を図に示す。
この検査で調べる靭帯損傷として正しいのはどれか。




1. 三角靭帯損傷
2. 踵腓靭帯損傷
3. 前距腓靭帯損傷
4. 前脛腓靭帯損傷
5. 二分靭帯損傷

問題.13

83.2%

図に示す両側支柱付長下肢装具について正しいのはどれか。2つ選べ。




1. 外側支柱の高さは大転子から6cm下にする。
2. 膝継手はオフセット式である。
3. 下腿半月の位置は膝関節裂隙から2cm下にする。
4. 足継手はダブルクレンザックである。
5. 短下肢装具へと変更可能である。

問題.14

93.7%

19歳の男性。基礎疾患はない。自転車エルゴメーターを用いた運動強度を次第に上昇させて運動終点まで運動負荷試験を行ったときの酸素摂取量の測定結果を図に示す。

最大酸素摂取量 (mL/分) として正しいのはどれか。




1. 1,000 2. 1,500 3. 2,500 4. 3,500 5. 4,000

問題.15

54.7%

19歳の男性。基礎疾患はない。自転車エルゴメーターを用いた運動強度を次第に上昇させて運動終点まで運動負荷試験を行ったときの酸素摂取量の測定結果を図に示す。

全身持久力改善のために必要な運動負荷量（ワット）として正しいのはどれか。




1. 50 2. 100 3. 200 4. 300 5. 350

問題.16

67.4%

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。
ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.17

91.6%

45歳の女性。右変形性股関節症。先天性股関節脱臼の既往がある。1年前から荷重時の右股関節痛があり、2か月前から安静時痛も出現した。起居動作時や歩行時の疼痛が強くなってきたため受診した。

ADL指導として適切なのはどれか。


1. 階段は右足から昇段する。
2. 階段は左足から降段する。
3. できるだけ低い椅子に座る。
4. T字杖を使用する場合は左手に持つ。
5. 左足よりも右足を手前に引いて椅子から立ち上がる。

問題.18

13.7%

55歳の男性。トラックの荷台（2m）から転落して受傷した。来院時の足関節エックス線単純写真（A）及び冠状断CTとCTの模式図（B）を別に示す。

保存的に加療したとき、今後最も起こりやすい合併症はどれか。




1. 凹足 2. 踵足 3. 内反尖足 4. 変形性関節症 5. 無腐性骨壊死

問題.19

47.4%

生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。

股関節の図を示す。白蓋角はどれか。




1. a 2. b 3. c 4. d 5. e

問題.20

93.7%生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。

この患児の股関節のエックス線単純写真を別に示す。行うべき対応として適切なのはどれか。



右

左

1. 経過観察
2. ギプス固定
3. 観血的整復術
4. オーバーヘッド牽引
5. リーメンビューゲル装具

問題.21

11.6%

研究に関する用語と説明の組合せで正しいのはどれか。

1. 母集団——実際の研究の対象となるもの
2. 順序尺度——重さ、長さ、時間などの物理量を表す尺度
3. 名義尺度——大小関係や程度のような順位を有する尺度
4. 交絡因子——2つの要因の関連をかく乱する他の因子
5. Likert尺度——階層性を持った質問などに対する回答についての比率尺度

問題.22

41.1%

理学療法診療ガイドライン第1版（日本理学療法士協会）における理学療法介入の推奨グレード分類で、「行わないように勧められる科学的根拠がない」に該当する推奨グレードはどれか。

1. A 2. B 3. C1 4. C2 5. D

問題.23

64.2%

歩行について正しいのはどれか。

1. 身長が高いほど重複歩距離は短くなる。
2. 進行方向と足の長軸がなす角度を足角という。
3. 両脚支持期は歩行速度が速くなると長くなる。
4. 水平面上の進行方向に対して垂直方向の両足の開きを歩幅という。
5. 一側の踵が接地してから再び接地するまでの時間をステップ時間という。

問題.24

14.7%

腹臥位と比較した場合の背臥位の特徴について正しいのはどれか。

1. 誤嚥が生じやすい。
2. 上気道が狭窄しにくい。
3. 機能的残気量が減少しやすい。
4. 動脈血酸素分圧が低下しにくい。
5. 後肺底区の換気が改善しやすい。

問題.25

37.9%

主観的幸福感を評価できるのはどれか。

1. FIM
2. Katz Index
3. PGCモラールスケール改訂版
4. 老研式活動能力指標
5. SF-36

問題.26

92.6%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で前額面上の角度を測定するのはどれか。

1. 肩甲帯挙上 2. 肩内旋 3. 膝伸展 4. 頸部屈曲 5. 胸腰部回旋

問題.27

34.7%

Danielsらの肩関節の徒手筋カテストにおける段階と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

1. 屈曲の段階2――背臥位
2. 伸展の段階3――座位
3. 外旋の段階4――座位
4. 水平内転の段階2――腹臥位
5. 水平外転の段階2――側臥位

問題.28

53.7%

痛みを主症状とする疾患はどれか。2つ選べ。

1. Basedow病
2. Buerger病
3. Ménière病
4. 強直性脊椎炎
5. 急性灰白髄炎

問題.29

47.4%

記憶障害の評価法はどれか。

1. BADS 〈behavioural assessment of the dysexecutive syndrome〉
2. BIT
3. CAT 〈clinical assessment for attention〉
4. RBMT
5. WCST

問題.30

94.7%

右頭頂葉障害で特徴的な症状はどれか。

1. 警官の敬礼のまねができない。
2. 顔を見ただけでは誰か分らない。
3. 歯ブラシで歯を磨くことができない。
4. 料理を段取り良く行うことができない。
5. 服の左右の袖に腕を通すことができない。

問題.31

48.4%

歩行において下腿義足の初期内転角が不足しているときに生じる現象はどれか。

1. 断端外側遠位部に圧迫感が生じる。
2. 断端内側遠位部に圧迫感が生じる。
3. 踵接地時に義足足部が回旋する。
4. 義足の足部外側が浮き上がる。
5. 歩隔が広い。

問題.32

97.9%

関節リウマチの脊椎病変で最も多いのはどれか。

1. 黄色靱帯骨化
2. 環軸椎亜脱臼
3. 後縦靱帯骨化
4. 脊柱側弯
5. 腰椎椎間板ヘルニア

問題.33

96.8%

膝前十字靱帯損傷と合併して損傷しやすい部位はどれか。

1. 外側側副靱帯
2. 後十字靱帯
3. 後半月大腿靱帯
4. 膝蓋腱
5. 内側半月板

問題.34

100.0%

多発性硬化症において、頸部を前屈すると項部から下肢まで電撃痛が放散する徴候はどれか。

1. Gowers徴候
2. Lhermitte徴候
3. Patrick徴候
4. Tinel徴候
5. Uhthoff徴候

問題.35

41.1%

慢性閉塞性肺疾患の身体所見でみられやすいのはどれか。

1. 乾性咳嗽
2. 呼吸音低下
3. 肺野打診での濁音
4. 胸郭柔軟性の増加
5. 胸部聴診での捻髪音

問題.36

36.8%

平衡機能障害において、後索性や小脳性に比べ前庭性に最も関連する異常はどれか。

1. 眼振
2. 構音障害
3. 深部感覚障害
4. 耳鳴り
5. Romberg試験陽性

問題.37

75.8%

フレイルの高齢者の特徴について正しいのはどれか。

1. 筋量が増加する。
2. FBSが低値になる。
3. TUG時間が短くなる。
4. 長座位前屈距離が短くなる。
5. 運動負荷時のBorg指数が低値となる。

問題.38

94.7%

寒冷療法が痙縮を低下させる機序はどれか。

1. 筋組織の代謝の増大
2. 毛細血管透過性の増大
3. γ 神経線維の伝導速度の低下
4. δ 神経線維の伝導速度の低下
5. 筋紡錘からの求心性放電の増大

問題.39

85.3%

虚血性心疾患に対する運動療法が禁忌となるのはどれか。2つ選べ。

1. 安定狭心症
2. 代償性心不全
3. 活動性の心筋炎
4. I 度房室ブロック
5. コントロールされていない不整脈

問題.40

13.7%

認知症の周辺症状であるBPSD 〈behavioral and psychological symptoms of dementia〉はどれか。

1. 失行
2. 失認
3. 妄想
4. 見当識障害
5. 遂行機能障害

問題.41

27.4%

脊髄小脳変性症の患者で、歩行可能であるが伝い歩きが主であり、方向転換時に不安定になってしまう場合の歩行補助具として適切なのはどれか。

1. T字杖
2. 歩行車
3. 交互型歩行器
4. ウォーカーケイン
5. ロフストランド杖

問題.42

16.8%

変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版（日本理学療法士協会）で推奨グレードが最も低いのはどれか。

1. 協調運動
2. 減量療法
3. 有酸素運動
4. 筋力増強運動
5. ホットパック

問題.43

95.8%

手関節背屈位で手をついて転倒した患者のエックス線単純写真を別に示す。
この病態として正しいのはどれか。



1. chauffeur's骨折
2. Colles骨折
3. Galeazzi骨折
4. Monteggia骨折
5. Smith骨折

問題.44

64.2%

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1. 立位練習には装具を用いない。
2. 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。
3. 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。
4. 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。
5. 安静時に収縮期血圧が140mmHgを超えている場合は実施しない。

問題.45

93.7%

外傷性の前頭葉損傷による高次脳機能障害の患者に対する動作指導として適切なのはどれか。

1. 床からの起き上がりは、起き上がる方向を次々と変えながら練習する。
2. 歩行では、股・膝・足関節の運動に同時に注意を払うよう指導する。
3. 車椅子操作は、手順を1つずつ確認しながら進めるよう指導する。
4. 動作の手順を間違えた場合は、自分で気付くまで指摘しない。
5. 更衣動作では、上衣と下衣を交互に練習する。

問題.46

11.6%

重症筋無力症のクリーゼについて誤っているのはどれか。

1. 嚥下障害を認める。
2. 咳嗽機能が低下する。
3. 閉塞性換気障害をきたす。
4. 発症率は20%以上である。
5. ステロイドの急激な減量が原因となる。

問題.47

86.3%

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1. 車椅子の駆動練習
2. 割り座での座位練習
3. 歩行補助具なしでの歩行練習
4. バニーホッピングによる四つ這い移動練習
5. スタンディングボードを用いての立位練習

問題.48

34.7%

脳卒中後の在宅高齢者について、ICFにおける活動の評価に最も関連する情報はどれか。

1. 住環境
2. 家族関係
3. 認知機能
4. 外出時の交通手段
5. 活用可能なインフォーマルサービスの有無

問題.49

32.6%

介護予防における二次予防事業について正しいのはどれか。

1. 介護予防に関するボランティアを養成する。
2. 基本チェックリストによって対象者を決定する。
3. 要支援認定者を対象に運動機能向上教室を開催する。
4. 居宅を訪問し要介護度改善のための理学療法を行う。
5. 介護予防に関するパンフレットによる啓発活動を行う。

問題.50

64.2%

標準予防策〈standard precautions〉において、操作の後だけに手指衛生が必要なのはどれか。

1. 気管吸引
2. 血圧測定
3. 脈拍測定
4. 体温測定
5. ベッド柵の操作

問題.51

97.9%

骨について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 長骨の骨幹には髄腔がある。
2. 骨には緻密骨と海綿骨がある。
3. 骨芽細胞は骨吸収に関与している。
4. 骨の関節面は滑膜で覆われている。
5. 骨膜は骨の長軸方向の成長に関わる。

問題.52

83.0%

運動軸が2つの関節はどれか。

1. 手指PIP関節
2. 橈骨手根関節
3. 腕尺関節
4. 上橈尺関節
5. 肩甲上腕関節

問題.53

36.2%

外側腋窩隙を構成する筋はどれか。

1. 棘上筋
2. 棘下筋
3. 広背筋
4. 大円筋
5. 肩甲下筋

問題.54

89.4%

錐体路について誤っているのはどれか。

1. 大脳の運動皮質から始まる。
2. 大脳の基底核を経由する。
3. 大脳脚を経由する。
4. 大多数は延髄で交差する。
5. 脊髓の前角でシナプスを形成する。

問題.55

55.3%

内頸動脈から直接分岐しないのはどれか。

1. 眼動脈
2. 前大脳動脈
3. 中大脳動脈
4. 前交通動脈
5. 後交通動脈

問題.56

89.4%

筋と支配神経の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 円回内筋――尺骨神経
2. 深指屈筋――橈骨神経
3. 長掌筋――正中神経
4. 長母指伸筋――後骨間神経
5. 腕橈骨筋――前骨間神経

問題.57

72.3%

リンパ系について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 脾臓はリンパ液を濾過する。
2. 胸管は右鎖骨下静脈に流入する。
3. 腸管由来のリンパ液を乳糜という。
4. リンパ管には弁機構が存在しない。
5. 右下肢のリンパ液は胸管に流入する。

問題.58

95.7%

呼吸器の解剖について正しいのはどれか。

1. 細気管支には軟骨がある。
2. 胸膜腔は吸気時に拡大する。
3. 肺の栄養血管は肺動脈である。
4. 肺尖は鎖骨と同じ高さに位置する。
5. 右主気管支は左主気管支よりも短い。

問題.59

95.7%

解剖学的“嗅ぎタバコ入れ”で触診できるのはどれか。

1. 月状骨
2. 三角骨
3. 舟状骨
4. 小菱形骨
5. 有頭骨

問題.60

71.6%

細胞内小器官の働きで正しいのはどれか。

1. 滑面小胞体はATPを合成する。
2. Golgi装置は蛋白質を修飾する。
3. ミトコンドリアはグリコーゲンを分解する。
4. ライソソームは蛋白質を合成する。
5. リボソームは細胞内の物質を分解する。

問題.61

61.7%

反射と脳神経の組合せで正しいのはどれか。

1. 角膜反射——視神経
2. 対光反射——動眼神経
3. 前庭動眼反射——三叉神経
4. 下顎反射——顔面神経
5. 咽頭反射——副神経

問題.62

72.6%

伸張反射について正しいのはどれか。

1. 侵害受容反射である。
2. 単シナプス反射である。
3. 求心性線維はIb群線維である。
4. 遠心性線維は γ 運動線維である。
5. 筋紡錘内の錘内線維を支配するのは α 運動線維である。

問題.63

88.4%

運動単位について正しいのはどれか。

1. 運動単位には求心性線維が含まれる。
2. 1つの筋は単一の運動単位で構成される。
3. 神経支配比が小さいほど微細な運動ができる。
4. 随意運動時には大きな運動単位ほど先に活動を始める。
5. 伸張反射では弱い刺激で活動を開始するのは速筋である。

問題.64

76.8%

抗体を産生するのはどれか。

1. 好酸球
2. 好中球
3. 好塩基球
4. 形質細胞
5. マクロファージ

問題.65

92.6%

胆汁について正しいのはどれか。

1. 脂肪の吸収を抑制する。
2. 消化酵素が含まれる。
3. 食物の摂取によって分泌が増加する。
4. 胆汁酸塩の大部分は大腸で再吸収される。
5. 胆嚢で産生される。

問題.66

87.2%

排尿機構について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 排尿時には内尿道括約筋が収縮する。
2. 膀胱に尿が溜まり始めるとすぐに尿意を感じる。
3. 尿道を尿が通る知覚は排尿筋の収縮を抑制する。
4. 膀胱括約筋はノルアドレナリンの作用で収縮する。
5. 排尿を我慢するときには大脳皮質から抑制がかかる。

問題.67

80.9%

副甲状腺ホルモンで正しいのはどれか。

1. 骨吸収を促進する。
2. 好酸性細胞で分泌される。
3. リンの再吸収を促進する。
4. 重炭酸イオンの再吸収を促進する。
5. 遠位尿細管でのカルシウム再吸収を抑制する。

問題.68

27.7%

摂食嚥下の際の運動で正しいのはどれか。

1. 嚥下後の呼吸は吸気から再開される。
2. 口腔内の食塊は反射運動で咽頭へ送られる。
3. 嚥下反射が起こると舌骨は下方に移動する。
4. 食塊の咽頭への送り込み時に口蓋帆張筋が緊張する。
5. 食塊の食道への送り込み時に輪状咽頭筋が収縮する。

問題.69

56.8%

等張性運動について正しいのはどれか。

1. 角速度は一定である。
2. 等尺性運動に比べ血圧が上昇しやすい。
3. 等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。
4. 等尺性運動に比べ心拍数が増加しやすい。
5. 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こる。

問題.70

51.6%

頸椎の伸展に作用する筋はどれか。

1. 頸長筋
2. 頭長筋
3. 頸板状筋
4. 後斜角筋
5. 前頭直筋

問題.71

93.6%

肩甲骨の下方回旋に作用する筋はどれか。

1. 前鋸筋
2. 小胸筋
3. 小円筋
4. 棘下筋
5. 鎖骨下筋

問題.72

19.1%

正常な膝関節を屈曲したときの最終域感で正しいのはどれか。

1. 虚性 2. 筋性 3. 骨性 4. 靱帯性 5. 軟部組織性

問題.73

95.7%

足の外側縦アーチを形成するのはどれか。2つ選べ。

1. 踵骨 2. 距骨 3. 舟状骨 4. 立方骨 5. 中間楔状骨

問題.74

76.6%

正常歩行について正しいのはどれか。

1. 肩関節は同側の踵接地時に最大屈曲位となる。
2. 膝関節は踵接地直後に伸展する。
3. 骨盤は水平面において回旋運動をする。
4. 骨盤は前額面において水平に保たれる。
5. 骨盤は遊脚側へ側方移動する。

問題.75

91.5%

運動時の生体反応で正しいのはどれか。


1. 冠血流は低下する。
2. 腎血流は増加する。
3. グリコーゲン分解が促進される。
4. 尿へのナトリウム排泄は促進される。
5. 酸素含有量の動静脈較差は減少する。

問題.76

100.0%

歩行障害がある患者の頭部MRIのT1強調冠状断像（画像）を別に示す。腰椎穿刺を行い髄液を排出させたところ、歩行障害が改善した。

最も考えられるのはどれか。



1. Parkinson病
2. 正常圧水頭症
3. 脳梗塞
4. 脳出血
5. 慢性硬膜下血腫

問題.77

95.8%

熱傷について正しいのはどれか。

1. 第Ⅰ度熱傷では熱感のみられない。
2. 浅達性第Ⅱ度熱傷では瘢痕を残す。
3. 深達性第Ⅱ度熱傷の水疱底は発赤している。
4. 第Ⅲ度熱傷では疼痛が著明である。
5. 鼻咽腔内に煤が見られたときは気道熱傷が疑われる。

問題.78

25.5%

非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉の副作用として正しいのはどれか。

1. 胃潰瘍
2. 低血糖
3. 多幸感
4. 骨粗鬆症
5. 中心性肥満

問題.79

91.5%

欲求を満たせないときに、正反対の欲求を発展させ心的平衡を保とうとする防衛機制はどれか。

1. 抑圧
2. 否認
3. 行動化
4. 合理化
5. 反動形成

問題.80

91.5%

古典的条件付けの原理を用いた治療法はどれか。

1. 曝露法
2. 認知再構成法
3. トークンエコノミー法
4. セルフモニタリング法
5. 社会生活技能訓練〈SST〉

問題.81

100.0%

作動記憶〈ワーキングメモリー〉の説明として適切なのはどれか。

1. 数日間保持される。
2. 非宣言的記憶の1つである。
3. 技能の記憶として機能する。
4. 生活史の記憶として機能する。
5. 情報の処理と保持を同時に行う。

問題.82

46.8%

運動制御における小脳の役割で正しいのはどれか。

1. 一連の動作の企画
2. 運動プランの切り替え
3. 記憶に基づく運動の修飾
4. 視覚情報を運動指令に変換
5. 自発的な行為のプログラミング

問題.83

93.6%

脊髄ショック期の徴候として正しいのはどれか。

1. 温痛覚解離
2. 痙性四肢麻痺
3. 肛門括約筋反射消失
4. 深部腱反射亢進
5. 排尿反射亢進

問題.84

100.0%

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作の組合せで正しいのはどれか。
ただし、機能残存レベルより下位は完全麻痺とする。

1. C4——万能カフを用いた食事
2. C5——前方移乗
3. C6——橈側-手掌握り
4. C7——更衣
5. C8——長下肢装具での歩行

問題.85

65.3%

Falot四徴症で起こる血管異常はどれか。

1. 大動脈騎乗
2. 大動脈狭窄
3. 冠動脈狭窄
4. 肺静脈閉塞
5. 肺動脈弁逆流

問題.86

88.4%

スパイロメトリーで計測できないのはどれか。

1. 1秒量
2. 予備吸気量
3. 1回換気量
4. 最大吸気量
5. 機能的残気量

問題.87

76.6%

関節リウマチについて正しいのはどれか。

1. 股関節などの大関節に初発する。
2. 間質性肺炎を合併することが多い。
3. 罹患関節の症状は非対称性に現れる。
4. 半数以上にリウマトイド結節が認められる。
5. 血清アルカリフォスファターゼが高値となる。

問題.88

53.2%

免疫不全によって生じやすい疾患はどれか。

1. 肝性脳症
2. ペラグラ脳症
3. Wernicke脳症
4. トキソプラズマ症
5. Creutzfeldt-Jakob病

問題.89

100.0%

Lewy小体型認知症に伴うことが多いのはどれか。

1. 幻視
2. 失語症
3. 高血圧
4. 聴覚障害
5. 入眠障害

問題.90

97.9%

Guillain-Barré症候群について正しいのはどれか。

1. 50%以上で再発する。
2. 脱髄型と軸索型がある。
3. アルコール多飲が原因である。
4. ビタミンB₁ 欠乏によって起こる。
5. 歩行可能まで回復する症例は25%以下である。

問題.91

76.6%

Duchenne型筋ジストロフィーの呼吸障害について正しいのはどれか。

1. 咳をする力は保たれる。
2. ロスぼめ呼吸が有効である。
3. 側弯症は呼吸機能に影響しない。
4. 動脈血二酸化炭素分圧が上昇する。
5. 呼吸不全は5歳以下から生じることが多い。

問題.92

78.7%

腎不全における透析療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 透析対象者数は年々増加傾向にある。
2. 血液透析よりも腹膜透析の割合が多い。
3. 昼間透析よりも夜間透析の割合が多い。
4. 透析導入の原因疾患は糖尿病性腎症が最も多い。
5. 透析対象者の死亡原因として肝不全が最も多い。

問題.93

76.6%

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。

1. 食後すぐに運動を開始する。
2. 冷汗は高血糖発作の予兆である。
3. インスリン投与中は運動療法を中止する。
4. 空腹時血糖値が高いほど運動量を増やす。
5. 増殖性網膜症がある場合には運動強度を軽くする。

問題.94

63.8%

乳癌について正しいのはどれか。

1. 月経前に疼痛が増悪する。
2. 好発部位は乳房の外側上部である。
3. 好発年齢は20歳代である。
4. 5年生存率は40%前後である。
5. 我が国における発症率は欧米の3倍である。

問題.95

80.0%

介護保険について正しいのはどれか。

1. 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
2. 65歳未満では給付を受けられない。
3. 要介護認定には主治医意見書が必要である。
4. 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
5. ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。

問題.96

57.4%

高齢初発てんかんについて正しいのはどれか。

1. 特発性てんかんが多い。
2. 患者数は減少傾向にある。
3. 部分発作を呈することが多い。
4. てんかん重積状態に至ることはない。
5. 抗てんかん薬が無効であることが多い。

問題.97

78.7%

器質性精神障害について正しいのはどれか。

1. 妄想はみられない。
2. 安定した人格を認める。
3. 記憶障害はみられない。
4. 抗精神病薬は投与しない。
5. 心理的要因の影響を受ける。

問題.98

42.6%

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の依存について正しいのはどれか。

1. 中高年者にはみられない。
2. 身体依存は形成されない。
3. 離脱症状としてせん妄がある。
4. 常用量であれば依存は形成されない。
5. 作用時間の長い薬剤の方が依存を形成しやすい。

問題.99

97.9%

「自分がやっていることなのに、自分がやっている感じがしない」と訴える患者の症状はどれか。

1. 恐怖症
2. 拒絶症
3. 離人症状
4. 心気症状
5. 感情鈍麻

問題.100

93.6%

親しい人間関係を構築できず、奇異な考え方や風変わりな行動が継続してみられ、パーソナリティ障害を指摘された。
最も考えられるのはどれか。

1. 演技性パーソナリティ障害
2. 依存性パーソナリティ障害
3. 統合失調型パーソナリティ障害
4. 猜疑性〈妄想性〉パーソナリティ障害
5. シゾイド〈統合失調質〉パーソナリティ障害

問題.1

51.6%

36歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷のため3日前に入院した。病室訪問時、呼びかけても閉眼しており、大きな声で呼びかけたが開眼せず、体を揺さぶって初めて開眼したがすぐに閉眼してしまう。

JCS〈Japan coma scale〉で評価した意識レベルはどれか。


1. II-10 2. II-20 3. II-30 4. III-100 5. III-200

問題.2

44.2%

20歳の男性。自転車エルゴメーターを用いて、1分間に20ワット増加させるランプ負荷法にて心肺運動負荷試験を行った。その際の分時換気量、二酸化炭素排泄量および酸素摂取量の変化を図に示す。

①から③までの期間および④と⑤の時点に生じている生体の変化として正しいのはどれか。2つ選べ。




1. ①では動脈血酸素分圧が上昇する。
2. ②では乳酸が増加する。
3. ③では動脈血pHが急激に上昇する。
4. ④では無酸素性のATP産生が加わる。
5. ⑤では動脈血酸素飽和度が低下し始める。

問題.3

72.6%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で正しいのはどれか。2つ選べ。




1. 2. 3. 4. 5.

問題.4

23.2%

Danielsらの徒手筋カテストにおける触診部位として正しいのはどれか。




1. 腓腹筋




2. 短腓骨筋



3. 前脛骨筋



4. 後脛骨筋



5. 大腿筋膜張筋


1. 2. 3. 4. 5.

問題.5

91.6%

車椅子乗車中に体幹を右に傾けたまま寝てしまい、アームレストに右上腕外側を長時間圧迫していた。目が覚めると、図のように右手の斜線部分に感覚鈍麻を認めた。

絞扼性損傷を受けた神経はどれか。




1. 腋窩神経 2. 筋皮神経 3. 尺骨神経 4. 正中神経 5. 橈骨神経

問題.6

80.0%

脳出血後の頭部CTを別に示す。
最も生じやすい症状はどれか。



1. 系列的な動作が順番通りにできない。
2. 脳出血発症前のことが思い出せない。
3. 左からの刺激に反応しない。
4. 左手の感覚が脱失する。
5. 人の顔が区別できない。

問題.7

92.6%

45歳の男性。左大腿切断後。大腿義足を用いた歩行練習中、左立脚中期に過度の腰椎前弯が観察された。
原因として正しいのはどれか。

1. 義足長が長過ぎる。
2. 足継手の後方バンパーが弱過ぎる。
3. ソケットが前方に位置し過ぎている。
4. ソケットの初期屈曲角が不足している。
5. 膝継手の摩擦が弱過ぎる。

問題.8

89.5%

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージ下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0～20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。

装具の調整で正しいのはどれか。

1. 足継手の可動範囲を背屈0～5度に設定する。
2. スウェーデン式膝装具を併用する。
3. Tストラップを追加する。
4. 外側ウェッジを入れる。
5. 装具の踵を高くする。


問題.9

28.4%


脳卒中機能評価法〈SIAS〉の麻痺側運動機能の評定で2点となるのはどれか。




1




2



3



4



5

1. 2. 3. 4. 5.

問題.10

92.6%

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、精神内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。

現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1. 褥瘡
2. 振動覚低下
3. 眼球運動障害
4. 膀胱直腸障害
5. Hoffmann反射陽性

問題.11

42.1%

52歳の男性。2型糖尿病。足のしびれと血糖値の上昇のため入院となった。検査結果では空腹時血糖305mg/dL、尿検査でケトン体陽性であった。虚血性心疾患と腎機能障害は認めない。

この患者への対応で正しいのはどれか。

1. 安静臥床とする。
2. 1日200kcalを消費させる運動を行う。
3. 1RMの80%で下肢の筋力増強運動を行う。
4. 病棟内歩行などの軽度な負荷にとどめる。
5. 目標心拍数115/分で有酸素運動を20分間行う。

問題.12

98.9%

50歳の男性。1か月前から腰痛と右殿部痛が生じ、徐々に右下肢の疼痛が増悪してきた。腰部MRIを別に示す。
この病態で陽性になるのはどれか。



1. Apley test
2. Lasègue test
3. Lachman test
4. Thompson test
5. McMurray test

問題.13

100.0%

25歳の男性。野球の試合で走塁中に大腿後面に違和感と痛みが生じた。直後に整形外科を受診したところ、大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。
この時点での物理療法で適切なのはどれか。


1. 交代浴
2. 極超短波
3. アイシング
4. ホットパック
5. パラフィン浴

問題.14

7.4%

身体計測の結果を図に示す。

厚さ3cmのクッションを用いる場合の車椅子の基本寸法で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 背もたれ高：45cm
2. 肘掛けの高さ：23cm
3. シート長（座長）：43cm
4. 膝窩からフットプレート：38cm
5. 座幅：40cm

問題.15

18.9%

58歳の女性。5年前に子宮頸癌の手術を行った。2年前から右下肢にリンパ浮腫が出現し、弾性ストッキングを着用していた。1年前から安静臥位で右下肢を挙上しても浮腫が改善せず、皮膚が固くなり非圧窩性浮腫が認められたため、週1回外来で理学療法を実施していた。2日前に蜂窩織炎を発症し、現在、薬物療法中である。

対応として適切なのはどれか。

1. 患部の冷却
2. スキンケア休止
3. 圧迫下での下肢運動
4. 用手的リンパドレナージ
5. 経皮的電気刺激療法〈TENS〉

問題.16

46.3%

4歳の男児。痙直型両麻痺。しばしば割り座で座る。パニーホッピングと交互性パターンの四つ這いを併用して移動する。PCW〈postural control walker〉を用いた歩行練習を実施している。

この児に対する遊びの指導内容で最も適切なのはどれか。



1




2



3



4



5

1. 2. 3. 4. 5.

問題.17

97.9%

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一步目が思うように前に出ず、歩き出してから前方に転びそうになることが多いという。

在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 両下肢に弾性包帯を装着する。
2. 足関節に重錘バンドを装着する。
3. 一步目を小さく前に出すよう指導する。
4. 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。
5. かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

問題.18

57.9%

36歳の男性。手にバスケットボールが当たって受傷した。来院時の手指の写真（A）とエックス線単純写真（B）とを別に示す。

この病態として正しいのはどれか。




1. 槌指
2. ばね指
3. ボクサー骨折
4. ムチランス変形
5. Bennett骨折

問題.19

83.2%

65歳の男性。身長165cm。

図のように歩行補助具として杖の長さを調整する際、指標とすべき杖先の位置を示すaの距離と肘の角度bの組合せて正しいのはどれか。



1. 20cm——100度
2. 15cm——100度
3. 15cm——150度
4. 5cm——150度
5. 5cm——180度

問題.20

73.7%

71歳の男性。うっ血性心不全。2週前から顔面と下肢とに浮腫がみられるようになり、安静にしても呼吸困難があるため入院となった。入院2日後、離床練習開始となった。

医療面接における質問で重要性が低いのはどれか。

1. 「咳や痰はないですか」
2. 「仰向けで寝られますか」
3. 「喉が渇きやすいですか」
4. 「息切れは少なくなりましたか」
5. 「手足のむくみは少なくなりましたか」

問題.21

61.1%

入院患者100人の収縮期血圧を集計した標本Aの分布は、中央値や平均値の近くに測定値が集中していた。他の値より極端に小さい値が1つあり、再度確認したところ誤記入であることが分かったため、この値を除いて標本Bを作った。

標本Aに比べ標本Bの方が大きい統計量はどれか。

1. 分散
2. 最大値
3. 最頻値
4. 平均値
5. 標準偏差

問題.22

34.7%

疾患の予防対策で正しいのはどれか。

1. 健康診断は一次予防である。
2. ワクチン接種は一次予防である。
3. 禁煙は二次予防である。
4. 合併症の予防は二次予防である。
5. 糖尿病の運動療法は三次予防である。

問題.23

24.2%

端座位で膝関節を完全伸展位から屈曲した際に生じるのはどれか。

1. 前十字靱帯は弛緩する。
2. 内側側副靱帯は緊張する。
3. 屈曲初期に脛骨は外旋する。
4. 内側半月板よりも外側半月板の方が大きく移動する。
5. 屈曲初期にすべり運動が生じ、続いて転がり運動が加わる。

問題.24

45.3%

加齢に伴う生理的变化について正しいのはどれか。

1. 肝重量の増加
2. 自己抗体形成の低下
3. 抗原抗体反応の低下
4. 血漿アルブミン量の増加
5. クレアチニンクリアランスの増加

問題.25

13.7%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）の運動方向と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

1. 肩屈曲――前腕回外位
2. 股内旋――膝関節伸展位
3. 股外転――股関節伸展位
4. 膝屈曲――股関節伸展位
5. 足底屈――膝関節伸展位

問題.26

44.2%

異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 鶏歩――脛骨神経麻痺
2. 踵足歩行――脳卒中
3. 動揺歩行――小脳性運動失調症
4. 大殿筋歩行――筋ジストロフィー
5. はさみ脚歩行――正常圧水頭症

問題.27

43.2%

アテトーゼ型脳性麻痺で残存しやすい反射はどれか。

1. Galant反射
2. 吸啜反射
3. 自動歩行
4. 手掌把握反射
5. 探索反射

問題.28

76.8%

慢性腰痛に対する認知行動療法でないのはどれか。

1. 痛みの有無を頻回に尋ねる。
2. 腰痛の不安を解消する映像を見せる。
3. 腰を反らせても痛まない成功体験を繰り返させる。
4. 痛みがあってもできる活動があることを認識させる。
5. 適切な身体活動は痛みを増悪させないことを説明する。

問題.29

81.1%

内頸動脈系と比べて椎骨脳底動脈系の血流障害でみられやすいのはどれか。2つ選べ。

1. 複視
2. 運動失調
3. Broca失語
4. 一過性黒内障
5. 半側空間無視

問題.30

57.9%

脳卒中片麻痺の垂脱臼に対する肘屈曲型アームスリングのチェックアウトで正しいのはどれか。

1. 頸部で上肢を支持する。
2. 肩関節は内旋位とする。
3. 前腕は回外位とする。
4. 手関節は掌屈位とする。
5. 手部は肘関節より低くする。

問題.31

52.6%

Heberden結節の好発部位はどれか。

1. 遠位指節間関節
2. 遠位橈尺関節
3. 近位指節間関節
4. 近位橈尺関節
5. 中手指節関節

問題.32

91.6%

腱板断裂損傷の徒手検査で陽性となる可能性が最も高いのはどれか。

1. anterior apprehension test
2. drop arm test
3. Morley test
4. Thompson test
5. Yargason test

問題.33

91.6%

肘関節屈曲位から伸展方向へ他動的に動かしたときに、可動域の全範囲にわたり抵抗感が感じられたが、運動は容易であった。

MAS〈modified Ashworth scale〉における筋緊張のレベルはどれか。

1. 0 2. 1 3. 1+ 4. 2 5. 3

問題.34

52.6%

動脈血ガス分析結果がpH7.32、PaCO₂ 33Torr、PaO₂ 83Torr、HCO₃⁻ 17mEq/Lである場合に予想される呼吸様式はどれか。

1. 徐呼吸
2. 頻呼吸
3. 無呼吸
4. Kussmaul呼吸
5. Cheyne-Stokes呼吸

問題.35

84.2%

がん患者の身体機能評価尺度はどれか。

1. Barthel Index
2. FBS
3. FIM
4. KPS〈Karnofsky performance scale〉
5. mRS

問題.36

32.6%

神経因性膀胱のうち低活動性膀胱を呈する疾患はどれか。

1. 脳出血
2. 胸髄損傷
3. 多発性硬化症
4. 頸椎後縦靱帯骨化症
5. 糖尿病性自律神経障害

問題.37

93.7%

高齢者の転倒リスクに関連性が低いのはどれか。

1. 男性 2. 視力障害 3. 下肢筋力低下 4. 認知機能低下 5. 複数回転倒の既往

問題.38

92.6%

超音波療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 周波数は深達度に影響しない。
2. 成長期の小児の骨端線への照射は避ける。
3. 水中の照射では温熱効果は期待できない。
4. 骨セメントを使用している部位は照射を避ける。
5. 空気中の照射では皮膚とプローブを約10cm離す。

問題.39

91.6%

機器を使用しなければ実施できないのはどれか。

1. 等尺性運動
2. 漸増抵抗運動
3. 等運動性運動
4. 遠心性等張性運動
5. 求心性等張性運動

問題.40

94.7%

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1. 装具は外して行う。
2. 車椅子の後方から介助する。
3. 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。
4. ベッドに対して車椅子を平行に設置する。
5. ベッドの高さは車椅子の座面よりも高くしておく。

問題.41

95.8%

IADLに含まれるのはどれか。2つ選べ。

1. 階段の昇降をする。
2. 髪を洗う。
3. 掃除をする。
4. 電話をかける。
5. 髭を剃る。

問題.42

53.7%

関節リウマチの開張足を矯正する装具で最も適切なのはどれか。

1. 外側ウェッジ
2. 外側Tストラップ
3. 踵補高
4. 逆Thomasヒール
5. メタルサルアーチサポート

問題.43

67.4%

義足におけるシリコンライナー使用の利点はどれか。

1. ソケットトリムラインの上昇
2. ピストン運動減少
3. 装着の簡便性
4. 皮膚への刺激
5. 発汗促進

問題.44

92.6%

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1. 片麻痺に対するCI療法
2. 抗うつ状態に対する認知行動療法
3. 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法
4. 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習
5. 半側空間無視に対するプリズム適応療法

問題.45

64.2%

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5（厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による）に対する理学療法で優先度が高いのはどれか。

1. 座位保持練習
2. 体幹装具の使用
3. 徒手での咳嗽介助
4. 下肢の漸増抵抗運動
5. 椅子からの立ち上がり練習

問題.46

92.6%

末梢神経障害による猿手で使用する装具はどれか。

1. コックアップ・スプリント
2. 短対立装具
3. 虫様筋カフ
4. 手関節駆動式把持装具
5. BFO

問題.47

34.7%

Down症児の初期の腹臥位での移動の特徴はどれか。

1. 股関節の外転
2. 伸展側下肢の尖足傾向
3. 上肢の過剰な引き込み
4. 緊張性迷路反射の残存
5. 下肢運動の交互性の欠如

問題.48

86.3%

摂食嚥下障害に対するShaker法について正しいのはどれか。

1. 喉頭挙上筋群の筋力増強を行う。
2. 食道入口部を閉鎖する。
3. 呼吸を数秒間止める。
4. 頭部を伸展する。
5. 端座位で行う。

問題.49

87.4%

人工呼吸器を使用している重症心身障害児の気管吸引を実施する上で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 気管吸引後、聴診する。
2. 気管吸引時にはSpO₂を確認する。
3. 吸引圧は20kPa（150mmHg）以上に設定する。
4. 吸引カテーテルは気管分岐部の先まで挿入する。
5. 気管吸引は1回の吸引につき30秒間程度持続して行う。

問題.50

49.5%

問診で用いる質問の種類とその具体例の組合せで正しいのはどれか。

1. 閉じた質問〈クローズド・クエスチョン〉——「痛むのは膝内側ですか、外側ですか、それとも前ですか」
2. 開いた質問〈オープン・クエスチョン〉——「今日の具合はいかがですか」
3. 中立的質問〈ニュートラル・クエスチョン〉——「痛みはありますか」
4. 多項目の質問〈マルチプル・クエスチョン〉——「膝の痛みについて詳しく教えてください」
5. 焦点型質問〈フォーカスト・クエスチョン〉——「お名前を教えてください」

問題.51

60.0%

股関節で正しいのはどれか。

1. 顆状関節である。
2. 大腿骨頸部は関節包外にある。
3. 寛骨臼は前外側を向いている。
4. 寛骨臼は腸骨のみで構成される。
5. 腸骨大腿靭帯が関節包後面から補強している。

問題.52

68.1%

脊柱管の前壁に沿って走行する靭帯はどれか。

1. 黄色靭帯
2. 棘間靭帯
3. 棘上靭帯
4. 後縦靭帯
5. 前縦靭帯

問題.53

100.0%

大脳の領野と部位の組合せで正しいのはどれか。

1. 一次運動野——前頭葉
2. 一次体性感覚野——側頭葉
3. 聴覚野——頭頂葉
4. Broca野——側頭葉
5. Wernicke野——後頭葉

問題.54

87.4%

中脳について誤っているのはどれか。

1. 黒質は被蓋と大脳脚との間に位置する。
2. 皮質脊髄路は被蓋を通過する。
3. 上小脳脚で小脳に連絡する。
4. 大脳脚は腹側に位置する。
5. 中脳蓋は背側に位置する。

問題.55

36.2%

視神経から視覚野に至る視覚伝導路の順で正しいのはどれか。

1. 視索→視交叉→視放線→外側膝状体
2. 視索→視放線→外側膝状体→視交叉
3. 視交叉→視索→外側膝状体→視放線
4. 視放線→視交叉→視索→外側膝状体
5. 視交叉→外側膝状体→視索→視放線

問題.56

95.7%

デルマトームと支配髄節の組合せで正しいのはどれか。

1. 母指——第3頸髄節
2. 乳頭——第4胸髄節
3. 臍——第8胸髄節
4. 膝——第1腰髄節
5. 肛門——第1仙髄節

問題.57

57.9%

後腹膜腔に存在しないのはどれか。

1. 横行結腸
2. 腎臓
3. 十二指腸
4. 膵臓
5. 副腎

問題.58

74.5%

泌尿器の解剖について正しいのはどれか。

1. 膀胱括約筋は平滑筋である。
2. 膀胱尖には膀胱三角が位置する。
3. 膀胱底は膀胱の前方に位置する。
4. 尿管は総腸骨動脈の後方を通る。
5. 尿管壁は粘膜と外膜の2層からなる。

問題.59

96.0%

平衡聴覚器の構造で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 鼓室は外耳にある。
2. 骨迷路は内耳にある。
3. 耳管は内耳にある。
4. ツチ骨は中耳にある。
5. 膜迷路は中耳にある。

問題.60

25.5%

脈と脈拍の触知部位との組合せで正しいのはどれか。

1. 浅側頭動脈——外耳孔の後方
2. 総頸動脈——胸鎖乳突筋の外縁
3. 上腕動脈——上腕遠位部の上腕二頭筋腱の外側
4. 大腿動脈——鼠径部の腸腰筋の外側
5. 足背動脈——足背の長母指伸筋腱と長指伸筋腱の間

問題.61

55.8%

骨格筋の構造で筋収縮時に長さが一定なのはどれか。2つ選べ。

1. A帯 2. H帯 3. I帯 4. Z帯 5. 筋節

問題.62

61.7%

視覚について正しいのはどれか。

1. 一次視覚野は側頭葉にある。
2. 視細胞の杆体は色覚を司る。
3. 空間分解能は全視野で均一である。
4. 暗順応は明順応より速やかに行われる。
5. 毛様体筋は近くを見るときに収縮する。

問題.63

91.5%

副交感神経の作用で収縮する筋はどれか。

1. 立毛筋 2. 排尿筋 3. 血管平滑筋 4. 瞳孔散大筋 5. 内肛門括約筋

問題.64

46.8%

胃での栄養素の消化・吸収で正しいのはどれか。

1. ペプシンは脂質を分解する。
2. セクレチンは胃液分泌を促進する。
3. 内因子はビタミンB₁₂の吸収に関与する。
4. 胃内の停滞時間は糖類より脂肪の方が長い。
5. 胃液分泌の増加は食物が胃に到達してから起こる。

問題.65

80.0%

排便機構について正しいのはどれか。

1. 排便時には横隔膜が弛緩する。
2. 排便に関与する神経は下殿神経である。
3. 直腸平滑筋と内肛門括約筋は同時に収縮する。
4. 直腸壁が加圧されると骨盤神経が刺激される。
5. 直腸の収縮を促す神経伝達物質はアドレナリンである。

問題.66

62.1%

エリスロポエチンの生産を促進するのはどれか。

1. 血圧の低下
2. 血糖値の低下
3. 腎機能の低下
4. 動脈血酸素分圧の低下
5. 血中カルシウム濃度の低下

問題.67

57.9%

ホルモン分泌について正しいのはどれか。

1. プロラクチンは乳腺から分泌される。
2. 卵胞刺激ホルモンは視床下部から分泌される。
3. エストロゲンは下垂体ホルモン分泌を促進する。
4. 黄体化ホルモンはプロゲステロンの分泌を促進する。
5. 性腺刺激ホルモン放出ホルモンは下垂体から分泌される。

問題.68

16.8%

心電図の波形で正しいのはどれか。

1. P波はHis束の興奮を意味する。
2. PR間隔は房室伝導時間である。
3. QRS波はPurkinje線維の興奮を意味する。
4. ST間隔は心室内興奮到達時間である。
5. T波は心室の脱分極を意味する。

問題.69

91.6%

随意運動の制御に関与する部位はどれか。

1. 海馬 2. 歯状核 3. 松果体 4. 青斑核 5. 扁桃体

問題.70

100.0%

咀嚼筋はどれか。2つ選べ。

1. 咬筋 2. 側頭筋 3. 口輪筋 4. 小頬骨筋 5. オトガイ筋

問題.71

88.4%

肩関節外転90度での水平屈曲に作用する筋はどれか。


1. 広背筋 2. 大円筋 3. 棘下筋 4. 烏口腕筋 5. 肩甲挙筋

問題.72

84.2%

下腿中央の横断面を図に示す。

矢印の筋の作用で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 膝関節の屈曲
2. 足の底屈
3. 足の内がえし
4. 母指の屈曲
5. 第2～5指の屈曲

問題.73

85.1%

安静時の呼吸運動で正しいのはどれか。

1. 呼気時に腹圧は上昇する。
2. 吸気時に横隔膜は下降する。
3. 呼気時に外肋間筋は収縮する。
4. 吸気時に気道抵抗は上昇する。
5. 胸郭下部は前後方向の動きが左右方向より大きい。

問題.74

76.8%

運動学習について正しいのはどれか。

1. 動機付けが高いほどパフォーマンスが向上する。
2. 覚醒レベルが高いほどパフォーマンスが向上する。
3. 学習によるパフォーマンスの向上は直線的に起こる。
4. 2種類の運動課題間に類似性があるほど転移の影響は大きくなる。
5. パフォーマンスの向上がみられなくなることは運動学習の停止を意味する。

問題.75

91.6%

正常細胞と比較したときの悪性腫瘍細胞の特徴はどれか。


1. 増殖が遅い。
2. 分化の程度は低い。
3. 染色体異常は少ない。
4. 核分裂の頻度は少ない。
5. 核細胞質比は小さい。

問題.76

63.2%

訓練開始時に熱感があり、体温は38.5℃であった。胸部を聴診したところ右下肺野に、水泡音が聞かれた。この患者の胸部エックス線写真を別に示す。

最も考えられるのはどれか。



右

左

1. 喘息
2. 大葉性肺炎
3. 特発性肺線維症
4. 慢性閉塞性肺疾患
5. びまん性汎細気管支炎

問題.77

46.8%

ショックの発症初期に徐脈がみられるのはどれか。

1. アナフィラキシー反応
2. 血管迷走神経反射
3. 重症熱傷
4. 大量出血
5. 敗血症

問題.78

97.9%

Eriksonによる発達段階で学童期に獲得すべき課題はどれか。

1. 勤勉性
2. 積極性
3. 自立性
4. 親密性
5. 同一性

問題.79

95.7%
中学生の心理発達における特徴はどれか。

- 1. 性の相違を理解する。
- 2. 自我同一性が完成する。
- 3. 教師や指導者に従順である。
- 4. 第二性徴への戸惑いがある。
- 5. 友人関係より親子関係を重視する。

問題.80

91.5%
訓練療法でないのはどれか。

- 1. 森田療法
- 2. シェイピング
- 3. 認知行動療法
- 4. 系統的脱感作法
- 5. 来談者中心療法

問題.81

95.7%
無意識的な葛藤を洞察して精神症状を和らげようとするのはどれか。

1. 催眠療法
2. 行動療法
3. 芸術療法
4. 自律訓練法
5. 精神分析療法

問題.82

69.5%
失語症分類と特徴の組合せで正しいのはどれか。

	失語症	流暢性	理解
1.	Broca失語	非流暢	軽～中等度の障害
2.	Wernicke失語	流暢	良好
3.	健忘失語	非流暢	良好
4.	超皮質性運動失語	流暢	重度の障害
5.	伝導失語	非流暢	中等～重度の障害

1.
2.
3.
4.
5.

問題.83

34.0%

FIMで4点（最小介助）となるのはどれか。

1. アームスリングをつけてもらっている。
2. 食器に残った食べ物をかき集めてもらう。
3. 移乗時に介助者から軽く引き上げてもらう。
4. トイレトペーパーをあらかじめ折ってもらう。
5. シャワーを浴びる前にお湯の温度を調節してもらう。

問題.84

92.6%

廃用症候群によって低下しないのはどれか。

1. 筋力
2. 肺活量
3. 心拍数
4. 身体活動性
5. 胃腸管運動

問題.85

97.9%

知能検査はどれか。

1. ADHD-RS 〈attention deficit hyperactivity disorder rating scale〉
2. CARS 〈childhood autism rating scale〉
3. JDDST-R 〈改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査〉
4. PEP-3 〈psychoeducational profile-3rd edition〉
5. WISC-III

問題.86

53.7%

変形性膝関節症の進行に伴う関節構成体の変化で正しいのはどれか。

1. 滑膜の肥厚
2. 骨嚢胞の消失
3. 軟骨下骨の肥厚
4. 関節裂隙の拡大
5. 関節靱帯の緊張

問題.87

100.0%

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1. 運動麻痺重症例よりも軽症例に多い。
2. 女性の発症率は男性の約2倍である。
3. 脳卒中発症後6か月以降に生じる。
4. 発症頻度は40%程度である。
5. 複合性局所疼痛症候群type I に分類される。

問題.88

83.2%

Parkinsonについて正しいのはどれか。

1. 喫煙者に多い。
2. 再発と寛解とを繰り返す。
3. 孤発性症例が家族性症例より多い。
4. 30～40歳代での発症が最多である。
5. 我が国の有病率はAlzheimer病より多い。

問題.89

74.5%

皮膚筋炎について正しいのはどれか。

1. 先行感染を伴う。
2. 悪性腫瘍を伴う。
3. 胸腺腫を合併する。
4. 嚥下障害はきたさない。
5. 遠位筋優位の筋力低下をきたす。

問題.90

91.5%

神経麻痺と起こり得る症状の組合せで正しいのはどれか。

1. 腋窩神経麻痺——下垂指
2. 肩甲上神経麻痺——Phalen徴候
3. 前骨間神経麻痺——涙滴徴候
4. 大腿神経麻痺——下垂足
5. 副神経麻痺——翼状肩甲

問題.91

84.2%

胃癌について正しいのはどれか。

1. 噴門部に好発する。
2. 放射線療法が有効である。
3. 組織型で最も多いのは腺癌である。
4. 我が国では発症率が増加している。
5. 我が国の悪性腫瘍による死因の第一位である。

問題.92

38.3%

末梢血に大型の赤血球が出現するのはどれか。

1. 再生不良性貧血
2. 消化管出血
3. 鉄欠乏性貧血
4. 溶血性貧血
5. 葉酸欠乏性貧血

問題.93

14.9%

我が国におけるメタボリックシンドロームの診断基準に含まれないのはどれか。

1. 中性脂肪
2. 空腹時血糖
3. 収縮期血圧
4. ウエスト周囲径
5. LDLコレステロール

問題.94

53.2%

肝炎について正しいのはどれか。

1. A型肝炎の慢性化率は約20%である。
2. B型肝炎ワクチンは感染の予防に有効である。
3. C型肝炎のキャリアはHCV抗原が陽性である。
4. 慢性肝炎の原因ウイルスで最も多いのはB型である。
5. 慢性肝炎においては急性増悪期を過ぎても運動制限を行う。

問題.95

100.0%

慢性閉塞性肺疾患の患者の胸部エックス線写真で特徴的なのはどれか。

1. 横隔膜挙上
2. 心陰影拡大
3. 肋間腔の狭小化
4. 肺野の透過性亢進
5. シルエットサイン

問題.96

68.4%

注意欠如・多動性障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 薬物療法は行わない。
2. 男児よりも女児に多い。
3. 生育歴の聴取が重要である。
4. 二次性の精神症状に注意が必要である。
5. 成人期において診断されることはない。

問題.97

95.8%

驚きなどの情動によって脱力発作が誘発されるのはどれか。

1. 睡眠時驚愕症
2. ナルコレプシー
3. むずむず脚症候群
4. レム睡眠行動障害
5. 睡眠時無呼吸症候群

問題.98

100.0%

神経性無食欲症について正しいのはどれか。

1. 頻脈になる。
2. 無月経になる。
3. 恥毛が脱落する。
4. 体温が上昇する。
5. 行動が不活発になる。

問題.99

57.4%

ACT〈assertive community treatment〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 医師を中心としたチームを組む。
2. 毎日24時間のサービス提供体制である。
3. 短時間であっても頻回に利用者への訪問を行う。
4. スタッフ1人当たりのケースを50人程度にする。
5. 地域生活が安定した軽度の精神障害者を対象とする。

問題.100

97.9%

うつ病の患者への対応として適切でないのはどれか。

1. 急性期には休息をとらせる。
2. 自殺しないように約束させる。
3. 重要な問題の決定を先延ばしさせる。
4. 抗うつ薬の副作用について説明する。
5. うつ病であることを伝えずに伏せておく。