



問題.1

87.1%


関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 肩外転




2. 肘伸展



3. 股伸展



4. 股内転



5. 足背屈


— : 基本軸
— : 移動軸

1. 肩外転 2. 肘伸展 3. 股伸展 4. 股内転 5. 足背屈

問題.2

82.9%
32歳の女性。下痢症状の後に四肢の脱力が出現したGuillain-Barré症候群で、入院2週後のGuillain-Barré障害スコアが5（人工呼吸管理）であった。グラフは表の3項目の合計点と歩行の関係を示す。
この患者が発症6か月後に歩行不可能な確率はどれか。

項 目	内 容	評価点
年 齢	60 歳以上	1 点
	41 歳～60 歳未満	0.5 点
	40 歳以下	0 点
発症に先立つ下痢の有無	あり	1 点
	なし	0 点
入 院 2 週 後 の Guillain-Barré 障害スコア	0 または 1	1 点
	2	2 点
	3	3 点
	4	4 点
	5	5 点




1. 20%
2. 30%
3. 60%
4. 80%
5. 90%

問題.3

95.7%

検査方法を図に示す。
この検査方法はどれか。




1. Oberテスト
2. Patrickテスト
3. SLRテスト
4. Thomasテスト
5. Thompsonテスト

問題.4

90%

検査方法を図に示す。

この検査で陽性となるのはどれか。




1. アキレス腱断裂
2. 膝蓋骨脱臼
3. 大腿筋膜張筋短縮
4. 大腿四頭筋短縮
5. ハムストリングス損傷


問題.5

77.1%


関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で誤っているのはどれか。




1. 手尺屈




2. 指屈曲(MP)



3. 指外転



4. 母指対立



5. 母指掌側外転

— : 基本軸
— : 移動軸


1. 手尺屈 2. 指屈曲 (MP) 3. 指外転 4. 母指対立 5. 母指掌側外転

問題.6

100%

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていなくて立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。

この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いはどれか。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤


問題.7

35.7%

正中神経を手首と肘部で電気刺激した運動神経伝導検査の波形を示す。

この運動神経伝導検査から考えられる病態はどれか。

ただし、手首と肘部の刺激部位間の距離は175mmである。（正常範囲：振幅3.5mV以上、運動神経伝導速度48m/s以上）



1. 運動ニューロン変性 2. 軸索変性 3. 神経筋接合部異常 4. 正常 5. 脱髄

問題.8

97.1%

3歳の男児。脳性麻痺による右片麻痺。背臥位から図のように起き上がる。影響する反射はどれか。



1. Moro反射
2. Galant反射
3. 緊張性迷路反射
4. 交差性伸展反射
5. 非対称性緊張性頸反射

問題.9

87.1%


水中での立位姿勢を図に示す。
体重の約50%が免荷されるのはどれか。




1




2



3



4



5

1. 2. 3. 4. 5.

問題.10

91.4%

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。

この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1. II-10 2. II-20 3. II-30 4. III-100 5. III-200

問題.11

98.6%

45歳の男性。会社の事務職として働いていたが、自転車運転中に自動車にはねられ、びまん性軸索損傷を受傷した。身体機能に問題がなかったため、1か月後に以前と同じ部署である庶務に復職した。仕事を依頼されたことや仕事の方法は覚えているが、何から手を付ければ良いのか優先順位が付けられず、周囲の同僚から仕事を促されてしまう状況である。考えられるのはどれか。

1. 記憶障害 2. コミュニケーション障害 3. 失行 4. 失認 5. 遂行機能障害

問題.12

97.1%

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいはどれか。2つ選べ。




1. ベット上で起き上がる



2. 浴槽に入る



3. シャツを着る



4. 床から立ち上がる



5. 階段を上る

1. ベット上で起き上がる
2. 浴槽に入る
3. シャツを着る
4. 床から立ち上がる
5. 階段を上る

問題.13

64.3%

82歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。
疑うべき疾患はどれか。



右

左


1. 股関節脱臼
2. 坐骨骨折
3. 大腿骨近位部骨折
4. 恥骨結合離開
5. 恥骨骨折

問題.14

100%

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。
閉塞している動脈はどれか。

頭部 MRI



頭部 MRA




1. 右前大脳動脈 2. 右中大脳動脈 3. 右内頸動脈 4. 右椎骨動脈 5. 脳底動脈

問題.15

90%

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。
この患者に生じやすい症状はどれか。

頭部 MRI



頭部 MRA




1. 観念失行 2. 左右失認 3. 純粋失読 4. 病態失認 5. 観念運動失行

問題.16

80%

42歳の男性。スキーの滑走中に転倒し、腕神経叢の図に示す部位を損傷した。前腕外側（橈側）と手の掌側の母指から環指に感覚鈍麻がある。

筋力低下をきたす筋はどれか。2つ選べ。



1. 円回内筋 2. 三角筋 3. 小指外転筋 4. 上腕三頭筋 5. 上腕二頭筋

問題.17

28.6%

6歳の男児。顕在性二分脊椎症による脊髄膜瘤の術後。大腿四頭筋、大内転筋、前脛骨筋の作用はしている。大腿二頭筋、大殿筋は作用していない。短下肢装具による杖方向が可能である。


予測されるSharrardの分類はどれか。

1. I 群 2. II 群 3. III 群 4. IV 群 5. V 群

問題.18

82.9%

図に示す排痰体位に対応する肺区域で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 肺尖区 (S¹)
2. 後上葉区 (S²)
3. 上一下葉区 (S⁶)
4. 前肺底区 (S⁸)
5. 後肺底区 (S¹)

問題.19

98.6%

78歳の男性。慢性閉塞性肺疾患の急性増悪により人工呼吸器管理中である。意識レベルJCS〈Japan Coma Scale〉II-20、体温37.5℃、呼吸数は26回／分、努力性呼吸を認める。

二次的合併症の予防目的で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1. 呼吸介助
2. 体位排痰法
3. ベッドアップ
4. 関節可動域運動
5. 徒手的抵抗運動

問題.20

100%

図に示す姿勢のうち、労働災害予防を目的とした動作指導で適切な作業姿勢はどれか。



1



2



3



4



5

1. 2. 3. 4. 5.

問題.21

87.1%

治療についてのインフォームドコンセントで適切なのはどれか。

1. 治療者は専門用語で説明する。
2. 患者の同意内容は文書で保存する。
3. 治療者は患者の要求があってから説明する。
4. 判断能力に関わらず患者の決定が優先される。
5. 患者は正当な理由がなければ同意を撤回できない。

問題.22

38.6%

SOAPで正しいのはどれか。

1. Oには患者の訴えを記載する。
2. Sには検査データを記載する。
3. Pには検査結果の解釈を記載する。
4. 問題志向型診療記録として記載する。
5. Aには理学療法プログラムを記載する。

問題.23

28.6%

固定負荷にて行う運動負荷試験はどれか。

1. Bruce法上
2. ランプ負荷法
3. 6分間歩行テスト
4. マスターシングルテスト
5. シャトルウォーキングテスト

問題.24

98.6%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で足部の内がえしを測定する。基本軸と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1. 下腿軸への垂直線－足底面
2. 下腿軸への垂直線－足背面
3. 腓骨への垂直線－足底面
4. 腓骨への垂直線－足背面
5. 腓骨への垂直線－第5中足骨

問題.25

80%

関節可動域が正常な患者に対し、Danielsらの徒手筋力テストの段階5の検査で、軽度屈曲位で抵抗を加えるのはどれか。

1. 肩関節伸展
2. 肘関節伸展
3. 手関節伸展
4. 股関節伸展
5. 頸部複合伸展

問題.26

100%

検査結果を表に示す。

6か月前と比べてバランス機能の低下を示すのはどれか。

	検査項目	6 か月前	現在
1.	FBS	47 点	33 点
2.	TUG	25 秒	9 秒
3.	10 m 歩行時間	45 秒	12 秒
4.	片脚立位時間	10 秒	55 秒
5.	Functional Reach Test	6 cm	20 cm

1. 2. 3. 4. 5.

問題.27

81.4%

認知症の原因になりにくい疾患はどれか。

1. 葉酸欠乏症
2. 正常圧水頭症
3. 慢性硬膜下血腫
4. 甲状腺機能亢進症
5. ビタミンB₁₂ 欠乏症

問題.28

85.7%

歩行周期で立脚相直前から活動し、踵接地時に大きな活動を示す下肢の筋はどれか。2つ選べ。

1. 下腿三頭筋 2. 前脛骨筋 3. 大腿四頭筋 4. 長母指屈筋 5. 腸腰筋

問題.29

98.6%

内反足に対する最も適切な靴の補正はどれか。

1. Thomasヒール
2. 内側フレアヒール
3. クッションヒール
4. メタルザルバー
5. 外側ソールウェッジ

問題.30

100%

関節リウマチにおいて、余暇、仕事、身の回りのことの3つの要素から機能状態の程度を示す指標はどれか。

1. CMI
2. DAS28 〈disease activity score 28〉
3. Larsen分類
4. Sharp score
5. Steinbrockerのclass分類

問題.31

97.1%

尺骨骨幹部骨折と橈骨小頭の脱臼を生じるのはどれか。

1. Barton骨折
2. Colles骨折
3. Galeazzi骨折
4. Monteggia骨折
5. Smith骨折

問題.32

68.6%

疲労骨折が最も多いのはどれか。

1. 脛骨
2. 骨盤
3. 中足骨
4. 腓骨
5. 腰椎

問題.33

98.6%

上腕二頭筋腱炎で陽性所見を呈する検査はどれか。

1. Adsonテスト
2. Apleyテスト
3. Finkelsteinテスト
4. Kempテスト
5. Yergasonテスト

問題.34

50%

脳卒中片麻痺患者に用いられる評価法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. FMA 〈Fugl-Meyer assessment〉はADLの評価を含む。
2. JSS 〈Japan Stroke Scale〉は関節可動域の評価を含む。
3. mRSは歩行速度の評価を含む。
4. NIHSSは意識状態の評価を含む。
5. SIASは非麻痺側機能の評価を含む。

問題.35

40%

Parkinson病に対する包括的な評価指標であるUPDRSの評価項目でないのはどれか。

1. 感覚
2. 姿勢
3. 歩行
4. 知的機能
5. ジスキネジア

問題.36

14.3%

GMFMで正しいのはどれか。

1. GMFM-88は間隔尺度として使用される。
2. 各項目は0～4 の5段階評価で判定する。
3. 脳性麻痺のための標準化された発達評価である。
4. 健常5歳児であれば達成可能な項目で構成される。
5. Item Mapの使用により認知機能の判定が可能である。

問題.37

92.9%

NYHA分類で正しいのはどれか。

1. 5段階分類である。
2. 自覚症状により重症度を分類する。
3. I度では心疾患を有し、日常生活で疲労、呼吸困難がある。
4. II度では日常生活以下の労作で疲労、呼吸困難がある。
5. IV度では安静時に心不全症状はみられない。

問題.38

82.9%

成人に対する一次救命処置で正しいのはどれか。

1. 胸骨圧迫は1 分間に100～120回のテンポで行う。
2. 胸骨圧迫は胸骨が1cm程度沈む強さで圧迫する。
3. AEDによる電気ショック後には胸骨圧迫を行わない。
4. 人工呼吸（口対口呼吸）の吹込みは続けて10回以上行う。
5. 胸骨圧迫をしながらAEDによる電気ショックを与える。

問題.39

57.1%

筋力増強トレーニングの効果で正しいのはどれか。

1. 自動介助運動では効果は得られない。
2. 筋肥大が生じるまで効果は得られない。
3. 最大抵抗を用いれば月1回の運動で効果が得られる。
4. 等運動性運動ではトレーニングに用いた運動速度付近で大きな効果が得られる。
5. 最大筋力に対して極めて弱い抵抗運動であっても回数を増やすことで効果が得られる。

問題.40

17.1%

超音波療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 強度は0.5～2.5W/cm²面が推奨される。
2. 透過深度は周波数に反比例して浅くなる。
3. 照射される超音波は小さな導子ほど拡散する。
4. ビーム不均等率が高い場合、導子をゆっくり動かす。
5. 温熱効果を目的とする場合には照射時間率5%を選択する。

問題.41

68.6%

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 過度の腰椎前弯－股関節伸展拘縮
2. 外転歩行－股関節屈曲拘縮
3. 義足膝の不安定－股関節伸展筋力低下
4. 伸び上がり歩行－股関節内転筋力低下
5. 分回し歩行－股関節内転拘縮

問題.42

10%

軽い運動から激しい運動へと運動強度を徐々に増加させるときの正常な循環応答で正しいのはどれか。

1. 運動中の心拍数変化は主に副交感神経活動の亢進によって生じる。
2. 運動強度の増加に伴い心筋への血流配分率が大幅に増加する。
3. 運動強度が増加しても動脈血酸素含量はほぼ一定である。
4. 運動開始から軽い運動中の心拍出量増加は主に心拍数の増加によって生じる。
5. 中等度から激しい運動中の一回拍出量は直線的に増加する。

問題.43

97.1%

腹圧性尿失禁に対する筋力増強練習の対象で最も優先すべき筋群はどれか。

1. 腹筋群
2. 殿筋群
3. 骨盤底筋群
4. 脊柱起立筋群
5. 股関節外旋筋群

問題.44

87.1%

小児でVolkmann拘縮を起こしやすいのはどれか。

1. 上腕骨顆上骨折
2. 上腕骨外顆骨折
3. 上腕骨近位部骨折
4. 上腕骨骨幹部骨折
5. 上腕骨内側上顆骨折

問題.45

91.4%

偽関節を生じやすいのはどれか。2つ選べ。

1. 手の舟状骨骨折
2. 鎖骨骨折
3. 肋骨骨折
4. 大腿骨頸部骨折
5. 踵骨骨折

問題.46

20%

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1. 痙縮の減弱
2. 褥瘡の予防
3. 異常疼痛の抑制
4. 骨粗鬆症の予防
5. 消化管運動の促進

問題.47

75.7%

アテトーゼ型脳性麻痺に残存しやすい原始反射はどれか。

1. 吸啜反射
2. 手掌把握反射
3. 陽性支持反射
4. 交叉性伸展反射
5. 対称性緊張性頸反射

問題.48

62.9%

閉塞性動脈硬化症で正しいのはどれか。

1. 冷感はない。
2. 安静時痛はない。
3. しびれ感はない。
4. 間欠性跛行は体幹前傾で改善する。
5. 好発部位は大腿動脈から膝窩動脈である。

問題.49

90%

廃用症候群で正しいのはどれか。

1. 加齢による影響は少ない。
2. 二次性サルコペニアを認める。
3. 筋萎縮は上肢に強くみられる。
4. 進行しても摂食嚥下機能は保たれる。
5. 高齢者では高アルブミン血症を認める。

問題.50

75.7%

身体的フレイルの特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 疲労感が増す。
2. BMIが増加する。
3. 動作が緩慢になる。
4. 寝たきり状態である。
5. Barthel Indexのスコアが高くなる。

問題.51

14.6%

頸椎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 環椎に椎体はない。
2. 軸椎に上関節面はない。
3. 第4頸椎に鈎状突起はない。
4. 第5頸椎の横突孔は椎骨動脈が貫通しない。
5. 第7頸椎の棘突起先端は二分しない。

問題.52

92.9%

脳神経と支配筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 滑車神経—眼輪筋
2. 三叉神経—咬筋
3. 顔面神経—広頸筋
4. 舌咽神経—舌筋
5. 副神経—側頭筋

問題.53

95.1%

脳の解剖で誤っているのはどれか。

1. 黒質は中脳にある。
2. 海馬は側頭葉にある。
3. 中小脳脚は中脳と小脳を連絡する。
4. 脳梁は左右の大腦半球を連絡する。
5. 中心溝は前頭葉と頭頂葉の間にある。

問題.54

60.0%

第7胸椎の高さの水平断で最も腹側にあるのはどれか。

1. 食道
2. 右心室
3. 右心房
4. 左心室
5. 左心房

問題.55

73.2%

消化器の解剖で正しいのはどれか。

1. 胃の筋層は2層の平滑筋からなる。
2. 空腸は回腸より長い。
3. 食道は3か所の狭窄部をもつ。
4. 十二指腸は腸間膜を有する。
5. 内肛門括約筋は横紋筋からなる。

問題.56

90.0%

呼吸器で正しいのはどれか。

1. 鼻前庭は粘膜で覆われている。
2. 気管は第4胸椎の高さから始まる。
3. 上気道は鼻腔から咽頭までをいう。
4. 右主気管支は左主気管支よりも細い。
5. 気管支の分岐角は右主気管支より左主気管支が大きい。

問題.57

80.5%

腎臓で誤っているのはどれか。

1. 遠位尿細管は集合管につながる。
2. 尿細管は腎小体の尿管極に始まる。
3. Henle係蹄は小葉間静脈につながる。
4. Bowman嚢は糸球体を包んでいる。
5. 輸入細動脈は糸球体につながる。

問題.58

15.7%

女性生殖器で誤っているのはどれか。

1. 卵管は卵子を取り込む。
2. 受精は卵管膨大部で起こる。
3. 受精卵は子宮内膜に着床する。
4. 排卵直後の卵胞は黄体となる。
5. 卵細胞は卵巣から卵管のリンパ管に放出される。

問題.59

9.8%

ホルモンの産生で正しいのはどれか。

1. エリスロポエチンは骨髄で産生される。
2. グルカゴンはLangerhans〈ランゲルハンス〉島B細胞で産生される。
3. ソマトスタチンは黄体で産生される。
4. トリヨードサイロニンは上皮小体で産生される。
5. バソプレシンは視床下部で産生される。

問題.60

77.1%

末梢神経と体表からの触知部位との組合せで正しいのはどれか。

1. 腕神経叢—胸鎖乳突筋の胸骨頭と鎖骨頭の間
2. 正中神経—上腕近位部で烏口腕筋の外側
3. 尺骨神経—肘頭と上腕骨内側上顆の間
4. 脛骨神経—外果とアキレス腱の間
5. 総腓骨神経—膝窩部で半腱様筋腱の内側

問題.61

25.7%

遺伝情報伝達で正しいのはどれか。

1. リボゾームRNAはATP産生に関与する。
2. DNAではアデニンはシトシンと結合している。
3. 核の中のすべてのDNAの塩基配列をゲノムという。
4. DNAから転移RNA〈tRNA〉に塩基配列が転写される。
5. 伝令RNA〈mRNA〉上では2個の塩基の組合せが1つの暗号の単位を形成する。

問題.62

51.4%

骨格筋の筋収縮で正しいのはどれか。

1. 筋小胞体には Na^+ を貯蔵している。
2. 活動電位は筋収縮に遅れて発生する。
3. Ca^{2+} が筋小胞体に取り込まれると筋収縮が起こる。
4. ミオシン頭部の角度が戻るときにATPの加水分解が起こる。
5. 神経筋接合部での興奮の伝達は神経と筋との間で双方向性である。

問題.63

85.7%

左上肢の感覚と伝導路が通る部位との組合せで正しいのはどれか。

1. 圧覚—左脊髓前索
2. 位置覚—右脊髓後索
3. 温覚—右脊髓後索
4. 振動覚—左脊髓側索
5. 痛覚—右脊髓側索

問題.64

65.9%

交感神経の機能で正しいのはどれか。

1. 膵液分泌を促進する。
2. 心収縮力を減少させる。
3. 直腸平滑筋を収縮させる。
4. 水晶体の厚さを減少させる。
5. 肝臓でのグリコーゲン合成を促進する。

問題.65

50.0%

心筋の再分極に最も影響するのはどれか。

1. Ca^{2+} 電流
2. K 電流
3. Na 電流
4. 細胞外電流
5. ペースメーカー電流

問題.66

55.7%

末梢組織への酸素供給を増やすのはどれか。

1. pHの低下
2. 体温の低下
3. PCO_2 の低下
4. 赤血球数減少
5. ヘモグロビン濃度減少

問題.67

85.4%

摂食嚥下の咽頭期に生じる現象で正しいのはどれか。

1. 吸気
2. 咀嚼
3. 喉頭蓋反転
4. 鼻咽腔開放
5. 輪状咽頭筋収縮

問題.68

82.9%

集合管における尿の濃縮に関わるホルモンはどれか。

1. グルカゴン
2. メラトニン
3. オキシトシン
4. パラトルモン
5. アルドステロン

問題.69

94.3%

代謝で誤っているのはどれか。

1. 呼吸商〈RQ〉は摂取する栄養素によって異なる。
2. 特異動的作用〈SDA〉とは食物摂取後の体温上昇である。
3. 基礎代謝量〈BM〉は同性、同年齢ならば体表面積に比例する。
4. エネルギー代謝率〈RMR〉は基礎代謝量を基準とした運動強度である。
5. 代謝当量〈MET〉は安静臥位時の代謝量を基準とした運動強度である。

問題.70

80.5%

肩甲骨を胸郭に押し付ける作用のある筋はどれか。

1. 大胸筋
2. 広背筋
3. 前鋸筋
4. 鎖骨下筋
5. 肩甲挙筋

問題.71

31.4%

膝蓋骨で正しいのはどれか。

1. 関節面は外側面に比べて内側面で広い。
2. 膝関節屈曲位で可動性が高くなる。
3. 膝関節伸筋の作用効率を高めている。
4. 膝関節の屈曲に伴い上方に引かれる。
5. 膝関節の伸展に伴い接触面は上方に移動する。

問題.72

62.9%


膝関節の運動で正しいのはどれか。

1. 側副靱帯は屈曲時に緊張する。
2. 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。
3. 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。
4. 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。
5. 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

問題.73

78.0%

腰椎への負荷が大きい順に並んでいるのはどれか。2つ選べ。



1. $A > B > C$
2. $A > C > B$
3. $B > A > C$
4. $B > C > A$
5. $C > B > A$

問題.74

88.6%

努力性呼気時に働く筋はどれか。2つ選べ。

1. 腹直筋
2. 横隔膜
3. 外肋間筋
4. 内肋間筋
5. 胸鎖乳突筋

問題.75

58.6%

病原体と腫瘍発生との組合せで誤っているのはどれか。

1. A型肝炎ウイルス－肝細胞癌
2. Epstein Barrウイルス－Burkittリンパ腫
3. HTLV-I－成人T細胞白血病
4. ヒトパピローマウイルス－子宮頸癌
5. ヘリコバクター・ピロリ菌－胃癌

問題.76

63.4%

神経原性ショックの特徴はどれか。

1. 交感神経の緊張
2. 徐脈
3. 心拍出量の増加
4. 中心静脈圧の上昇
5. 皮膚温の低下

問題.77

97.1%

肺気量で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 1秒率=1秒量÷%肺活量
2. 機能的残気量=予備吸気量+残気量
3. 最大吸気量=1回換気量+予備吸気量
4. 残気量=全肺気量-肺活量
5. 肺活量=予備吸気量+予備呼気量

問題.78

100%

正しい組合せはどれか。

1. A.Beck—愛着理論
2. J.Bowlby—認知療法
3. R.Liberman—系統的脱感作
4. C.Rogers—来談者中心療法
5. J.Wolpe—社会生活技能訓練

問題.79

61.0%

ライフステージにおける成人期後期(50～60歳ころ)の特徴で適切なのはどれか。

1. 親しい人の死を経験し、自分の死についても受容的になる。
2. 心理社会的な猶予期間（モラトリアム）といえる時期である。
3. 仕事や家庭を持つようになり、社会人としての成長をみせる。
4. 経験の蓄積により判断力は向上を続けるが記憶力は低下を示す。
5. 社会的役割の減少や身体的不自由など多くの喪失体験がみられる。

問題.80

78.0%

交通事故により下肢を骨折したが、リハビリテーションの回数が少ないことで、治療者に強い不満をぶつけてしまった。その後「先生は私を嫌っている」と考える防衛機制はどれか。

1. 回避
2. 投影
3. 否認
4. 抑圧
5. 合理化

問題.81

100%

ある患者の心理検査の一部を示す。この検査法はどれか。

子供の頃、私は 空想の世界に浸っていました。
私はよく人から よく自分勝手だと言われていました。
家の暮らし は窮屈に感じるので、早く独り暮らしをしたいです。
私の失敗 が多いので、できるだけ思い出したくありません。

1. HTP 〈House-tree-person test〉
2. SCT
3. MMPI
4. P-Fスタディ
5. ASQ 〈Autism Screening Questionnaire〉

問題.82

92.7%

ASIAの評価法における脊髄の髄節とそのkey muscleの組合せで正しいのはどれか。

1. C6－上腕二頭筋
2. C8－上腕三頭筋
3. T1－小指外転筋
4. L1－大腿四頭筋
5. L5－前脛骨筋

問題.83

92.9%

絞扼性神経障害における障害部位と症候の組合せで正しいのはどれか。

1. 手根管－下垂手
2. 足根管－足背の異常感覚
3. 梨状筋－下腿内側の異常感覚
4. 肘部管－涙滴徴候
5. 腓骨頭－下垂足

問題.84

100%

失行の検査でないのはどれか。

1. お茶を入れてもらう。
2. 金槌で釘を打ってもらう。
3. 日常物品の名前を答えてもらう。
4. 「おいでおいで」の動作をしてもらう。
5. 歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてもらう。

問題.85

26.8%

性染色体異常で発症するのはどれか。2つ選べ。

1. Down症候群
2. Marfan症候群
3. Turner症候群
4. Williams症候群
5. Klinefelter症候群

問題.86

87.8%

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査〈JDDST-R〉の個人—社会領域で最も早く可能になるのはどれか。

1. 手を洗ってふく。
2. 簡単なお手伝い。
3. コップから飲む。
4. 上着などを脱ぐ。
5. ビスケットを自分で食べる。

問題.87

29.3%

帯状疱疹で正しいのはどれか。

1. 発疹は左右対称にみられる。
2. 感染後数日で発症する。
3. Koplik斑が出現する。
4. アロディニアを伴う。
5. 帯状絞扼感を伴う。

問題.88

100%

骨折の名称と部位との組合せで正しいのはどれか。

1. Bennett骨折—脛骨
2. Duverney骨折—橈骨
3. Jefferson骨折—大腿骨
4. Malgaigne骨折—骨盤
5. Smith骨折—上腕骨

問題.89

61.0%

脳血管障害に対して行われる検査で、誤っているのはどれか。

1. 頸動脈狭窄の検索に頸部MRAが用いられる。
2. 出血病変の検索にMRIのT2*(スター)強調像が用いられる。
3. 陳旧性梗塞の検索にMRIの拡散強調像が用いられる。
4. 脳塞栓の原因検索にHolter心電図が用いられる。
5. 脳動脈瘤の検索に脳血管撮影が用いられる。

問題.90

75.6%

Parkinson病でみられないのはどれか。

1. 便秘
2. 運動失調
3. 動作緩慢
4. 静止時振戦
5. レム睡眠行動障害

問題.91

95.1%

下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた。最も考えられる疾患はどれか。

1. 多発性筋炎
2. 視神経脊髄炎
3. 閉塞性動脈硬化症
4. 筋萎縮性側索硬化症
5. Guillain-Barré症候群

問題.92

46.3%

慢性閉塞性肺疾患患者に推奨されないのはどれか。

1. 低脂肪食
2. 在宅酸素療法
3. 上肢の筋カトレーニング
4. 下肢の筋カトレーニング
5. インフルエンザワクチン接種

問題.93

61.0%

細菌の産生する毒素が症状の原因となるのはどれか。2つ選べ。

1. 赤痢菌
2. サルモネラ
3. ボツリヌス菌
4. カンピロバクター
5. インフルエンザ

問題.94

61.0%

熱傷で正しいのはどれか。

1. 熱傷面積はⅠ、Ⅱ、Ⅲ度すべての面積を合わせて計算する。
2. Ⅰ度熱傷では水疱がみられる。
3. 浅達性Ⅱ度熱傷では水疱底は蒼白である。
4. 深達性Ⅱ度熱傷では疼痛がみられる。
5. Ⅲ度熱傷では創底から上皮化が起こる。

問題.95

70.0%

リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく、積極的なリハビリテーションを実施しない場合はどれか。

1. 安静時脈拍130／分
2. 安静時体温37.5℃
3. 安静時酸素飽和度92%
4. 安静時収縮期血圧160mmHg
5. 安静時拡張期血圧100mmHg

問題.96

100%

うつ病に起こりやすい思考障害はどれか。

1. 迂遠
2. 観念奔逸
3. 思考制止
4. 思考途絶
5. 滅裂思考

問題.97

64.3%

アルコール離脱せん妄で正しいのはどれか。

1. 生命への危険性は低い。
2. 羽ばたき振戦がみられる。
3. 抗酒薬を速やかに投与する。
4. 飲酒停止後72～96時間に多くみられる。
5. アルコール血中濃度の上昇に伴って生じる。

問題.98

70.7%

夢に関連する睡眠障害がみられるのはどれか。

1. 睡眠時驚愕症
2. 睡眠時遊行症
3. レム睡眠行動障害
4. 睡眠関連摂食障害
5. 周期性四肢運動障害

問題.99

92.7%

神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 骨密度は増加する。
2. 消化管の吸収不全がある。
3. 病識を持たないことが多い。
4. 食物に対する関心が低下する。
5. ボディイメージの歪みがある。

問題.100

24.4%



パニック障害の薬物療法で用いられるのはどれか。

1. 抗うつ薬
2. 抗精神病薬
3. 気分安定薬
4. 抗てんかん薬
5. 中枢神経刺激薬

問題.1

58.6%

可動域制限のない患者に図のような肢位をとらせたところ5秒間保持できた。Danielsらの徒手筋カテストにおける段階3以上と推測できる筋はどれか。




1. 左三角筋中部線維
2. 右上腕二頭筋
3. 左中殿筋
4. 右腸腰筋
5. 右前脛骨筋


問題.2

64.3%


Danielsらの徒手筋力テストにおける段階4の検査法で正しいのはどれか。



1. 肩関節屈曲




2. 肩関節伸展



3. 肘関節屈曲



4. 股関節屈曲



5. 膝関節屈曲

■: 検者が抵抗を加える方向

1. 肩関節屈曲

2. 肩関節伸展

3. 肘関節屈曲


4. 股関節屈曲

5. 膝関節屈曲

問題.3

98.6%

20歳の男性。運動時に膝関節痛を訴える。実施した検査を図に示す。
この検査はどれか。




1. 外反ストレステスト
2. 前方引き出しテスト
3. 内反ストレステスト
4. McMurrayテスト
5. Lachmanテスト

問題.4

98.6%

20歳の男性。運動時に膝関節痛を訴える。実施した検査を図に示す。
この検査で陽性となった。疑うべき病態はどれか。




1. 外側側副靱帯損傷
2. 後十字靱帯損傷
3. 前十字靱帯損傷
4. 内側側副靱帯損傷
5. 半月板損傷

問題.5

78.6%

20歳の男性。肩関節の疼痛を訴えている。図に示した状態から手背を腰部から離すように指示したところ、離すことができなかった。

筋力低下が疑われるのはどれか。



1. 棘下筋 2. 棘上筋 3. 肩甲下筋 4. 小円筋 5. 上腕二頭筋

問題.6

94.3%

26歳の男性。20歳ころから乗り物のつり革を握ると放しにくいことを自覚し始め、四肢遠位筋優位の筋力低下を自覚するようになった。母親にも同様の症状がある。前頭部に脱毛があり、側頭筋や咬筋が萎縮し、顔の幅が狭く頬がこけた顔貌をしている。

認められる可能性が高いのはどれか。

1. アテトーゼ
2. Gowers 徴候
3. ミオトニア
4. Lhermitte徴候
5. Romberg徴候

問題.7


48.6%

人工呼吸器のモニターに示される気道内圧と肺気量位を図に示す。

理学療法前後で図のような変化が見られた場合

、呼吸器系に生じた変化として考えられるのはどれか。

ただし、対象者の自発呼吸はなく、人工呼吸器による陽圧変化のみにより肺気量位が変化しているものとする。



1. 肺活量の増加
2. 残気量の減少
3. 気道抵抗の増加
4. 胸郭柔軟性の低下
5. 肺コンプライアンスの増加

問題.8

95.7%

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。


歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1. 歩行6点—食事5点
2. 歩行6点—食事6点
3. 歩行5点—食事6点
4. 歩行5点—食事7点
5. 歩行4点—食事7点

問題.9

20%

ある薬物を投与する前後の運動開始前・中・後の血圧の変化を示す。この薬物の作用はどれか。




1. 副交感神経刺激
2. 交感神経 α 受容体刺激
3. 交感神経 α 受容体抑制
4. 交感神経 β 受容体刺激
5. 交感神経 β 受容体抑制

問題.10

84.3%

生後8か月の乳児。運動発達の遅れがあり、療育施設にて理学療法を受けている。図のような姿勢を示す。優先して行う運動はどれか。




1. 寝返り
2. 膝立ち
3. 四つ這い
4. 立ち上がり
5. 免荷立位での交互振り出し

問題.11

88.6%

頸髄損傷者の起き上がり動作を図に示す。

Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類における機能残存レベルはどれか。



1. C5A

2. C5B

3. C6A

4. C6BII


5. C7A

問題.12

85.7%

頸髄損傷者の起き上がり動作を図に示す。

この患者において機能していると推測される筋はどれか。



1. 円回内筋

2. 深指屈筋

3. 上腕三頭筋

4. 長母指伸筋


5. 尺側手根伸筋

問題.13

32.9%

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。

立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。



1. 踵部の補高
2. 短下肢装具の使用
3. 膝屈曲位での立位保持練習
4. 前脛骨筋の治療的電気刺激
5. 下腿三頭筋へのタッピング


問題.14

81.4%

40歳の男性。長時間の立位により右下肢の疼痛が生じるようになったため受診し腰椎椎間板ヘルニアと診断された。

右の片脚立位で踵の挙上ができなかった。

重度の感覚鈍麻が疑われる部位はどれか。



1. ①

2. ②

3. ③


4. ④

5. ⑤

問題.15

97.1%

脊髓損傷患者のトランスファーボードを用いた車椅子からベッドへの移乗動作を図に示す。
この動作を獲得目標とする機能残存レベルはどれか。




1. C5 2. C6 3. C7 4. C8 5. T1

問題.16

24.3%

NICUにおける低出生体重児の腹臥位での姿勢を図に示す。この児に対するポジショニングで適切な肢位はどれか。2つ選べ。



1. 頸部伸展位
2. 体幹伸展位
3. 肩関節内旋位
4. 肩甲骨拳上位
5. 股関節内転位

問題.17

92.9%

82歳の男性。15年前から動作時の息切れ及び咳や痰の増加がみられ、自宅近くの医療機関にて加療していた。徐々に動作時の呼吸困難感が強くなり、入浴動作で息切れを感じるようになっていく。2年前から在宅酸素療法が開始されている。

動脈血ガス分析は PaO_2 65Torr、 PaCO_2 47Torr、 HCO_3^- 29.5mEq/L、肺機能検査は、%VC 62%、 $\text{FEV}_{1\%}$ 42%であった。吸入

薬として長時間作用性 β_2 刺激薬、長時間作用性抗コリン薬が処方されている。

本症例に有酸素運動を行う場合の運動強度として最も適切なものはどれか。

1. 7METs
2. 修正Borg指数7
3. 最大仕事量の75%
4. 目標心拍数130／分
5. 最大酸素摂取量の40%

問題.18

55.7%

60歳の女性。心不全。運動療法中に心室期外収縮が確認された。このときの心電図を示す。
この心室期外収縮について正しいのはどれか。



1. 3段脈である
2. P波がみられる。
3. Lownの分類4bである。
4. QRS幅は0.12秒未満である。
5. 洞調律よりも早く出現する心室興奮である。

問題.19

11.4%

70歳の男性。食道がんを内視鏡的に切除した後に放射線療法を行ってから6か月が経過した。
今後予測される放射線療法の副作用はどれか。




1. 末梢神経障害
2. 気道浮腫
3. 食欲不振
4. 皮膚炎
5. 悪心

問題.20

72.9%

65歳の男性。右利き。突然の意識障害で搬送された。くも膜下出血の診断で、破裂脳動脈瘤のクリッピング手術を施行された。発症後3か月の頭部CTを別に示す。

この患者に出現しやすい症状はどれか。



1. 上着の左右を間違えて袖を通す。
2. ジェスチャーの模倣ができない。
3. 移動する時に左側の人や物にぶつかりやすい。
4. 知っている人なのに声を聞かないとわからない。
5. 担当理学療法士に毎日初対面のように挨拶をする。

問題.21

21.4%

最もエビデンスレベルが高いのはどれか。

1. 無作為化比較試験
2. コホート研究
3. 症例集積研究
4. 症例対照研究
5. 症例報告

問題.22

72.9%

慢性閉塞性肺疾患の呼吸機能検査の所見で低下がみられるのはどれか。

1. PaCO₂
2. 残気率
3. 全肺気量
4. 肺拡散能
5. 肺コンプライアンス

問題.23

94.3%

継続的な持久力運動で低下するのはどれか。

1. 中性脂肪
2. 筋内毛細血管数
3. 最大酸素摂取量
4. インスリン感受性
5. 筋内ミトコンドリア量

問題.24

51.4%

病的反射と刺激方法の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. Chaddock反射—足の内果の下方を後ろから前へこする。
2. Gonda反射—足の第4指をつまみ下方へ引っ張る。
3. Gordon反射—アキレス腱を強くつまむ。
4. Oppenheim反射—脛骨内縁を上方から下方へこすりおろす。
5. Schaeffer反射—足底面の外縁を踵から上へ向かってこすりあげる。

問題.25

52.9%

身体計測で正しいのはどれか。

1. 体重の測定は午後6時ころが望ましい。
2. 身長は両足前方を開角せずに測定する。
3. 胸囲は安静呼吸の呼気の終わりに測定する。
4. 棘果長は上前腸骨棘から外果までの長さを測定する。
5. 手長は尺骨茎状突起から第3指先端までの長さを測定する。

問題.26

67.1%

Danielsらの徒手筋力テストにおいて座位で筋力3を判定できるのはどれか。

1. 大胸筋
2. 肩甲下筋
3. 上腕三頭筋
4. 下腿三頭筋
5. ハムストリングス

問題.27

51.4%

NRS〈numerical rating scale〉で正しいのはどれか。

1. 順序尺度である。
2. 10段階で評価する。
3. 疼痛の性質を評価する。
4. 患者間の比較に有効である。
5. 幼児の疼痛評価に使用される。

問題.28

98.6%

若年者と比較した高齢者の歩行で正しいのはどれか。

1. 歩隔は狭くなる。
2. 歩幅は大きくなる。
3. 腕の振りは減少する。
4. 両脚支持期は短くなる。
5. 遊脚相における足尖と床面との距離は大きくなる。

問題.29

72.9%

下腿義足の静的アライメントにおいて、つま先の浮き上がりが観察され、膝折れを起こしそうな不安定感の訴えがあった。

ソケットへの対応で適切なのはどれか。

1. 外側へ移動させる。
2. 後方へ移動させる。
3. 内側へ移動させる。
4. 初期屈曲角度を減らす。
5. 初期内転角度を減らす。

問題.30

67.1%

膝関節内反変形のある変形性膝関節症患者にみられる歩行の特徴はどれか。2つ選べ。

1. 立脚相：外側スラスト
2. 立脚相：立脚側への体幹傾斜
3. 立脚相：立脚肢の反張膝
4. 遊脚相：分回し
5. 遊脚相：遊脚側の骨盤下制

問題.31

92.9%

関節リウマチにみられる変形と部位の組合せで適切なのはどれか。

1. スワンネック変形－環軸椎関節
2. ムチランス変形－脊柱
3. ボタン穴変形－手の母指
4. 内反小指変形－足部
5. Z変形－足の母指

問題.32

88.6%

Kienböck病で障害されるのはどれか。

1. 月状骨 2. 三角骨 3. 舟状骨 4. 小菱形骨 5. 大菱形骨

問題.33

65.7%

断端の成熟度を確認するための断端周径計測で正しいのはどれか。

1. 1か所で計測する。
2. 下腿切断では最大膨隆部で計測する。
3. 下腿切断では背臥位で計測する。
4. 大腿切断では坐骨結節を基準に計測点を決める。
5. 月に2回計測する。

問題.34

97.1%

发育性股関節形成不全で正しいのはどれか。

1. 開排は制限されない。
2. 大腿骨頭の前方脱臼が多い。
3. 二次的な変形性股関節症にはなりにくい。
4. 7歳以上では外転位保持免荷装具を用いる。
5. 乳児期ではリーメンビュゲル装具を用いる。

問題.35

94.3%

前頭葉と側頭葉に限局性の大脳皮質の萎縮を認める疾患はどれか。

1. Alzheimer型認知症
2. 正常圧水頭症
3. 脳血管性認知症
4. Pick病
5. Lewy小体型認知症

問題.36

100%

疼痛の評価に用いられるのはどれか。2つ選べ。

1. face scale 2. MAS 3. SLTA 4. VAS 5. WCST

問題.37

71.4%

運動療法で正しいのはどれか。

1. 自動運動とは重力に抗して行う運動のことである。
2. 自動介助運動とは最小重力肢位で行う運動のことである。
3. 等尺性運動は等張性運動よりも筋持久力増強効果が大きい。
4. 等速性運動では低速運動の方が高速運動より大きな筋力が発揮できる。
5. 重錘を用いた運動では全可動域にわたって筋に加わる負荷が変化しない。

問題.38

88.6%

虚血性心疾患に対する運動療法の効果について適切なのはどれか。

1. 再入院頻度の低下
2. 収縮期血圧の上昇
3. 血小板凝集能の増加
4. 交感神経の緊張亢進
5. HDLコレステロールの低下

問題.39

87.1%

開放式吸引での気管吸引で正しいのはどれか。

1. 1回の吸引時間は30秒以上行う。
2. 吸引圧は最大150mmHgである。
3. 吸引カテーテルの先端は気管分岐部の先まで挿入する。
4. 吸引操作中はSpO₂ 80～90%を維持する。
5. 吸引操作中は吸引カテーテルを上下前後に動かす。

問題.40

88.6%

全身持久カトレニング中の自覚的運動強度の指標で最も適切なのはどれか。

1. Karvonen法
2. 修正Borg指数
3. Hugh-Jones分類
4. % 最大酸素摂取量
5. Modified medical research council (mMRC) 息切れスケール

問題.41

97.1%

高次脳機能障害と検査の組合せで正しいのはどれか。

1. 失語—かな拾いテスト
2. 注意障害—TMT
3. 記憶障害—Kohs立方体組み合わせ検査
4. 遂行機能障害—BIT
5. 半側空間無視—BADS

問題.42

61.4%

Perthes病で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 女子に多い。
2. 大腿骨頭の阻血性壊死である。
3. 発症年齢が高いほど予後が良い。
4. 免荷を目的とした装具療法が行われる。
5. 片側性に比べ両側性に発症することが多い。

問題.43

94.3%

左延髄外側症候群で正しいのはどれか。

1. 右Horner徴候
2. 右角膜反射低下
3. 右上下肢の運動失調
4. 右上下肢の温痛覚障害
5. 右上下肢の深部感覚障害

問題.44

67.1%

多発性筋炎で正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 心筋は障害されない。
3. 高い室温では筋力が低下する。
4. 四肢の遠位筋優位に障害される。
5. 間質性肺炎を合併すると予後が悪い。

問題.45

98.6%

Down症候群の子どもの運動発達の特徴で適切なのはどれか。

1. 後弓反張
2. はさみ脚歩行
3. スカーフ徴候陰性
4. シャフリング移動
5. 緊張性迷路反射亢進

問題.46

45.7%

人工呼吸器管理中に生じる呼吸器合併症でみられやすいのはどれか。

1. 胸水
2. 肺炎
3. 喘息
4. 肺線維症
5. 慢性閉塞性肺疾患

問題.47

98.6%

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。

1. 食後すぐに開始する。
2. 運動強度はBorg指数17前後で行う。
3. インスリン治療中の患者は禁忌である。
4. 尿中ケトン体陽性の場合是有酸素運動を行う。
5. 増殖性網膜症がある場合、強い等尺性収縮は推奨されない。

問題.48

84.3%

喚語困難と迂言を呈し、発話は流暢で良好な理解と復唱を特徴とする失語症はどれか。

1. 健忘失語
2. 伝導失語
3. Wernicke失語
4. 超皮質性運動失語
5. 超皮質性感覚失語

問題.49

74.3%

地域包括支援センターへの配置が義務付けられている職種はどれか。

1. 看護師
2. 理学療法士
3. 作業療法士
4. 言語聴覚士
5. 主任介護支援専門員

問題.50

84.3%

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。

1. T字杖
2. 手すり
3. 車椅子
4. 特殊寝台
5. 移動用リフト

問題.51

87.8%

Lisfranc関節を構成するのはどれか。2つ選べ。

1. 距骨
2. 舟状骨
3. 踵骨
4. 内側楔状骨
5. 立方骨

問題.52

100%

視覚伝導路に含まれるのはどれか。

1. 下垂体
2. 松果体
3. 乳頭体
4. 扁桃体
5. 外側膝状体

問題.53

94.3%


外眼筋の中で動眼神経の支配でないのはどれか。

1. 上斜筋
2. 下斜筋
3. 上直筋
4. 下直筋
5. 上眼瞼挙筋

問題.54

56.1%

中枢神経系の模式図を示す。矢印の部位はどれか。



1. 小膠細胞 2. 樹状突起 3. 上衣細胞 4. 星状膠細胞 5. 希突起膠細胞

問題.55

90.0%

筋と支配神経との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 下双子筋—閉鎖神経
2. 短内転筋—坐骨神経
3. 縫工筋—大腿神経
4. 前脛骨筋—深腓骨神経
5. 後脛骨筋—総腓骨神経

問題.56

85.4%

心臓で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 心臓壁は2層からなる。
2. 右房室弁は三尖弁である。
3. 心室中隔は左室側に凸である。
4. 心尖は左第8肋間に位置する。
5. 冠状動脈は大動脈から分岐する。

問題.57

46.3%

口腔で正しいのはどれか。

1. 口蓋の後方を硬口蓋という。
2. 口峽は口腔と喉頭の境である。
3. 口腔粘膜は重層扁平上皮からなる。
4. 舌根に舌乳頭がある。
5. 舌背に舌小帯がある。

問題.58

77.1%


膵臓で正しいのはどれか。

1. 膵頭は脾臓に接する。
2. 膵尾は十二指腸に接する。
3. 膵管は十二指腸に開口する。
4. 膵体は横行結腸前面を横走する。
5. Langerhans 〈ランゲルハンス〉 島は膵頭に多く存在する。

問題.59

75.7%

左頸部側面の様子を図に示す。中斜角筋はどれか。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

問題.60

97.6%

頸動脈洞反射で正しいのはどれか。

1. 血圧が上昇する。
2. 心拍数が増加する。
3. 求心路は舌下神経を介する。
4. 遠心路は迷走神経を介する。
5. 血中酸素濃度の上昇によって生じる。

問題.61

95.1%

皮膚の侵害受容器はどれか。

1. 毛包受容体
2. Pacini小体
3. Ruffini終末
4. 自由神経終末
5. Meissner小体

問題.62

100%

副交感神経線維を含むのはどれか。2つ選べ。

1. 動眼神経
2. 滑車神経
3. 内耳神経
4. 迷走神経
5. 舌下神経

問題.63

98.6%

心臓の刺激伝導系でないのはどれか。

1. 固有心筋
2. 洞房結節
3. Purkinje線維
4. 房室結節
5. 房室束

問題.64

82.9%

線維素溶解に働くのはどれか。

1. アルブミン
2. グロブリン
3. トロンビン
4. フィブリン
5. プラスミン

問題.65

98.6%

嚥下中枢が存在する部位はどれか。

1. 赤核
2. 中脳
3. 小脳
4. 橋
5. 延髄

問題.66

98.6%

排便機構で正しいのはどれか。

1. 排便中枢は胸髄にある。
2. 外肛門括約筋は陰部神経支配である。
3. 下行結腸では逆蠕動運動がみられる。
4. 食事によって胃が拡張すると便意を生じる。
5. 内肛門括約筋は副交感神経の緊張で収縮する。

問題.67

68.6%

血糖を上昇させる作用のあるホルモンはどれか。

1. アドレナリン
2. アルドステロン
3. カルシトニン
4. パラトルモン
5. プロラクチン

問題.68

12.9%

妊娠、出産で正しいのはどれか。

1. 受精卵は着床してから分裂を開始する。
2. 胎盤は着床前から形成が開始される。
3. 妊娠中は、妊婦と胎児の血液の混合が起こる。
4. 妊娠中はプロラクチン分泌が抑制されている。
5. 分娩が始まるとオキシトシン分泌が増加する。

問題.69

65.9%

通常歩行(4km/h)の代謝当量(METs)はどれか。

1. 1～2METs
2. 3～4METs
3. 5～6METs
4. 7～8METs
5. 9～10METs

問題.70

87.8%

眼球運動を行う筋はどれか。

1. 外側翼突筋
2. 眼輪筋
3. 頬筋
4. 前頭筋
5. 内側直筋

問題.71

73.2%


肩関節外転90°の時の肩甲骨上方回旋角度で正しいのはどれか。

1. 15°
2. 30°
3. 45°
4. 60°
5. 75°

問題.72

64.3%

右膝の内側面を図に示す。矢印の筋の作用で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 股伸展 2. 股内転 3. 股外旋 4. 膝伸展 5. 膝屈曲

問題.73

51.4%

体幹の右側屈かつ右回旋に作用する筋はどれか。

1. 右最長筋 2. 右多裂筋 3. 右半棘筋 4. 右腰方形筋 5. 右内腹斜筋

問題.74

42.9%

成人の正常立位姿勢で正しいのはどれか。

1. 腰仙角は約10度である。
2. 胸椎と仙椎は前弯を示す。
3. 矢状面上における重心は仙骨の後方に位置する。
4. 矢状面における身体の重心線は足関節中心を通る。
5. 両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致する。

問題.75

98.6%

疾患と病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。

1. Parkinson病－大脳白質の変性
2. 多発性硬化症－中枢神経の脱髄
3. Lewy小体型認知症－大脳白質の虚血
4. 筋萎縮性側索硬化症－脊髄後索の変性
5. Guillain-Barré症候群－脊髄前角の変性

問題.76

73.2%

アレルギーの分類と組織傷害の機序との組合せで正しいのはどれか。

1. I型アレルギー — 即時型過敏症
2. II型アレルギー — 細胞性免疫による組織傷害
3. II型アレルギー — 免疫複合体病
4. III型アレルギー — 抗体による機能亢進
5. IV型アレルギー — 補体活性化による細胞傷害

問題.77

78.0%

急性期のくも膜下出血の診断に最も有用なのはどれか。

1. MRI T1強調像
2. MRI T2強調像
3. 頸動脈超音波像
4. 単純CT像
5. 単純エックス線写真

問題.78

68.3%

創傷治癒を遅延させるのはどれか。

1. 亜鉛
2. アミノ酸
3. 酸素
4. ビタミンC
5. 副腎皮質ステロイド

問題.79

82.9%

障害受容で誤っているのはどれか。

1. 社会環境によって影響される。
2. 障害者同士の交流により促進される。
3. 抑うつ状態の患者には積極的な指導を行う。
4. 混乱している患者の怒りは医療者にも向く。
5. ショックを受けている状態の患者は安全に見守る。

問題.80

78.0%

認知行動療法で対象となるうつ病の自動思考のうち「極端な一般化」にあたるのはどれか。

1. そのときの感情に基づいて現実を判断する。
2. 全てに対して白黒をつけて割り切ろうとする。
3. 着目していることだけから短絡的に結論付ける。
4. 「こうすべきだ」と行動を制限して自分を責める。
5. 少数の事実から全てが同じ結果になると結論付ける。

問題.81

95.1%

心理療法で正しいのはどれか。

1. 陽性転移の出現を目標とする。
2. 逆転移を認識したときは治療を中止する。
3. 自律訓練法では不安階層表を作成させる。
4. 絵画療法は統合失調症急性期に有効である。
5. バイオフィードバックはオペラント条件付けを用いた手法である。

問題.82

68.3%

ASIAの評価法における脊髄の髄節とその感覚支配領域検査ポイントの組合せで正しいのはどれか。

1. C5－鎖骨上窩
2. T7－臍
3. T12－鼠径靱帯の中点
4. L5－足関節内果
5. S4－膝窩

問題.83

62.9%

歩行障害と病態の組合せで正しいのはどれか。

1. 鶏歩－ハムストリングスの筋力低下
2. 踵足歩行－深部感覚障害
3. 動揺性歩行－錐体外路障害
4. 小刻み歩行－運動失調
5. Trendelenburg歩行－中殿筋の筋力低下

問題.84

91.4%

高齢者の長期の安静臥床の影響で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 記憶力の低下
2. 1回換気量の増加
3. 循環血液量の減少
4. 予備呼気量の増加
5. 安静時心拍数の減少

問題.85

85.7%

Milani運動発達評価表における反射や運動のうち消失する時期が最も遅いのはどれか。

1. 手掌把握反射
2. 自動歩行
3. 足底把握反射
4. 非対称性緊張性頸反射
5. Moro反射

問題.86

65.9%

乳児の水頭症でみられる症状はどれか。

1. 肥満
2. 口蓋裂
3. 運動失調
4. 落陽現象
5. 弛緩性麻痺

問題.87

43.9%

外傷による骨折で、通常、完全骨折となるのはどれか。

1. 亀裂骨折
2. 若木骨折
3. 竹節骨折
4. 圧迫骨折
5. 剥離骨折

問題.88

50.0%

骨肉腫で正しいのはどれか。

1. 肺転移が多い。
2. 運動時痛は少ない。
3. 壮年期に好発する。
4. 大腿骨近位に発生が多い。
5. 血中アルカリフォスファターゼが低下する。

問題.89

20.0%

続発性骨粗鬆症発症の危険因子はどれか。

1. 肥満
2. 副腎不全
3. 関節リウマチ
4. 甲状腺機能低下
5. 副甲状腺機能低下

問題.90

81.4%

神経系の感染症と病原体の組合せで正しいのはどれか。

1. HIV脳症－スピロヘータ
2. 急性灰白髄炎－ウイルス
3. Creutzfeldt-Jakob病－細菌
4. 進行麻痺－ウイルス
5. 日本脳炎－細菌

問題.91

92.9%

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1. 胸腺の異常を伴うことが多い。
2. Parkinson病より患者数が多い。
3. テンシロン試験で症状が悪化する。
4. 血清クレアチンキナーゼが上昇する。
5. 誘発筋電図の反復刺激試験で振幅の漸増を認める。

問題.92

21.4%

脳腫瘍とその症状の組合せで正しいのはどれか。

1. 下垂体腺腫－両耳側半盲
2. 視神経膠腫－てんかん発作
3. 髄芽腫－下垂体機能不全
4. 聴神経鞘腫－尿崩症
5. 頭蓋咽頭腫－難聴

問題.93

64.3%

急性膵炎で正しいのはどれか。

1. 胆石が最も多い原因である。
2. 重症例の死亡率は1%前後である。
3. 急性期は血中アミラーゼが低下する。
4. 膵内での消化酵素の活性化がみられる。
5. 体幹の伸展で痛みが軽減することが多い。

問題.94

34.3%

赤血球の産生が低下しないのはどれか。

1. 腎性貧血
2. 溶血性貧血
3. 鉄欠乏性貧血
4. 巨赤芽球性貧血
5. 骨髄異形成症候群

問題.95

29.3%

地域保健法に基づく保健所の業務でないのはどれか。

1. 障害児の保健相談
2. 医療保険の審査事務
3. 感染症発症届出の受理
4. 人口動態統計に関する事務
5. 食品に関する営業者の監視

問題.96

100%

統合失調症の患者が「不気味な何かが起こりそうだ」と不安緊迫感を訴えた。この症状はどれか。

1. 考想伝播
2. 作為体験
3. 妄想気分
4. 妄想知覚
5. 連合弛緩

問題.97

90.2%

てんかんで正しいのはどれか。

1. 常にけいれんを伴う。
2. 発症率は30歳代が70歳代よりも高い。
3. West症候群の発症のピークは3～5歳である。
4. 高齢初発の症候性てんかんの原因疾患としては脳血管障害が最も多い。
5. てんかんによる突然死のリスクは、強直間代発作よりも欠伸発作の方が高い。

問題.98

44.3%

器質性精神障害の急性期の症状として最もみられるのはどれか。

1. 失語
2. せん妄
3. 知能低下
4. 性格変化
5. 健忘症候群

問題.99

32.9%

うつ病のリワークプログラムで正しいのはどれか。

1. 集団療法として位置づけられる。
2. 精神科医療機関では実施されない。
3. 診断や就労状況などで対象者は限定されない。
4. 実施にあたり主治医との情報共有は制限される。
5. 急性期からプログラムに参加することが推奨される。

問題.100

43.9%

成人のパーソナリティ障害への治療介入で正しいのはどれか。

1. 薬物療法は有効である。
2. 家族との連携を控える。
3. 早期に診断して患者に告知する。
4. 秩序を乱した行動に対して何も言わない。
5. 自傷行為などが頻回な場合は電気けいれん療法を行う。