

## 問題.1

11.4%

病気Xの有無を調べる検査の感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率を表に示す。

正しいのはどれか。2つ選べ。

|       |      |
|-------|------|
| 感 度   | 80 % |
| 特異度   | 95 % |
| 陽性的中率 | 85 % |
| 陰性的中率 | 90 % |


1. 病気Xに罹患している人で、検査が正しく陽性と判定された確率は85%である。
2. 病気Xに罹患していない人で、検査が正しく陰性と判定された確率は95%である。
3. 病気Xを判定する検査が陽性の場合、真に病気Xに罹患している確率は80%である。
4. 病気Xを判定する検査が陰性の場合、真に病気Xに罹患している確率は15%である。
5. 病気Xを判定する検査が陰性の場合、真に病気Xに罹患していない確率は90%である。

## 問題.2

80%

心電図を示す。

この心電図の所見で正しいのはどれか。




1. 心房細動
2. 洞性徐脈
3. 心室性期外収縮
4. 心房性期外収縮
5. I度房室ブロック

## 問題.3

65.7%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）における右下肢関節の測定肢位で正しいのはどれか。



1. 股屈曲      2. 股伸展      3. 膝屈曲      4. 足背屈      5. 足部内がえし

## 問題.4

90.0%

Danielsらの徒手筋力テストによる検査方法を図に示す。  
正しいのはどれか。



1. 前鋸筋の段階3




2. 肩関節外旋筋群の段階4



3. 大胸筋の段階3



4. 腕橈骨筋の段階4



5. 腸腰筋の段階3

← : 対象者の運動方向  
← : 検査者が抵抗を加える方向

1. 前鋸筋の段階3
2. 肩関節外旋筋群の段階4
3. 大胸筋の段階3
4. 腕橈骨筋の段階4
5. 腸腰筋の段階3

## 問題.5

58.6%

80歳の女性。慢性心不全。NYHA分類classIIIである。急性増悪にて入院加療後、退院した。自宅でのADLは、Barthel Indexによる評価で、食事、移乗、整容、トイレ動作、入浴、着替え、排便、排尿は自立、歩行は歩行器使用にて45m以上可能である。階段昇降は見守りとわずかな介助を要する。

この患者のBarthel Indexの点数はどれか。

1. 75点
2. 80点
3. 85点
4. 90点
5. 95点


## 問題.6

31.4%


脳卒中機能評価法〈SIAS〉の麻痺側運動機能テストの様子を図に示す。  
関節拘縮がない場合、3つのテストの合計点はどれか。



膝・口テスト



股屈曲テスト





膝伸展テスト

1. 5点      2. 6点      3. 7点      4. 8点      5. 9点

## 問題.7

94.3%

75歳の男性。身長170cm、体重48kg、BMI16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析 $\text{PaO}_2$  65Torr、 $\text{PaCO}_2$  48Torr、肺機能検査%VC81%、 $\text{FEV}_1$  %31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。




1. ①      2. ②      3. ③      4. ④      5. ⑤

## 問題.8

88.6%

75歳の男性。身長170cm、体重48kg、BMI16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析 $\text{PaO}_2$  65Torr、 $\text{PaCO}_2$  48Torr、肺機能検査%VC81%、 $\text{FEV}_1$  %31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。



1.  $\text{SpO}_2$  82%
2. 呼吸数22/分
3. 心拍数105/分
4. 修正Borg指数5
5. 収縮期血圧が安静時より20mmHg上昇

## 問題.9

22.9%

74歳の男性。肺尖部がんによる腕神経叢への直接浸潤により環指・小指～前腕中央・内側にかけて痛覚過敏を訴えている。

腕神経叢への浸潤部位はどれか。

1. C7神経根
2. C8神経根
3. 下神経幹
4. 外側神経束
5. 後神経束

## 問題.10

91.4%

27歳の男性。脊髄完全損傷（第5胸髄節まで機能残存）。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。


この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1. 肩甲部
2. 膝窩部
3. 仙骨部
4. 肘頭部
5. 腸骨部

## 問題.11

24.3%

図のような移動（シャフリング）をする乳児に促す姿勢や運動で最も適切なのはどれか。



1. 椅子座位      2. 起き上がり      3. 寝返り      4. 背臥位      5. 腹這い

## 問題.12

40%

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1. 使用頻度の低い単語を用いる。
2. 出にくい言葉は先回りして言う。
3. できるだけ長い文章で話しかける。
4. 意思伝達には易しい漢字を用いる。
5. ジェスチャーは可能な限り用いない。

## 問題.13

41.4%

60歳の女性。転倒して右肩関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。  
まず患部に行うべき治療はどれか。



右

1. ギプス固定      2. 極超短波治療      3. 三角巾固定      4. 髓内釘固定      5. 超音波治療

## 問題.14

61.4%

65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2か月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。下肢の症状やバランス不良はみられない。  
右上肢において筋力低下が最も生じやすいのはどれか。

1. 三角筋      2. 上腕三頭筋      3. 上腕二頭筋      4. 尺側手根屈筋      5. 長橈側手根伸筋

## 問題.15

70.0%

75歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージIV。歩行時に小刻み歩行、突進現象、すくみ足が出現する。

歩行練習として適切なのはどれか。

1. 速く歩く。  
2. 広いところで歩く。  
3. 床に引いた一本線上を歩く。  
4. 目標地点の手前を注視して歩く。  
5. お盆に載せたコップを運びながら歩く。

## 問題.16

64.3%

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。


今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。




1. セラピーボール上座位で上肢下肢の挙上



2. 端座位からの立ち上がり練習



3. 端座位での重心移動練習



4. 片膝立ち位での上肢挙上



5. 立位で不安定板を用いた荷重練習

1. セラピーボール上座位で上肢下肢の挙上
2. 端座位からの立ち上がり練習
3. 端座位での重心移動練習
4. 片膝立ち位での上肢挙上
5. 立位で不安定板を用いた荷重練習

## 問題.17

100.0%

55歳の女性。8年前に多発性硬化症と診断され、再発や寛解を繰り返し、2回の入院歴がある。現在は症状が落ち着いており、訪問理学療法で屋外歩行練習が実施されている。その際、理学療法士は運動強度を軽度から中等度とし、かつ、外気温の高い時間帯を避けて実施するなどに留意している。

この理由として関係するのはどれか。

1. Barré徴候
2. Horner徴候
3. Lhermitte徴候
4. Tinel徴候
5. Uhthoff徴候

## 問題.18

94.3%

32歳の女性。2週前に上気道炎を発症し、5日前から四肢末端の異常感覚を自覚した。その後、徐々に四肢の脱力を認めた。Guillain-Barré症候群と診断され、直ちにγ-グロブリン大量静注療法を開始した。入院時の四肢筋力はMMTで段階4であったが、入院2日後には顔面筋麻痺と構音・嚥下障害が出現し、翌日には痰が多く呼吸困難が出現したため、気管挿管され人工呼吸器管理となった。四肢筋力は近位筋で段階1、その他は段階2～3に低下している。

現時点で優先される治療はどれか。

1. 機能的電気刺激
2. 筋力増強運動
3. 座位練習
4. 自発呼吸練習
5. 排痰練習

## 問題.19

18.6%

8歳の女児。顕在性二分脊椎。Sharrardの分類はIV群である。

歩行練習の実施方法で適切なのはどれか。

1. 靴型装具を使用する。
2. 長下肢装具を使用する。
3. 短下肢装具とロフトランド杖を併用する。
4. 長下肢装具とロフトランド杖を併用する。
5. 骨盤帯付き長下肢装具とPCW〈postural control walker〉を併用する。

## 問題.20

24.3%

85歳の女性。自宅仏壇のろうそくの火が右袖に引火し、右前腕から前胸部および顔面にⅢ度5%とⅡ度15%の熱傷および気道熱傷を受傷した。受傷翌日に前胸部から右前腕前面にかけて植皮術を実施した。

術後早期から開始する理学療法として正しいのはどれか。

1. squeezingによる排痰を実施する。
2. 前腕は最大回内位に保持する。
3. 肩関節は外転位に保持する。
4. 筋力増強運動は禁止する。
5. 起立歩行は禁止する。

## 問題.21

91.4%

臨床研究を実施する上で適切でないのはどれか。

1. 研究対象はポスターを用いて募集した。
2. 研究の内容について対象者に書面を見せながら口頭で説明した。
3. データ処理を匿名化で行った。
4. 得られたデータはパソコンの共有フォルダで保管した。
5. 対象者からの研究の同意への撤回請求に応じた。

## 問題.22

28.6%

ICFの評価点とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1. 活動と参加の能力の評価点——促進あるいは阻害する程度
2. 環境因子の第一評価点——個人の遂行能力
3. 身体構造の第一評価点——機能障害の程度や大きさ
4. 身体構造の第二評価点——各身体部位における変化の性質
5. 心身機能の第一評価点——構造障害の程度や大きさ

## 問題.23

88.6%

インシデントレポート収集の目的で正しいのはどれか。

1. 責任者を処罰する。
2. 監督官庁に報告する。
3. 医療事故発生防止策を検討する。
4. 施設管理者が解決策を検討する。
5. 当事者間でインシデントの原因を検討する。

## 問題.24

64.3%

肺音で正しいのはどれか。

1. 気管呼吸音は吸気より呼気の方が大きい。
2. 気管支呼吸音は吸気だけに聴取される。
3. 笛音（wheezes）は吸気初期に聴取されやすい。
4. 捻髪音（fine crackles）は呼気に聴取されやすい。
5. 肺胞呼吸音は呼気終末に強くなる。

## 問題.25

50.0%

健常成人の血圧に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 背臥位では立位に比べて脈圧が小さい。
2. 足関節上腕血圧比の基準値は1.5～2.0である。
3. 上腕部では足部と比べて収縮期血圧が低くなる。
4. 座位での測定はマンシェットを心臓の高さに合わせる。
5. Korotkoff音が聞こえなくなった時点での圧を収縮期血圧とする。

## 問題.26

95.7%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）における股関節の参考可動域角度で正しいのはどれか。

1. 外旋：20°
2. 外転：20°
3. 屈曲：110°
4. 伸展：15°
5. 内旋：20°

## 問題.27

88.6%


「歯を磨くまねをしてください」という口頭命令ではうまくできないが、自発的には歯磨きができる状態はどれか。

1. 観念失行
2. 拮抗失行
3. 構成失行
4. 観念運動失行
5. 肢節運動失行

## 問題.28

82.9%

歩行周期と筋活動パターンとの関係を図に示す。  
このグラフが示す特徴をもつ筋はどれか。



1. 大殿筋
2. 中殿筋
3. 大腿四頭筋
4. ハムストリングス
5. 下腿三頭筋

## 問題.29

55.7%

義足の遊脚相において下腿部の振り出し速度を制御する膝継手はどれか。

1. 固定膝
2. 可変摩擦膝
3. 荷重ブレーキ膝
4. バウンス機構付き
5. イールディング機構付き

## 問題.30

68.6%

胸腰仙椎装具で正しいのはどれか。

1. 後方支柱は棘突起の直上に位置させる。
2. 骨盤帯の位置は大転子と腸骨稜の間である。
3. 側方支柱は骨盤帯と肩甲間バンドを結合する。
4. 胸椎バンドの位置は肩甲骨の下1/3の高さである。
5. 腹部前当ての上縁の位置は剣状突起の高さである。

## 問題.31

87.1%

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 二次性が多い。
2. 男性に好発する。
3. 外反変形を生じやすい。
4. 運動開始時に疼痛がある。
5. 大腿四頭筋の萎縮を認める。

## 問題.32

97.1%

Froment徴候が陽性のとき、麻痺を疑うべき神経はどれか。

1. 肩甲背神経
2. 尺骨神経
3. 正中神経
4. 長胸神経
5. 橈骨神経

## 問題.33

95.7%


肩関節の関節可動域が屈曲100°、伸展10°、外転60°、外旋5°、内旋45°の肩関節周囲炎患者で障害されやすい動作はどれか。

1. 洗顔動作
2. 結髪動作
3. 靴下の着脱
4. 爪切り動作
5. 歯磨き動作

## 問題.34

81.4%

中脳（水平断）を図に示す。  
Parkinson病の病変部位はどれか。



1. ①      2. ②      3. ③      4. ④      5. ⑤

## 問題.35

80.0%

筋萎縮性側索硬化症で下位運動ニューロン障害の徴候はどれか。

1. 痙縮
2. 仮性球麻痺
3. 線維束性収縮
4. 腹壁反射消失
5. アキレス腱反射亢進

## 問題.36

84.3%

6分間歩行テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 自覚症状の変化を記録する。
2. 被験者の斜め前方に並んで歩く。
3. 6分間の総歩行距離で評価する。
4. 被験者に残りの時間を伝えることはできない。
5. 被験者が途中で立ち止まった場合にはテストを中止する。

## 問題.37

97.1%

関節可動域運動で正しいのはどれか。

1. 筋収縮を伴ってはならない。
2. 意識障害がある場合は行わない。
3. 運動麻痺の改善を目的として行う。
4. 拘縮の予防・改善を目的として行う。
5. 深部感覚障害がある場合は行わない。

## 問題.38

90.0%

筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

1. ハムストリングス—膝関節屈曲90°位での股関節伸展
2. 上腕二頭筋—肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展
3. 上腕三頭筋—肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転
4. 前脛骨筋—足外がえし位での足関節背屈
5. 中殿筋—股関節伸展0°位での股関節外転

## 問題.39

91.4%

神経筋再教育で正しいのはどれか。

1. 随意運動を促通する。
2. 神経断裂に適応される。
3. 自動介助運動は用いない。
4. 関節障害には適応されない。
5. 意識レベルがJCSIII-200にも適応される。

## 問題.40

87.1%

寒冷療法の作用で正しいのはどれか。

1. 滑液粘性の低下
2. 疼痛閾値の低下
3. 神経伝導速度の増加
4. 筋紡錘の感受性の減弱
5. 毛細血管透過性の亢進

## 問題.41

98.6%

外側ストラップ付き金属支柱付き短下肢装具の使用が最も適切なのはどれか。

1. 歩行中の膝折れ
2. 足クローヌス
3. 深部感覚障害
4. 内反尖足
5. 外反膝

## 問題.42

85.7%

慢性心不全患者に対する運動療法の効果で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. BNPの増加
2. QOLの改善
3. 運動耐容能の向上
4. 左室駆出率の低下
5. 交感神経活性の亢進

## 問題.43

97.1%

慢性腰痛に対する認知行動療法で誤っているのはどれか。

1. 痛みの有無を頻回に確認する。
2. 腰痛の不安を解消する映像を見せる。
3. 腰を反らしても痛まない体験を繰り返させる。
4. 痛みがあっても行える活動があることを認識させる。
5. 適切な身体活動は痛みを増悪させないことを説明する。

## 問題.44

70.0%

外反肘をきたしやすいのはどれか。

1. 尺骨肘頭骨折
2. 上腕骨外顆骨折
3. 上腕骨顆上骨折
4. 上腕骨内側上顆骨折
5. 橈骨小頭骨折

## 問題.45

97.1%

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1. 上衣を右上肢から着衣する。
2. 浴槽に右下肢からまたいで入る。
3. 階段を上るときに左下肢を先に出す。
4. 階段を下るときに右下肢を先に出す。
5. 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

## 問題.46

95.7%

多発性筋炎の回復初期における理学療法で正しいのはどれか。

1. 運動負荷量は血小板数を目安に設定する。
2. 筋力トレーニングは四肢の遠位筋を中心に行う。
3. 間質性肺炎の合併に注意してプログラムを進める。
4. 手指の冷感に対して手部および手指へのホットパックを行う。
5. 筋痛があれば抵抗を減らし、時間を延長して筋力トレーニングを継続する。

## 問題.47

78.6%

Down症候群の児に対して乳児期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1. 腹筋群の収縮を促す。
2. 不随意運動を抑制する。
3. 背這いを移動手段とする。
4. 緊張性迷路反射を促通する。
5. 定頸後すぐに立位姿勢を経験させる。

## 問題.48

51.4%

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1. 起立性低血圧――離床
2. 筋力低下――神経筋電気刺激
3. 骨萎縮――機能的電気刺激
4. 褥瘡――体位変換
5. 深部静脈血栓――弾性ストッキング

## 問題.49

94.3%

ノーマライゼーションで正しいのはどれか。

1. 障害者の隔離
2. 心身機能の正常化
3. 身体構造の正常化
4. 障害により受ける差別の解消
5. 大規模施設（コロニー）への入所推進

## 問題.50

71.4%

介助保険法で貸与の対象とならないのはどれか。

1. 車椅子
2. 歩行器
3. スロープ
4. 体位変換器
5. ポータブルトイレ

## 問題.51

97.1%

自律神経系の機能をもつのはどれか。

1. 視神経
2. 滑車神経
3. 三叉神経
4. 迷走神経
5. 舌下神経

## 問題.52

100%

錐体路を含むのはどれか。

1. 脳梁
2. 大脳脚
3. 上小脳脚
4. 中小脳脚
5. 下小脳脚

## 問題.53

100%

関節と関節構造の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 手のMP関節―――らせん関節
2. 橈骨手根関節―――鞍関節
3. 上橈尺関節―――顆状関節
4. 腕尺関節―――蝶番関節
5. 肩鎖関節―――平面関節

## 問題.54

100%

手根管を通過しないのはどれか。

1. 深指屈筋腱
2. 浅指屈筋腱
3. 長母指屈筋腱
4. 尺側手根屈筋腱
5. 橈側手根屈筋腱

## 問題.55

88.0%

腰神経叢に含まれるのはどれか。

1. 陰部神経
2. 下殿神経
3. 坐骨神経
4. 上殿神経
5. 大腿神経

## 問題.56

65.7%

下大静脈に直接入るのはどれか。2つ選べ。

1. 肝静脈
2. 胃静脈
3. 脾静脈
4. 空回腸静脈
5. 腎静脈

## 問題.57

77.1%

気管支について正しいのはどれか。

1. 気管支には平滑筋がある。
2. 左主気管支は右主気管支より短い。
3. 気管支の内表面は扁平上皮で覆われる。
4. 気管分岐部は食道の第1狭窄部にある。
5. 気管の延長線に対する気管支の分岐角度は左より右の方が大きい。

## 問題.58

97.1%


後腹膜腔に存在するのはどれか。

1. 胃
2. 空腸
3. 膀胱
4. 横行結腸
5. S状結腸

## 問題.59

67.1%

左顔面を図に示す。  
網かけ部分を支配している感覚神経はどれか。



1. 眼神経      2. 顔面神経      3. 鼓室神経      4. 耳介側頭神経      5. 上顎神経

## 問題.60

35.7%

線毛上皮があるのはどれか。

1. 膣      2. 子宮      3. 尿管      4. 膀胱      5. 卵管

## 問題.61

96.0%

副腎髄質から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。

1. アドレナリン  
2. アルドステロン  
3. アンドロゲン  
4. コルチゾール  
5. ノルアドレナリン

## 問題.62

84.3%

骨格筋の筋収縮において筋小胞体から放出された $\text{Ca}^{2+}$  が結合するのはどれか。

1. アクチン      2. ミオシン      3. トロポニン      4. ミオグロビン      5. トロポミオシン

## 問題.63

100%

交感神経の作用はどれか。

1. 瞳孔を縮小させる。
2. 排尿を促進させる。
3. 気管支を拡張させる。
4. 心拍数を減少させる。
5. 胃腸の運動を促進させる。

## 問題.64

78.6%

呼吸生理の説明で正しいのはどれか。

1. 呼吸中枢は視床下部にある。
2. 外肋間筋は安静呼吸の呼気筋として作用する。
3. 内呼吸とは肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。
4. 動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。
5. 頸動脈小体は動脈血酸素分圧よりも動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすい。

## 問題.65

92.9%

血液凝固因子はどれか。2つ選べ。

1. アルブミン
2. トロンビン
3. ヘモグロビン
4. フィブリノゲン
5. エリスロポエチン

## 問題.66

92.9%

排便の随意的な制御に関わるのはどれか。

1. 陰部神経
2. 下殿神経
3. 下腹神経
4. 骨盤神経
5. 閉鎖神経

## 問題.67

78.6%

腎臓の排尿機構で正しいのはどれか。

1. Bowman嚢は集合管に接続する。
2. 近位尿細管ではNa が再吸収される。
3. ネフロンは糸球体と近位尿細管から構成される。
4. 糸球体ではアルブミンは水よりも濾過されやすい。
5. 糸球体濾過量は健常成人では1日に1～1.5Lである。

## 問題.68

100%

体温調節の中枢で正しいのはどれか。

1. 中脳
2. 扁桃体
3. 視床下部
4. 小脳虫部
5. 補足運動野

## 問題.69

100%

肩甲上腕関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 屈曲—棘下筋
2. 伸展—棘上筋
3. 内転—広背筋
4. 外転—上腕三頭筋
5. 内旋—烏口腕筋

## 問題.70

96.0%

手の内在筋プラス肢位の組み合わせで正しいのはどれか。

1. MP関節屈曲—PIP関節伸展—DIP関節屈曲
2. MP関節伸展—PIP関節屈曲—DIP関節屈曲
3. MP関節屈曲—PIP関節伸展—DIP関節伸展
4. MP関節伸展—PIP関節屈曲—DIP関節伸展
5. MP関節屈曲—PIP関節屈曲—DIP関節伸展

## 問題.71

88.0%

膝関節屈曲に作用する筋はどれか。

1. 外閉鎖筋
2. 大内転筋
3. 恥骨筋
4. 長内転筋
5. 薄筋

## 問題.72

78.6%

快適歩行から速度を速めた際の変化で正しいのはどれか。

1. 歩幅は減少する。
2. 重心の上下動は減少する。
3. 立脚相の時間は減少する。
4. 股関節の屈曲角度は減少する。
5. 体幹の水平面内回旋運動は減少する。

## 問題.73

68.0%

肺機能検査とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1. 1秒量—安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量
2. 残気量—安静呼気位に肺内に残存した肺気量
3. 肺活量—最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量
4. 拘束性換気障害—%肺活量90%未満
5. 閉塞性換気障害—1秒率80%未満

## 問題.74

44.0%

運動学習における結果の知識〈KR〉が与えられるのはどれか。

1. フリースロー時の肘の伸ばし具合を指導する。
2. 投げた球がストライクかどうかを教える。
3. ボーリングのスコアの付け方を教える。
4. バレーボールのルールを教える。
5. 平泳ぎの手の使い方を教える。

## 問題.75

48.0%

胎児期に感染することで先天性奇形を生じるのはどれか。

1. MRSA
2. 結核菌
3. 風疹ウイルス
4. B型肝炎ウイルス
5. ヘリコバクター・ピロリ菌

## 問題.76

48.0%

小脳橋角部に最も多い脳腫瘍はどれか。

1. 腺腫
2. 髄膜腫
3. 血管芽腫
4. 神経膠腫
5. 神経鞘腫

## 問題.77

28.0%

胃全摘出術後に起こりやすいのはどれか。

1. 多血症
2. てんかん
3. 血小板減少
4. 逆流性食道炎
5. 高カルシウム血症

## 問題.78

実現困難な欲求や苦痛な体験などを無意識の中に封じ込め忘れようとする形での防衛機制はどれか。

1. 統制
2. 抑圧
3. 合理化
4. 知性化
5. 反動形成

## 問題.79

92.0%

創始者と心理療法の組合せて正しいのはどれか。2つ選べ。

1. Beck——集団療法
2. Freud——自由連想
3. Jung——夢分析
4. Rogers——自律訓練法
5. Skinner——認知療法

## 問題.80

88.0%

加齢によっても保たれる精神機能はどれか。

1. 記銘力
2. 計算力
3. 注意力
4. 言語理解力
5. 情報処理速度

## 問題.81

60.0%

治療者が指示や助言を与え、非適応的な行動をコントロールすることを目的とした治療法はどれか。

1. 芸術療法
2. 森田療法
3. 精神分析療法
4. 来談者中心療法
5. バイオフィードバック療法

## 問題.82

92.0%

脳の病変部位と出現しやすい症候との組合せて正しいのはどれか。

1. 黒質——感覚障害
2. 視床——嗅覚障害
3. 赤核——摂食嚥下障害
4. 線条体——不随意運動
5. 扁桃体——筋緊張異常

## 問題.83

Danielsらの徒手筋力テストについて正しいのはどれか。

1. 筋を最大伸張させた肢位で行う。
2. 協働筋を個々に分離して評価できる。
3. 関節可動域に制限があれば評価できない。
4. 抑止テストでは徐々に徒手抵抗を強くする。
5. 筋収縮が全く認められない筋の判定は段階 0 である。

## 問題.84

87.1%

接触感染するのはどれか。2つ選べ。

1. MRSA
2. 結核菌
3. マラリア
4. 麻疹ウイルス
5. インフルエンザウイルス

## 問題.85

95.7%

原始反射のうち消失する時期が最も遅いのはどれか。

1. Moro反射
2. 足底把握反射
3. 緊張性迷路反射
4. 交叉性伸展反射
5. 非対称性緊張性頸反射

## 問題.86

85.7%

骨形成不全症で正しいのはどれか。

1. 強膜炎を合併する。
2. 遺伝性疾患ではない。
3. 視覚障害を合併する。
4. 二次的に側湾症を発症しやすい。
5. 治療にはステロイド薬が有効である。

## 問題.87

56.0%

視床痛で正しいのはどれか。

1. CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉Ⅰ型に分類される。
2. 脳卒中発症直後から出現する。
3. 聴覚刺激で疼痛が緩和する。
4. 非侵害刺激で疼痛を感じる。
5. Lhermitte徴候がみられる。

## 問題.88

72.0%


脳血管障害と治療の組合せで正しいのはどれか。

1. ラクナ梗塞—頸動脈血栓内膜剥離術
2. くも膜下出血—クリッピング手術
3. 心原性脳塞栓症—頸動脈ステント留置術
4. 一過性脳虚血発作—コイル塞栓術
5. アテローム血栓性脳梗塞—アブレーション手術

## 問題.89

94.3%

頭部CT画像を示す。  
所見として考えられるのはどれか。



1. くも膜下出血
2. 硬膜外血腫
3. 硬膜下血腫
4. 脳動静脈奇形
5. 皮質下出血

## 問題.90

61.4%

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1. 安全面から歩行練習は行わない。
2. squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。
3. 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。
4. 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。
5. 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

## 問題.91

88.6%

肺塞栓症について誤っているのはどれか。

1. 肥満が誘因となる。
2. 長期臥床が誘因となる。
3. 心電図所見は非特異的である。
4. 下肢よりも上肢の手術後に多い。
5. 深部静脈血栓症との合併が多い。

## 問題.92

74.3%

食道癌で正しいのはどれか。

1. 女性に多い。
2. 高血圧は危険因子である。
3. 好発部位は頸部食道である。
4. 組織型は扁平上皮癌が多い。
5. ヘリコバクター・ピロリ菌が発症に関与する。

## 問題.93

54.3%

尿毒症で正しいのはどれか。

1. 腎不全の初期にみられる。
2. 代謝性アシドーシスを示す。
3. 低カリウム血症を生じやすい。
4. 透析患者の死亡原因で最も多い。
5. 血清クレアチニン濃度は低下する。

## 問題.94

100%

早期の前頭側頭型認知症でみられないのはどれか。

1. 幻視
2. 常同行動
3. 病識低下
4. 自発性低下
5. 社会的対人行動の障害

## 問題.95

78.6%

介護保険制度で正しいのはどれか。

1. COPDは特定疾患ではない。
2. 加入は45歳以上に義務づけられる。
3. 都道府県の介護保険係に介護認定を申請する。
4. 要介護認定の区分別支給限度額は同じである。
5. 要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。

## 問題.96

92.0%

てんかんで正しいのはどれか。

1. 遺伝素因はない。
2. 意識障害が必発する。
3. 高齢発症は稀である。
4. 病因は特発性と症候性に分けられる。
5. 我が国の患者は約10万人と推定されている。

## 問題.97

84.0%

統合失調症に特徴的な思考の障害はどれか。

1. 思考が緩徐でうまく進まない。
2. 思考の進行が突然遮断され会話が停止する。
3. まわりくどく、要領よく思考目標に到達できない。
4. 観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴う。
5. 観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていく。

## 問題.98

80.0%

摂食障害について正しいのはどれか。

1. 摂食障害は女性のみ発症する。
2. 神経性大食症は神経性無食欲症より有病率が高い。
3. 神経性大食症では、自己誘発性嘔吐は認められない。
4. 神経性大食症から神経性無食欲症に移行することはない。
5. 神経性無食欲症では、過活動や運動強迫が認められない。

## 問題.99

98.6%

見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1. 依存性パーソナリティ障害
2. 演技性パーソナリティ障害
3. 回避性パーソナリティ障害
4. 境界性パーソナリティ障害
5. 自己愛性パーソナリティ障害

## 問題.100

20.0%


概日リズムの障害による疾患はどれか。

1. 睡眠時遊行症
2. ナルコレプシー
3. 睡眠相後退症候群
4. むずむず脚症候群
5. レム睡眠行動障害

## 問題.1

82.9%

小児を裸足で方眼紙の上を歩行させた図を示す。  
重複歩距離はどれか。




1. 10cm      2. 20cm      3. 35cm      4. 40cm      5. 55cm


## 問題.2

98.6%

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による）で、正しいのはどれか。




1. 手屈曲




2. 手伸展



3. 手橈屈



4. 母指掌側外転



5. 母指橈側外転

———：基本軸

———：移動軸

1. 手屈曲

2. 手伸展

3. 手橈屈

4. 母指掌側外転

5. 母指橈側外転

## 問題.3

5.7%

Danielsらの徒手筋力テストによる検査方法を図1に、前腕中央部の断面図を図2に示す。

図1の方法で段階3を判定できる筋は図2のどれか。




図1




図2

1. ①      2. ②      3. ③      4. ④      5. ⑤

## 問題.4

20.0%

図に示す方法で筋力測定器を用いて膝関節伸展等尺性筋力を測定したところ、測定値は28kgfであった。膝関節伸展トルクはどれか。




1. 約6.9Nm
2. 約17.2Nm
3. 約34.5Nm
4. 約51.8Nm
5. 約68.6Nm

## 問題.5

44.3%

5歳の女児。左股関節痛を訴えている。エックス線写真を示す。  
疑うべき疾患はどれか。




1. 大腿骨頭壊死症
2. 大腿骨頭すべり症
3. 単純性股関節炎
4. 発育性股関節形成不全
5. Perthes病

## 問題.6

52.9%

5歳の女児。左股関節痛を訴えている。エックス線写真を示す。  
この疾患について正しいのはどれか。




1. 外傷が原因である。
2. 可動域制限は生じない。
3. 感染症が原因である。
4. 男児に多い。
5. 二次性変形性股関節症になりにくい。

## 問題.7

78.6%

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。  
影響しているのはどれか。




1. 緊張性迷路反射
2. 屈筋逃避反射
3. 非対称性緊張性頸反射
4. Moro反射
5. Landau反射

## 問題.8

80.0%

検査用紙を図に示す。

1から25までの数字を1から順にできるだけ速く線を引いてつなぐのに要する時間を測定する検査はどれか。



1. BADS      2. BIT      3. CAT      4. Stroop test      5. TMT-A

## 問題.9

77.1%

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90°屈曲運動を指示したところ、屈曲共同運動パターンがみられた。

この患者で促通すべき筋はどれか。

1. 棘下筋      2. 広背筋      3. 大菱形筋      4. 上腕二頭筋      5. 上腕三頭筋


## 問題.10

64.3%


牽引の場面を図に示す。  
直接牽引法はどれか。




1




2



3



4



5

1.1

2.2

3.3

4.4


5.5

## 問題.11

41.4%

70歳の男性。自転車エルゴメーターを用い負荷強度30Wattsから50Wattsの5種類の一定負荷を行わせた時の心拍数変化を図に示す。

この例に全身持久力トレーニングで運動強度を嫌気性代謝閾値〈AT〉に設定する場合、最も適切な負荷強度（Watts）はどれか。



1. 30      2. 35      3. 40      4. 45      5. 50

## 問題.12

81.4%

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。

この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1. FBS
2. 踵膝試験
3. 鼻指鼻試験
4. FMA 〈Fugl-Meyer assessment〉
5. SARA 〈scale for the assessment and rating test〉

## 問題.13

90.0%

8歳の男児。脳性麻痺による痙直型両麻痺。GMFCSレベルIIIであり、床上はバニーホッピングで移動している。学校内の移動は車椅子駆動で自立している。


車椅子の設定で正しいのはどれか。

1. ヘッドサポートをつける。
2. 座面高は標準より高くする。
3. 背もたれの高さは肩までとする。
4. 背もたれはリクライニング式にする。
5. フットサポートはスイングアウト式にする。


## 問題.14

88.6%


関節リウマチ（SteinbrockerのステージⅢ、クラス3）のADL指導で正しいのはどれか。



1



2



3



4



5

1. 1      2. 2      3. 3      4. 4      5. 5

## 問題.15

95.7%

46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1. 杖を用いた歩行練習
2. 水中歩行による有酸素運動
3. 背臥位での下肢筋のストレッチ
4. 階段昇降による筋力増強トレーニング
5. 自転車エルゴメーターでの筋持久性トレーニング

## 問題.16

40.0%

83歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。  
疑うべき疾患はどれか。




1. 股関節脱臼
2. 大腿骨近位部骨折
3. 恥骨結合離開
4. 恥骨骨折
5. 腸骨骨折

## 問題.17

84.3%

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。

この患者に適切なのはどれか。



1.1      2.2      3.3      4.4      5.5

問題.18

95.7%

17歳の男子。頸髄損傷。プールに飛び込んだ際に、頭部を底に打ちつけて受傷した。受傷8週後のMMT結果を表に示す。  
機能残存レベルはどれか。

|         | 右 | 左 |
|---------|---|---|
| 三角筋     | 4 | 4 |
| 上腕二頭筋   | 4 | 4 |
| 上腕三頭筋   | 2 | 2 |
| 橈側手根屈筋  | 1 | 2 |
| 長橈側手根伸筋 | 4 | 5 |
| 指伸筋     | 0 | 0 |

1. C4      2. C5      3. C6      4. C7      5. C8

## 問題.19

52.9%

66歳の男性。意識障害で右上肢を下に腹臥位で体動困難となっているところを発見された。両膝、右手首、右肘および右前胸部に多発褥瘡を認め、脱水症を伴うことから発症後数日が経過していると考えられた。保存的加療とともに理学療法が開始され、徐々に意識障害が改善すると、入院後1か月で訓練中に右手のしびれを訴え、図のような手を呈した。この患者の右手に適応となるのはどれか。




1. BFO
2. 虫様筋カフ
3. 短対立装具
4. 手関節駆動式把持装具
5. コックアップ・スプリント

## 問題.20

71.4%

75歳の男性。脳挫傷。飲酒しトイレで倒れていた。頭部CTを示す。明らかな運動麻痺はなく、反復唾液嚥下テスト〈RSST〉は5回/30秒である。改訂水飲みテスト〈MWST〉や食物テストでは嚥下後の呼吸は良好でむせもない。義歯を使用すれば咀嚼可能であるが、実際の食事場面では自分で食物を口に運ぼうとしない。  
この患者の摂食嚥下で障害されているのはどれか。



1. 先行期      2. 準備期      3. 口腔期      4. 咽頭期      5. 食道期

## 問題.21

50.0%

対応のない正規分布を示す連続変数の2群間の差を検定するとき用いるのはどれか。

1. Fisherの正確確率検定
2. Kruskal-Wallis検定
3. log-rank検定
4. 相関分析
5. Studentのt検定

## 問題.22

70.0%

チーム医療において理学療法士が行われないのはどれか。

1. チームのリーダーを務める。
2. 要介護認定申請の意見書を作成する。
3. 栄養指導について管理栄養士に相談する。
4. 人工呼吸器の設定について医師に相談する。
5. 福祉用具の貸与についてソーシャルワーカーに相談する。

## 問題.23

85.7%

四肢長と測定部位の組合せで正しいのはどれか。

1. 棘果長――上前腸骨棘の最下端から内果の最下端まで
2. 手長――橈骨茎状突起の最下端から中指の先端まで
3. 上腕長――肩峰の最前端から肘頭の最突出点まで
4. 前腕長――肘頭の最上端から尺骨茎状突起の最下端まで
5. 転子果長――小転子の最上端から外果の外側突出点まで

## 問題.24

74.3%

除細動が必要となる可能性が高い不整脈はどれか。

1. I度房室ブロック
2. 心室頻拍
3. 単発の上室期外収縮
4. 慢性心室細動
5. 連続しない心室期外収縮

## 問題.25

94.3%

腱反射が亢進する疾患はどれか。

1. 多発性筋炎
2. 多発性硬化症
3. Guillain-Barré症候群
4. 尿毒症性ニューロパチー
5. Duchenne型筋ジストロフィー

## 問題.26

12.9%

Danielsらの徒手筋力テストで、検査する筋の段階と開始肢位の組合せで正しいのはどれか。

1. 菱形筋群の段階4――肘関節伸展位
2. 上腕三頭筋の段階4――肩関節屈曲位
3. 大殿筋の段階3――膝関節伸展位
4. 大腿四頭筋の段階2――股関節屈曲位
5. 後脛骨筋の段階2――足関節底屈位

## 問題.27

95.7%

Timed Up and Go Test 〈TUG〉で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 開始肢位は立位である。
2. 6m先に目印を設置する。
3. 歩行補助具の使用を禁止する。
4. バランス機能の評価方法である。
5. 動作開始から背もたれ座位までの時間を測定する。

## 問題.28

20.0%

Japanese Edition DENVER II で8か月児が通過率75%以上で可能なのはどれか。2つ選べ。

1. 寝返り
2. 1人で座る
3. 5秒以上座れる
4. つかまって立ち上がる
5. 5秒以上つかまり立ちできる

## 問題.29

95.7%

遂行機能障害の診断に用いる検査はどれか。

1. WCST
2. WAIS-III
3. 図形模写
4. Reyの複雑図形検査
5. PASAT 〈paced auditory serial addition test〉

## 問題.30

77.1%

下肢の異常と金属支柱付き短下肢装具の足継手の設定との組合せで正しいのはどれか。

1. 尖足――前方制動
2. 反張膝――遊動
3. 立脚時の膝折れ――前方制動
4. 下腿三頭筋の痙縮――遊動
5. 前脛骨筋の弛緩性麻痺――遊動

## 問題.31

84.3%

Bennett骨折を生じるのはどれか。

1. 月状骨
2. 尺骨
3. 舟状骨
4. 第1中手骨
5. 橈骨

## 問題.32

95.7%

Spurlingテストが陽性のとき、疑うべき疾患はどれか。

1. 環軸関節回旋位固定
2. 頸椎症性神経根症
3. 腰椎椎間板ヘルニア
4. 腰椎分離症
5. 腰部脊柱管狭窄症

## 問題.33

52.9%

Brunnstrom法ステージの検査において、ステージと可能な随意運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 手指Ⅲ――座位で不十分な全指伸展
2. 上肢Ⅲ――座位で肩関節内転・肘関節伸展・前腕回内
3. 下肢Ⅲ――座位で膝関節屈曲位で踵を床につけたまま足関節背屈
4. 下肢Ⅳ――立位で股関節伸展位での膝関節屈曲
5. 下肢Ⅴ――立位で股関節外転

## 問題.34

97.1%

多系統萎縮症に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1. Shy-Drager症候群
2. 進行性核上性麻痺
3. Friedreich失調症
4. 大脳皮質基底核変性症
5. オリブ橋小脳萎縮症

## 問題.35

14.3%

ミオパチーの原因となるのはどれか。

1. 一酸化炭素中毒
2. 甲状腺中毒
3. 水銀中毒
4. 鉛中毒
5. ヒ素中毒

## 問題.36

65.7%

成人期に発症するポリオ後症候群のHalsteadらの診断基準にないのはどれか。

1. 感覚障害
2. 関節痛
3. 筋萎縮
4. 筋肉痛
5. 疲労

## 問題.37

65.7%

糖尿病患者において低血糖発作時にみられる症状はどれか。

1. 嘔吐
2. 胸痛
3. 口渇
4. 発汗
5. 腹痛

## 問題.38

34.3%

他の筋への影響を最小限にして伸張運動を行う場合、伸張筋と運動方向の組合せで適切なのはどれか。

1. 薄筋――股関節伸展位、膝関節屈曲位で股関節外転
2. 中間広筋――股関節伸展位・内外旋中間位で膝関節屈曲
3. ヒラメ筋――膝関節伸展位、足部内外反中間位で足関節背屈
4. 三角筋前部――肩関節内外旋中間位、肘関節伸展位で肩関節伸展
5. 長橈側手根伸筋――肘関節伸展位、前腕回内位、手関節尺屈位で掌屈

## 問題.39

24.3%

ランプ負荷法を用いて軽い負荷強度から最大運動強度まで運動強度を漸増した場合、運動強度に比例して直線的に増加するのはどれか。

1. 呼吸数
2. 酸素摂取量
3. 分時換気量
4. 1回心拍出量
5. 二酸化炭素排泄量

## 問題.40

74.3%

PTB式免荷装具の除圧部位はどれか。2つ選べ。

1. 脛骨内側面
2. 脛骨粗面
3. 膝蓋靱帯
4. 前脛骨筋部
5. 腓骨頭

## 問題.41

98.6%

筋力増強運動について正しいのはどれか。

1. 等尺性筋力増強運動では1回あたり20～30秒間以上の収縮が必要である。
2. 筋力を維持するためには最大筋力の70～80%以上の抵抗が必要である。
3. 目的としていない筋に代償運動が起こる方がよい。
4. 等速性筋力増強運動では重錘ベルトを使用する。
5. 等尺性筋収縮では血圧上昇に留意する。

## 問題.42

91.4%

骨折により骨壊死を起こしやすいのはどれか。

1. 距骨
2. 踵骨
3. 中間楔状骨
4. 内側楔状骨
5. 立方骨

## 問題.43

70.0%

腰椎変性すべり症で歩行中に殿部から下肢にかけて疼痛が出現したときの対応で正しいのはどれか。

1. しゃがみこむ。
2. 速度を速めて歩き続ける。
3. 速度を遅くして歩き続ける。
4. 立ち止まって体幹を伸展する。
5. 立ち止まって体幹を左右に回旋する。

## 問題.44

88.6%

急性期脳血管障害に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1. JCS3桁
2. 重度な運動麻痺
3. 神経症状の増悪
4. 収縮期血圧220mmHg
5. 重篤な全身性合併症

## 問題.45

80.0%

頸髄損傷の呼吸障害で正しいのはどれか。

1. 肺活量は低下する。
2. 咳の強さは変わらない。
3. 予備吸気量は増加する。
4. 予備呼気量は変わらない。
5. 閉塞性換気障害が生じやすい。

## 問題.46

74.3%

8歳の脳性麻痺児が階段昇降時に手すりを必要とし、長距離の歩行や狭い場所を歩くときに介助が必要な場合、GMFCS-Expanded and Revised 〈E&R〉のレベルはどれか。

1. レベルⅠ
2. レベルⅡ
3. レベルⅢ
4. レベルⅣ
5. レベルⅤ

## 問題.47

80.0%

人工呼吸器装着患者の理学療法で適切でないのはどれか。

1. 離床はベッドアップ60°までとする。
2. 体位変換を行い気道内分泌物の移動を促す。
3. 気管内吸引時は陰圧をかけずに吸引カテーテルを挿入する。
4. 気管内吸引に使用するカテーテルは滅菌したものを使用する。
5. 会話が不可能なため患者が自分のニーズを伝えられるように援助する。

## 問題.48

35.7%

歩行（80m/分）に相当する運動強度に最も近いのはどれか。

1. 1.5 METs
2. 3.5 METs
3. 5.0 METs
4. 6.0 METs
5. 7.0 METs

## 問題.49

25.7%

障害者総合支援法に基づくサービスのうち、介護給付にあたるのはどれか。

1. 補装具
2. 相談支援
3. 自立生活援助
4. グループホーム
5. ホームヘルプサービス

## 問題.50

50.9%

訪問リハビリテーションで正しいのはどれか。

1. 日常生活の自立支援を目的とする。
2. 通所介護（デイサービス）との併用はできない。
3. 事業所には理学療法士を配置しなければならない。
4. 通所リハビリテーションよりも優先的に利用される。
5. 事業所にはリハビリテーションを実施するスペースが必要である。

## 問題.51

95.7%

大脳基底核に分類されるのはどれか。

1. 視床
2. 上丘
3. 被殻
4. 下垂体
5. 歯状核

## 問題.52

44.3%

外胚葉から発生するのはどれか。2つ選べ。

1. 乳腺
2. 卵巣
3. 甲状腺
4. 松果体
5. 上皮小体

## 問題.53

100%

中間楔状骨に接するのはどれか。

1. 距骨
2. 脛骨
3. 舟状骨
4. 踵骨
5. 腓骨

## 問題.54

100%

筋皮神経支配の筋はどれか。2つ選べ。

1. 肘筋
2. 棘下筋
3. 三角筋
4. 烏口腕筋
5. 上腕二頭筋

## 問題.55

76.0%

冠状動脈で正しいのはどれか。

1. 大動脈弁の心室側から出る。
2. 左右の冠状動脈は吻合しない。
3. 左冠状動脈は房室結節に血液を送る。
4. 右冠状動脈は前下降枝と回旋枝に分かれる。
5. 左冠状動脈は心室中隔前方2/3に血液を送る。

## 問題.56

87.1%

動脈と触知可能な部位との組合せで誤っているのはどれか。

1. 上腕動脈――上腕二頭筋後内側縁
2. 橈骨動脈――前腕掌側面の外側遠位部
3. 大腿動脈――Scarpa三角内
4. 足背動脈――足背の長母指伸筋腱と長指伸筋腱の間
5. 後脛骨動脈――外果後方

## 問題.57

40.0%

胃について正しいのはどれか。

1. 幽門は食道に連なる。
2. 胃切痕は大弯側にある。
3. 胃体の下端部を胃底という。
4. 噴門は第1腰椎の右側にある。
5. 胃の大弯は大綱を介して横行結腸と結合する。

## 問題.58

100%

泌尿器について正しいのはどれか。

1. 尿管口は膀胱尖に開く。
2. 尿管内部には逆流防止弁がある。
3. 男性の尿道は女性に比べて短い。
4. 男性の尿道は前立腺を貫いている。
5. 内尿道口は膀胱三角の中央に開く。

## 問題.59

91.4%

内耳に含まれるのはどれか。

1. 鼓室
2. 耳管
3. キスタ骨
4. 膜半規管
5. アブミ骨筋

## 問題.60

32.9%

Scarpa三角の内で触知できる筋はどれか。2つ選べ。

1. 大腿直筋
2. 恥骨筋
3. 腸腰筋
4. 内閉鎖筋
5. 梨状筋

## 問題.61

64.3%

細胞について誤っているのはどれか。

1. 細胞膜は二重膜である。
2. 細胞膜は主にリン脂質から構成される。
3. ミトコンドリアではATP生成を行っている。
4. リボソームは蛋白質とDNAから構成される。
5. Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>ポンプにより細胞内のNa<sup>+</sup>は低く保たれる。

## 問題.62

100%

神経筋接合部における神経伝達物質はどれか。

1. ノルアドレナリン
2. アセチルコリン
3. アドレナリン
4. セロトニン
5. ドパミン

## 問題.63

65.7%

Brodmanにより決定された皮質領野で一次運動野に相当するのはどれか。

1. 1野      2. 4野      3. 17野      4. 22野      5. 44野

## 問題.64

70.0%

筋紡錘の感覚神経線維で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. Ia      2. Ib      3. II      4. α      5. γ

## 問題.65

60.0%

心室収縮期に生じているのはどれか。2つ選べ。

1. 三尖弁開放
2. 僧帽弁閉鎖
3. 大動脈弁閉鎖
4. 肺動脈圧低下
5. 肺動脈弁開放

## 問題.66

92.9%

脳神経とその働きの組合せで正しいのはどれか。

1. 顔面神経——軟口蓋の挙上
2. 三叉神経——下顎の運動
3. 舌咽神経——舌の運動
4. 舌下神経——唾液分泌
5. 迷走神経——口唇閉鎖

## 問題.67

87.1%

排尿に関与する神経で正しいのはどれか。

1. 脳における排尿中枢は延髄にある。
2. 外尿道括約筋は下腹神経支配である。
3. 内尿道括約筋は陰部神経支配である。
4. 交感神経路の興奮は膀胱を弛緩させる。
5. 副交感神経路は第11胸髄～第2腰髄レベルから生じる。

## 問題.68

52.9%

男性生殖器官系で正しいのはどれか。

1. 勃起中枢は腰髄にある。
2. 陰茎海綿体神経は動脈収縮作用をもつ。
3. 射精は副交感神経の作用を介して起きる。
4. 性的刺激による勃起には辺縁系が関与する。
5. 射精後の精子は女性の腔内で1週間程度生存する。

## 問題.69

98.6%

嫌氣的代謝の過程で生成される物質はどれか。

1. アミノ酸
2. クエン酸
3. フマル酸
4. ピルビン酸
5. イソクエン酸

## 問題.70

80.0%

前腕回内の作用をもつのはどれか。2つ選べ。

1. 上腕筋
2. 腕橈骨筋
3. 上腕二頭筋
4. 上腕三頭筋
5. 橈側手根屈筋

## 問題.71

92.0%

筋と足への作用との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 足の長母指伸筋――背屈
2. 後脛骨筋――内がえし
3. 前脛骨筋――外がえし
4. 第三腓骨筋――底屈
5. 長腓骨筋――背屈

## 問題.72

88.6%

股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲に作用する筋はどれか。

1. 大腿筋膜張筋
2. 大腿二頭筋
3. 中間広筋
4. 半腱様筋
5. 縫工筋

## 問題.73

100%

努力吸気時に働く筋はどれか。

1. 腹横筋
2. 腹直筋
3. 外腹斜筋
4. 内腹斜筋
5. 胸鎖乳突筋

## 問題.74

44.0%

反射マーカを用いた三次元歩行分析装置で評価が最も困難なのはどれか。

1. 歩幅
2. 歩行率
3. 重心の変化
4. 足底圧分布
5. 関節角度変化

## 問題.75

40.0%

尿検査項目とその検査結果が高値となる疾患との組合せで正しいのはどれか。

1. ケトン体――膵炎
2. ビリルビン――糖尿病
3. アルブミン――肝硬変
4. ヘモグロビン――心筋梗塞
5. ミオグロビン――横紋筋融解症

## 問題.76

76.0%

悪性腫瘍細胞の特徴で誤っているのはどれか。

1. 増殖が速い。
2. 核分裂が多い。
3. 染色体異常が多い。
4. 核/細胞質比が小さい。
5. 未分化型は悪性度が高い。

## 問題.77

97.1%

ステロイド薬の長期投与によって生じやすいのはどれか。

1. 腎不全
2. 低血圧
3. 骨粗鬆症
4. 体重減少
5. 高カリウム血症

## 問題.78

22.9%

良性の骨軟部腫瘍はどれか。

1. 脊索腫
2. 軟骨肉腫
3. 血管内皮腫
4. 海綿状血管腫
5. 多発性骨髄腫

## 問題.79

92.9%

転移・逆転移で適切なのはどれか。

1. 陰性転移の解釈は避ける。
2. 転移は逆転移を誘発する。
3. 逆転移は治療の阻害因子となる。
4. 逆転移は治療者の意識的反応である。
5. 心理治療の目標は陽性転移の出現である。

## 問題.80

88.0%

Eriksonによる成人中期の心理的発達課題はどれか。

1. 勤勉性
2. 同一性
3. 親密性
4. 生殖性
5. 自我の統合

## 問題.81

100%

心理検査と評価内容の組合せとして適切なのはどれか。

1. SCT――認知機能
2. WCST――自我状態
3. P-Fスタディ――認知症介護負担度
4. Rorschachテスト――自己効力感
5. 内田・クレペリン精神テスト――性格・行動面の特徴

## 問題.82

92.0%

切断後の幻肢で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 幼児の切断では強く現れる。
2. 四肢末梢部ほど明確に感じる。
3. いったん出現した幻肢は消失しない。
4. 術直後義肢装着法には予防効果がある。
5. 上肢切断よりも下肢切断で強く現れる。

## 問題.83

100%

Brown-Séquard症候群で損傷髄節よりも下位の反対側に現れる症状はどれか。2つ選べ。

1. 運動麻痺
2. 触覚障害
3. 痛覚障害
4. 温度覚障害
5. 深部覚障害

## 問題.84

94.3%

脊髄損傷で正しいのはどれか。

1. 受傷直後は尿失禁状態となる。
2. 排尿筋括約筋協調不全は生じない。
3. 残尿が150mLでは導尿は不要である。
4. 核・核下型神経因性膀胱であれば尿道カテーテル長期留置を行う。
5. 核上型神経因性膀胱であればトリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。

## 問題.85

88.0%

診断においてMRI拡散強調像が最も有用なのはどれか。

1. 頭蓋底骨折
2. 脳室内出血
3. 脳梗塞急性期
4. 脳出血急性期
5. くも膜下出血急性期

## 問題.86

100%

肩腱板断裂で陽性となるのはどれか。

1. Adsonテスト
2. drop armテスト
3. Finkelsteinテスト
4. Phalenテスト
5. Thomsenテスト

## 問題.87

95.7%

疾患と頻度の多い症候との組合せで正しいのはどれか。

1. Alzheimer型認知症——羽ばたき振戦
2. Huntington病——線維束性収縮
3. 多発性硬化症——舞踏運動
4. 筋萎縮性側索硬化症——静止時振戦
5. 多系統萎縮症——起立性低血圧

## 問題.88

28.0%

視神経脊髄炎で正しいのはどれか。

1. 再発と寛解を繰り返す。
2. レム睡眠行動異常を生じる。
3. 免疫不全状態で罹患しやすい。
4. JCウイルス感染により発症する。
5. 抗コリンエステラーゼ薬で症状が改善する。

## 問題.89

94.3%

筋強直性ジストロフィーで正しいのはどれか。

1. 5歳までに発症する。
2. 伴性劣性遺伝である。
3. 顔面筋は侵されにくい。
4. ミオトニアがみられる。
5. 認知機能は障害されない。

## 問題.90

28.0%

心室中隔欠損症で正しいのはどれか。

1. チアノーゼを生じる。
2. 動脈管が開在している。
3. 卵円孔の閉鎖不全である。
4. 肺血流量は正常時よりも多くなる。
5. 大動脈から肺動脈に直接血液が流れる。

## 問題.91

52.0%

β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標はどれか。

1. PCI
2. Borg指数
3. Karvonen法
4. 安静時心拍数
5. 最大予測心拍数

## 問題.92

70.0%

血友病の臨床症状で最も多いのはどれか。

1. 関節内出血
2. 血小板数減少
3. 出血時間延長
4. 毛細血管拡張
5. リンパ節腫脹

## 問題.93

51.4%

多発性骨髄腫に特徴的でないのはどれか。

1. 貧血
2. 腎障害
3. 易感染性
4. 病的骨折
5. 低カルシウム血症

## 問題.94

75.7%

2型糖尿病患者における運動療法の効果で誤っているのはどれか。

1. インスリン抵抗性の増大
2. 血圧低下
3. 血糖コントロールの改善
4. 脂質代謝の改善
5. 心肺機能の改善

## 問題.95

96.0%

骨粗鬆症の原因で誤っているのはどれか。

1. 安静臥床
2. 胃切除後
3. 糖尿病
4. ビタミンA欠乏症
5. 副甲状腺機能亢進症

## 問題.96

88.0%

認知症患者に対して行われるのはどれか。2つ選べ。

1. 音楽療法
2. 内観療法
3. 森田療法
4. 精神分析療法
5. リアリティオリエンテーション

## 問題.97

96.0%

統合失調症において予後が良いのはどれか。

1. 男性
2. 若年での発症
3. 潜行性の発症
4. 強い陰性症状の存在
5. 明らかな発症誘因の存在

## 問題.98

36.0%

うつ病の復職支援プログラムの内容として最も適切なのはどれか。

1. 認知の歪みは修正しない。
2. 服薬自己管理の練習をする。
3. キャリア再構成の検討は行わない。
4. コミュニケーション能力の改善を図る。
5. 配置換えをしないことを前提に職場との連絡調整を行う。

## 問題.99

70.0%

解離性障害の治療として正しいのはどれか。

1. 破壊的行動を許容する。
2. 空想の肥大化について指摘しない。
3. 有害な刺激を無理に取り除かない。
4. 速やかに心的外傷の直面化を図る。
5. 病気と治療について明確に説明する。

## 問題.100

80.0%

てんかんに伴う精神症状として適切でないのはどれか。

1. 粘着性
2. 爆発性
3. 疾病利得
4. 不機嫌状態
5. もうろう状態