

問題.1

解答:5 (2024.1)

30歳の女性。バドミントンの選手である。

膝前十字靭帯損傷を予防するための指導で最も適切なのはどれか。

1. 後方重心を意識した動作を指導する。
2. 体幹浅層の筋カトレーニングを指導する。
3. 下肢遠位筋の協調性トレーニングを指導する。
4. ジャンプ着地時に膝が内反位にならないように指導する。
5. 静的な姿勢保持からバランストレーニングに進めるように指導する。

問題.2

解答:2 (2024.2)

84歳の男性。心疾患の既往はない。転倒して右大腿骨近位部骨折を受傷し、緊急で骨接合術を受けた。翌日離床を目的に理学療法が処方されたが、右下腿の腫脹と圧痛を訴えている。

最も優先的に確認すべき血液検査項目はどれか。

1. BNP 2. Dダイマー 3. HbA1c 4. PT-INR 5. SP-D


問題.3

解答:5 (2024.3)

65歳の男性。入浴中、軽度の意識障害および左片麻痺が突然出現したため救急車で搬送された。救急外来到着時の頭部単純CTを示す。

考えられるのはどれか。

No. 1 (P 問題3)



1. 慢性硬膜下血腫 2. くも膜下出血 3. 脳梗塞 4. 脳挫傷 5. 脳出血

問題.4

解答: 3 (2024.4)

50歳の女性。2日前に階段を下りた際に膝を捻った。その直後から左膝の痛みが続いているために受診した。左膝内側および膝窩部に痛みがあり、McMurrayテスト陽性であった。エックス線写真では明らかな異常所見を認めない。次に確認すべき検査はどれか。

1. 間接造影
2. CT
3. MRI
4. PET<positron emission tomography>
5. SPECT<single-photon emission computed tomography>

問題.5


解答: 4 (2024.5)

73歳男性。身長170cm、体重55Kg。糖尿病でインスリン治療導入中。運動強化の決定のため自転車エルゴメーターを用いて、1分間に20Watts増加させるランプ負荷法で心肺運動負荷試験を行った。二酸化炭素排出量及び酸素摂取量の変化グラフを示す。

指導すべき適切な運動強度はどれか。

ただし、1METの酸素摂取量は3.5mL/min/Kgとする。

No. 2 (P 問題5)




1. 約3METs
2. 約4METs
3. 約5METs
4. 約6METs
5. 約7METs

問題.6

解答:5 (2024.6)

図のように検者が脛骨内縁をこすりおろす検査を実施した。
該当する病的反射はどれか。




1. Babinski反射
2. Chaddock反射
3. Gonda反射
4. Gordon反射
5. Oppenheim反射

問題.7

解答:5 (2024.7)

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に従って図のように肩関節の可動域を測定する。
正しいのはどれか。



1. 背臥位で測定する。
2. 運動方向は屈曲である。
3. 基本軸は上腕骨である。
4. 参考可動域は135度である。
5. 体幹側屈の代償運動に注意する。

問題.8

解答:4 (2024.8)

イラストのようにDanielsらの徒手筋力テストを実施した。
正しいのはどれか。



← : 検査者の加える力の方

1. 骨盤を後傾させて行う。
2. 検査対象は縫工筋である。
3. 対象筋の段階2のテストは背臥位で行う。
4. 検査者が抵抗を加える部位は大腿遠位部である。
5. 股関節外転外旋を伴った際は大腿筋膜張筋の代償を疑う。

問題.9

解答:2 (2024.9)

50歳の男性。高所から転落し脳挫傷と診断された。入院直後から他者への配慮を欠く言動が多くみられた。家族によると、受傷前は几帳面で温厚な人物であったが、受傷後は著しく自己中心的で粗暴な言動が増え、このままでは同居は難しいとの訴えがあった。

この患者に用いる検査で最も優先度が高いのはどれか。

1. ASIA 2. FAB 3. MMSE 4. Rey複雑図形検査 5. SLTA

問題.10

解答:4 (2024.10)

70歳の女性。両側変形性膝関節症。外来通院中である。自宅におけるADLは、FIMによる評価で、2項目（歩行・車椅子および階段）はT字杖を使用している自立であったが、それ以外は補助具を使用せずに自立していた。コミュニケーション（理解、表出）や社会的認知（社会的交流、問題解決、記憶）は問題ない。

FIMの点数はどれか。

1. 118 2. 120 3. 122 4. 124 5. 126

問題.11

解答: 2,3 (2024 11)

50歳の男性。左下腿切断。義足歩行練習中に左側の踵接地から立脚中期までに急激な膝屈曲が生じた。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1. 足部が底屈しすぎている。
2. 足部後方バンパーが硬すぎる。
3. ソケット初期屈曲角が大きすぎる。
4. ソケットが足部に対して後方すぎる。
5. ソケット初期内転角が不足している。

問題.12

解答: 5 (2024 12)

図に示す姿勢のうち、労働災害予防を目的とした動作指導で適切な作業姿勢はどれか。




1



2



3



4



5

問題.13

解答:4 (2024 13)

36歳の男性。1週前、バイク運転中に転倒し左前腕を打撲した。その後、徐々に左手指の伸展が困難になった。左上肢の MMTは肘関節屈曲が5、前腕回外が2、手関節屈曲が4、手関節伸展が4、手指伸展が1。左上肢の感覚障害は認めない。針筋電図検査では回外筋、総指伸筋および長母指伸筋で安静時に脱神経電位を認めた。障害されている神経はどれか。

1. 尺骨神経 2. 正中神経 3. 橈骨神経 4. 後骨間神経 5. 前骨間神経

問題.14

解答:2 (2024 14)

6歳の男児。二分脊椎。歩行時の様子を図に示す。
予測される Sharrardの分類の上限はどれか。



1. I 群 2. II 群 3. III 群 4. IV 群 5. V 群

問題.15

解答:3 (2024 15)

60歳の男性。内側型の変形性膝関節症に対して手術療法が行われた。術後のエックス線写真を示す。
骨癒合を促進させるために最も優先度が高い治療法はどれか。

No. 3 (P 問題 15)



1. 温熱療法 2. 牽引療法 3. 超音波療法 4. 電気刺激療法 5. 電磁波療法

問題.16

解答:4 (2024 16)

2歳3か月の女児。出生時に頭蓋内出血を合併し脳性麻痺と診断された。現在、四肢の筋緊張は低下し、姿勢や動きの中で両下肢の筋緊張が亢進する。両上肢にアテトーゼ様の動きがあり ADLは全介助である。両上肢で支持して座位が1分程度は可能である。発達歴は、頸定：10か月、寝返り：1歳2か月、ずり這い：1歳5か月。
現時点で最も必要な補装具はどれか。

1. 歩行器 2. 靴型装具 3. 電動車椅子 4. 座位保持装置 5. 普通型車椅子

問題.17

解答:3 (2024 17)

76歳の男性。左足関節の痛みに対して手術療法が行われた。術後エックス線写真を示す。
術後の理学療法で正しいのはどれか。



1. 術直後から荷重を開始する。
2. 疼痛軽減のため電磁波療法を行う。
3. 膝関節可動域練習を積極的に行う。
4. 外固定が外れたら足指可動域練習を開始する。
5. 内固定破損の可能性があるので骨癒合が得られるまで短下肢装具を使用する。

問題.18

解答:3 (2024 18)

74歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。平行棒内立位保持練習では重心が左側に偏り、平行棒に骨盤が寄りかかるような姿勢を呈する。
この症状を改善するための理学療法で正しいのはどれか。


1. 骨盤を左から右方向へ押す。
2. 右上肢で前方向へのリーチ運動を行わせる。
3. 前方に鏡を置き立位姿勢の傾きを認識させる。
4. 左下肢に膝装具を装着し立位保持練習を行う。
5. レイミステ現象を利用して左股関節内転筋を強化する。

問題.19

解答:2 (2024 19)

73歳の女性。胸部単純エックス線写真を示す。
考えられる疾患または状態はどれか。

No. 5 (P 問題 19)



- 右
1. 気胸
 2. 間質性肺疾患
 3. 気管切開術後
 4. 肺葉切除術後
 5. 慢性閉塞性肺疾患

問題.20

解答:3 (2024 20)

30歳の女性。検診で早期の乳癌と診断され、乳房温存手術を予定している。
周術期理学療法を開始するにあたり、活動能力の評価方法で正しいのはどれか。

1. CFS <cancer fatigue scale>
2. FACT
3. KPS
4. PPI <palliative prognostic index>
5. TNM分類

問題.21

解答:5 (2024 21)

対応があり正規分布を示さない連続変数の2群間の差を検討するのはどれか。

1. Paired-t検定
2. 一元配置分散分析
3. Kruskal-Wallis検定
4. Mann-WhitneyのU検定
5. Wilcoxon符号付順位検定

問題.22

解答:2 (2024 22)

二次予防の組合せで正しいのはどれか。

1. 健康成人————禁煙指導
2. 脂質異常症患者————栄養指導
3. 回復期の脳血管疾患患者——服薬指導
4. 急性期の脳血管疾患患者——血压管理
5. 生活期の脳血管疾患患者——運動指導

問題.23

解答:3 (2024 23)

筋収縮で正しいのはどれか。

1. 神経筋接合部の伝達物質はノルアドレナリンである。
2. カルシウムイオンが筋小胞体内に取り込まれる。
3. 神経支配比はそれぞれの筋で異なる。
4. エネルギー源は ADP である。
5. A 帯が短縮する。

問題.24

解答:3 (2024 24)

課題と記憶の組合せで正しいのはどれか。

1. 自転車に乗る————エピソード記憶
2. 海外旅行の思い出を語る————展望記憶
3. 紙や鉛筆を使わず暗算する————ワーキングメモリー
4. 教師になったきっかけを説明する——意味記憶
5. 建物の建築方法について説明する——手続き記憶

問題.25

解答:4 (2024 25)

インフォームドコンセントの説明で正しいのはどれか。

1. 終末期の患者は対象外である。
2. 医療法により罰則が課せられる。
3. 専門用語を用いて詳細に伝える。
4. 患者が自己決定する機会を保障する。
5. 患者は一度同意したら撤回できない。

問題.26

解答:5 (2024 26)

標準予防策で正しいのはどれか。

1. 患者間の感染防止が主目的である。
2. 防護具として滅菌手袋が必須である。
3. 患者の汗は感染性があるものとして扱う。
4. 使用後の防護具はマスクを最初に除去する。
5. 患者周囲の物品に触れた後に手指衛生を行う。

問題.27

解答:5 (2024 27)

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準 1995年）に基づく下肢の関節可動域の測定法の原則で正しいのはどれか。

1. 足指では底側に角度計を当てる。
2. 足部の外がえしは膝関節伸展位で行う。
3. 足関節では足底への動きが伸展である。
4. 足部の回内・外転・背屈の複合した動きは内がえしである。
5. 外反・内反という用語は足部の変形を意味するので使用しない。

問題.28

解答:3 (2024 28)

認知症の周辺症状はどれか。

1. 今日の日付が分からない。
2. 携帯電話を使えなくなる。
3. 夜になると家の中を歩き回る。
4. 朝食で食べたものを思い出せない。
5. 目の前にある物品の名称を言えない。

問題.29

解答:5 (2024 29)

ICFで正しいのはどれか。

1. 障害のある人を対象とした分類である。
2. ICIDHとは相互補完的な分類である。
3. 健康状態は構成要素のひとつである。
4. 社会モデルに依拠している。
5. 倫理的ガイドラインがある。

問題.30

解答:5 (2024 30)

関節リウマチの槌指による中足骨頭部の疼痛に対する装具で最も適切なのはどれか。

1. 踵補高
2. 外側フレアヒール
3. 内側フレアヒール
4. 逆 Thomas ヒール
5. メタタルザルパッド

問題.31

解答:5 (2024 31)

変形性股関節症でみられるのはどれか。

1. Tinel徴候
2. Froment徴候
3. Romberg徴候
4. Lhermitte徴候
5. Trendelenburg徴候

問題.32

解答:5 (2024 32)

股関節の屈曲拘縮を調べるテストはどれか。

1. Adsonテスト
2. Jacksonテスト
3. Lachmanテスト
4. Neerテスト
5. Thomasテスト

問題.33

解答:5 (2024 33)

SIASに含まれるのはどれか。

1. 意識障害
2. 異常知覚
3. 嚥下機能
4. 測定障害
5. 視空間認知

問題.34

解答:2 (2024 34)

Parkinson病で正しいのはどれか。

1. 感覚障害が出現する。
2. 安静時振戦が出現する。
3. 深部腱反射が亢進する。
4. 症状の日内変動は少ない。
5. 発症初期には症状が左右対称に出現する。

問題.35

解答:3 (2024 35)

筋萎縮性側索硬化症で正しいのはどれか。

1. 深部感覚が障害されやすい。
2. 認知機能が障害されやすい。
3. 筋萎縮は四肢の遠位に著しい。
4. 眼球運動が早期に障害されやすい。
5. 動脈血二酸化炭素分圧が低下しやすい。

問題.36

解答:4 (2024 36)

熱傷部位の皮膚で正しいのはどれか。

1. 壊死組織は赤色を呈する。
2. III度熱傷は汗腺まで達しない。
3. I度熱傷部位は植皮術を要する。
4. 感染を伴うと植皮の生着が阻害される。
5. 植皮後は知覚が回復してから運動を開始する。

問題.37

解答:2,4 (2024 37)

気管切開患者に対する痰の吸引で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. ファインクラックル〈fine crackles・捻髪音〉を聴取したので吸引する。
2. 無菌的な操作を行う。
3. 成人の吸引圧は80mmHg程度が推奨される。
4. 吸引カテーテルの先端が気管分岐部に当たらない深さにとどめる。
5. 吸引カテーテルを気道内でピストン運動させる。

問題.38

解答:1 (2024 38)

大腿切断術後の切断肢で股関節の屈曲拘縮予防が図れる肢位はどれか。

1. 腹臥位
2. 長時間の車椅子座位
3. 大腿下に枕を入れた背臥位
4. 股関節・膝関節屈曲位の側臥位
5. 両大腿部内側に枕を入れた背臥位

問題.39

解答:3 (2024 39)

下肢の異常と金属支柱付き短下肢装具の足継手設定との組合せで正しいのはどれか。

1. 尖 足—————前方制動
2. 反張膝—————前方制動
3. 立脚期の膝折れ—————前方制動
4. 下腿三頭筋の痙縮————遊 動
5. 前脛骨筋の弛緩性麻痺————遊 動

問題.40

解答:4 (2024 40)

成人の心肺停止に対する1分間あたりの胸骨圧迫の回数で適切なのはどれか。

1. 20回
2. 50回
3. 70回
4. 100回
5. 130回

問題.41

解答:2 (2024 41)

介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。

1. スライディングボード
2. 移動用リフトの吊具
3. ロフトランド杖
4. ベッド用手すり
5. 歩行器

問題.42

解答:4 (2024 42)

アキレス腱周囲炎について正しいのはどれか。

1. 痛は下腿の近位に発生することが多い。
2. 10～20代に多い。
3. Thompson テスト陽性である。
4. 踵補高の足底板を用いる。
5. 過労性骨膜炎が原因となっていることが多い。

問題.43

解答:5 (2024 43)

Parkinson病の治療で適切でないのはどれか。

1. リズム刺激
2. ドパミン作動薬
3. 脳深部刺激療法
4. 経頭蓋磁気刺激法
5. ボツリヌス毒素療法

問題.44

解答: 2,4 (2024 44)

重症筋無力症患者のQMGscore〈Quantitative Myasthenia Gravis score〉に含まれる評価はどれか。2つ選べ。

1. 意識状態
2. 嚥下機能
3. 感覚障害
4. 眼球運動
5. 排尿機能

問題.45

解答: 5 (2024 45)

フレイルの判定要件でないのはどれか。

1. 疲労感
2. 筋力低下
3. 体重減少
4. 身体活動低下
5. 歩行距離減少

問題.46

解答: 4 (2024 46)

IL〈Independent Living〉運動で正しいのはどれか。

1. 1990年代後半に起こった。
2. スウェーデンが発祥である。
3. 社会的排除への戦略として提唱された。
4. 障害者の自己決定促進の取り組みである。
5. 障害の医学的モデルに基づくものである。

問題.47

解答: 2 (2024 47)

QOL評価尺度はどれか。

1. TMT
2. SF-36
3. Katz Index
4. ESCROW Profile
5. 老研式活動能力指標

問題.48

解答: 1,3 (2024 48)

脊髄小脳変性症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. Frenkel体操が有効である。
2. 視野障害を伴うことが多い。
3. 包括的な評価指標にSARAがある。
4. 有病率は人口10万人あたり100人である。
5. 自律神経障害は非遺伝性に比べて遺伝性が多い。

問題.49

解答: 2 (2024 49)

間質性肺疾患患者に対する理学療法で最も適切なのはどれか。

1. 体位排痰法を指導する。
2. 吸気筋トレーニングを指導する。
3. 上肢の筋力増強運動は行わない。
4. 神経筋電気刺激療法は行わない。
5. 有酸素運動はSpO2 60%を目標に実施する。

問題.50

解答:1 (2024 50)

非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉の副作用で正しいのはどれか。


1. 胃潰瘍 2. 骨粗鬆症 3. 多幸感 4. 中心性肥満 5. 低血糖

問題.51

解答:5 (2024 51)

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準 1995年）に従って図のように左股関節の可動域を測定する。

正しいのはどれか。




1. 基本軸は体幹との平行線である。
2. 参考可動域は 60度である。
3. 固定部位は脊柱である。
4. 移動軸は腓骨である。
5. 背臥位で行う。

問題.52

解答: 4 (2024 52)

Danielsらの徒手筋力テストで肩関節屈曲の段階3を測定する際、図のような代償がみられた。代償運動を生じさせている筋はどれか。



1. 僧帽筋 2. 棘上筋 3. 大胸筋 4. 上腕二頭筋 5. 上腕三頭筋

問題.53

解答: 4 (2024 53)

45歳の男性。足底のしびれと疼痛を感じたため病院を受診した。足底に放散する痛みを自覚し、母指外転筋の筋萎縮を認めた。

この患者の内果下方で陽性となる検査はどれか。

1. Silfverskiöld test
2. Single heel rising test
3. Thompson test
4. Tinel sign
5. Too many toes sign

問題.54

解答: 4 (2024 54)


次の文により、4、5の問いに答えよ。

51歳の女性。突然の意識障害で急性期病院に搬入された。意識レベルはJCSⅢ-200。

血圧 182/102mmHg。心拍数 72/分。項部硬直は陽性。発症時の頭部CTを示す。

この患者で疑う疾患はどれか。

No. 1 (P 問題4)




1. 髄膜炎 2. 脳腫瘍 3. 脳膿瘍 4. くも膜下出血 5. 急性硬膜下血腫

問題.55

解答: 5 (2024 55)

その後、急性期病院で2週間の保存的治療を受け、回復期リハビリテーション病院に転院した。転院後、徐々に自発性低下、行動異常および頻回の転倒を認めた。転院してから約2週後の頭部CTを示す。
考えられる他の特徴的な症状はどれか。

No. 2 (P 問題5)




1. 下痢 2. 発熱 3. 血圧上昇 4. 視野障害 5. 排尿障害

問題.56

解答:3 (2024 56)

ゴムバンドを用いて筋力増強運動を実施している様子を図に示す。
この運動で最も増強される筋はどれか。



1. 前鋸筋 2. 大胸筋 3. 棘下筋 4. 肩甲下筋 5. 烏口腕筋

問題.57

解答:1 (2024 57)


17歳の女子。サッカー中に転倒し歩行困難となったため受診した。右足関節外側靭帯損傷と診断され、安静目的に10日間の固定を行った。短下肢装具を着用し、理学療法を開始した。
正しいのはどれか。

1. 足関節周囲筋のストレッチを行う。
2. 歩行練習は圧痛が改善してから開始する。
3. 装具はできる限り早く外すように指導する。
4. バランストレーニングは開眼片脚起立から開始する。
5. 筋カトレーニングは閉鎖性運動連鎖〈CKC: closed kinetic chain〉から開始する。

問題.58

解答: 2,3 (2024 58)

図のようなクレンザック継手の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 背屈補助 2. 背屈遊動 3. 底屈制限 4. 底屈制動 5. 底屈補助

問題.59

解答: 3 (2024 59)

60歳の男性。パーキンソニズムで、すくみ足を認める。メトロノームを用いた歩行練習により、10m歩行において、歩行率が120歩／分、歩行速度が0.8m／秒に改善した。

平均的な歩幅はどれか。

1. 30 cm 2. 35 cm 3. 40 cm 4. 45 cm 5. 50 cm

問題.60

解答: 4 (2024 60)

65歳の女性。右膝関節の痛みを主訴に来院した。右膝関節に軽度の屈曲制限があり、右内側広筋が軽度萎縮している。歩行時に内反膝を呈し、階段昇降時に右膝関節内側の痛みを強く感じている。

装具療法で適切なのはどれか。


1. ロッカーバー
2. トーマスヒール
3. メタルザルバー
4. 外側ウェッジソール
5. 内側ウェッジソール

問題.61

解答:3 (2024 61)

68歳の女性。外出中、前方に転倒して受傷し、骨折に対して手術療法が行われた。術後のエックス線写真を示す。手術後の理学療法で正しいのはどれか。

No. 3 (P 問題 11)



1. 骨癒合が得られてから荷重を開始する。
2. 術直後から膝関節可動域練習を開始する。
3. ズボンを履く際は患側下肢から行うよう指導する。
4. 両松葉杖で階段を降りる際は健側下肢から降ろす。
5. 大腿四頭筋の筋力増強練習は等張性運動から開始する。

問題.62

解答:1 (2024 62)

58歳の男性。半年前から両手の筋萎縮に気付き、最近しゃべりにくさを自覚するようになった。体重は半年で70kgから60kgに減少。MMTは両上肢の近位筋が2、遠位筋が4、両下肢が4。四肢の腱反射は亢進。舌の萎縮が認められるが明らかな嚥下障害はない。肺機能検査で%肺活量は95%。動脈血ガス分析は PaO_2 :90Torr、 PaCO_2 :40 Torrであった。現時点で最も適切な対応はどれか。

1. BFOの導入
2. 胃瘻造設術の施行
3. 気管切開術の施行
4. 電動車椅子の導入
5. 在宅酸素療法の導入

問題.63

解答:3 (2024 63)

20歳の男性。脊髄損傷。プッシュアップ動作を図に示す。
この動作が獲得可能な最も高位の機能残存レベルはどれか。



1. C4 2. C5 3. C6 4. C7 5. C8

問題.64

解答:5 (2024 64)

42歳の男性。2週前に感冒症状が出現。3日前から両下肢のしびれと脱力を自覚し、症状が進行したため精査入院。握力は両側 5kg未滿。MMTは上肢3、下肢2。四肢の深部腱反射は消失し病的反射は認めない。表在感覚は両側下腿以下で重度に低下し異常感覚を伴う。神経伝導検査で両側正中神経および両側腓骨神経の活動電位の振幅の著明な減少を認める。
最も考えられるのはどれか。

1. 髄膜炎
2. 多発性筋炎
3. 多発性硬化症
4. 筋萎縮性側索硬化症
5. Guillain-Barré症候群

問題.65

解答:5 (2024 65)

5歳の女兒。脳性麻痺による痙直型両麻痺。屋内での主な移動は車椅子で、監視下で PCW 〈postural control walker〉を用いた歩行練習をしている。

この児に対する動作指導で最も適切なのはどれか。

1. 割座保持
2. 補助具なしでの歩行
3. 立位保持装置での立位
4. バニーホッピングでの移動
5. 膝立ち位でのキャッチボール

問題.66

解答: 5 (2024 66)

心電図を示す。
考えられるのはどれか。

No. 4

(P 問題 16)



1. 心房細動 2. 心房粗動 3. 房室ブロック 4. 心室細動 5. 心室期外収縮

問題.67

解答: 2,4 (2024 67)

85歳の男性。急性発症 2日目の脳梗塞に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。2つ選べ。

1. 呼吸数 40/分
2. 心拍数 80/分
3. 神経症状の増悪
4. 平均血圧 65mmHg以上
5. RASS 〈Richmond Agitation Sedation Scale〉 -3

問題.68

解答:2 (2024 68)

介護予防事業にて、図のようなテストで確認可能なのはどれか。



1. フレイル
2. サルコペニア
3. ダイナペニア
4. ロコモティブ症候群
5. コンパートメント症候群

問題.69

解答:1 (2024 69)

理学療法の臨床実習に参加している学生。脳梗塞による左片麻痺患者の評価を臨床実習指導者で行った。患者は常に右側を向き、左側からの声かけへの反応が遅かった。

担当作業療法士の診療記録から収集する検査結果で最も優先度が高いのはどれか。


1. BIT
2. FAST
3. Stroop test
4. WAIS-IV
5. WCST <Wisconsin Card Sorting Test>

問題.70

解答:4 (2024 70)

水中での立位姿勢を図に示す。

体重の約 50%が免荷されるのはどれか。



問題.71

解答:3 (2024 71)

生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。

1. 医療法 2. 介護保険法 3. 健康増進法 4. 社会福祉法 5. 地域保健法

問題.72

解答:2,5 (2024 72)

予防医学に関する組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- ア. 一次予防———褥瘡対策
 イ. 二次予防———人間ドック
 ウ. 二次予防———ワクチン接種
 エ. 三次予防———肺がん検診
 オ. 三次予防———透析患者の運動療法

問題.73

解答:1 (2024 73)

運動制御における内部モデル形成で重要な役割をもつ中枢神経系はどれか。

1. 小 脳 2. 中 脳 3. 視床下部 4. 大脳皮質 5. 大脳辺縁系

問題.74

解答:4 (2024 74)

軽度の片麻痺患者が車椅子から床へ移乗する手順で誤っているのはどれか。

1. 車椅子のブレーキを確認する。
2. 殿部を座面の前方に移動する。
3. 非麻痺側の足部を十分後方に引く。
4. 上体を前傾させて麻痺側の膝を床につく。
5. 床に膝をついた側の殿部を接地させて回転するように着座する。

問題.75

解答:3,4 (2024 75)

LawtonのIADLスケールに含まれるのはどれか。2つ選べ。

1. 意思疎通
2. 階段昇降
3. 家屋維持
4. 家計管理
5. 排泄コントロール

問題.76

解答:5 (2024 76)

ICFの環境因子はどれか。

1. 職業歴
2. 屋外の移動
3. 本人の性別
4. 信仰する宗教
5. 利用可能な保健サービス

問題.77

解答:3 (2024 77)

理学療法士の行動で適切なのはどれか。

1. 患者の病状を許可なく友人に伝える。
2. 患者に担当作業療法士の自宅住所を教える。
3. 先輩職員に患者宅の家屋構造を伝えて住宅改修の相談をする。
4. 患者の全身動画を自分のスマートフォンに保存して歩行を分析する。
5. 利用者限定の SNS 〈Social networking service〉 に患者の個人情報を投稿する。

問題.78

解答:3 (2024 78)

H反射を導出するために刺激する神経で正しいのはどれか。

1. α運動神経線維
2. r運動神経線維
3. Ia群求心性線維
4. Ib群求心性線維
5. II群求心性線維

問題.79

解答:4 (2024 79)

動的バランス能力評価検査はどれか。

1. 10 m歩行テスト
2. 6分間歩行テスト
3. Trunk control test
4. Functional reach test
5. 片脚立位バランステスト

問題.80

解答:1 (2024 80)

脳神経と働きの組合せで正しいのはどれか。

1. 副神経————僧帽筋の運動
2. 滑車神経————眼球の内転運動
3. 顔面神経————咀嚼筋の運動
4. 三叉神経————舌前 2/3の味覚
5. 舌下神経————声帯の運動

問題.81

解答:5 (2024 81)

運動療法を受ける患者の自己効力感が低下する可能性が高いのはどれか。

1. 運動療法時に医療者が励ます。
2. 運動後の疲労は問題ないことを説明する。
3. 既に退院した患者の成功した治療例を伝える。
4. 類似した事柄に対して過去に成功体験がある。
5. 達成が困難な高い目標の運動課題を初めに設定する。

問題.82

解答:5 (2024 82)

内側型変形性膝関節症における歩行の特徴で正しいのはどれか。

1. 歩隔は狭くなる。
2. 両脚支持期は短くなる。
3. 骨盤の回旋は大きくなる。
4. 股関節伸展角度は増加する。
5. 床反力前後成分は小さくなる。

問題.83

解答:5 (2024 83)

Brunnstrom法ステージⅤの判定基準で正しいのはどれか。

1. 座位で肩関節90度外転が可能
2. 肘関節伸展位で肩関節90度屈曲し前腕の回内外が可能
3. 手指で対向つまみが可能
4. 座位で下腿部の内外旋が可能
5. 座位で踵接地での足関節背屈が可能

問題.84

解答:2 (2024 84)

脳卒中片麻痺患者の足関節を底屈位から背屈位に他動的に動かし、最終域に若干の抵抗感を感じた。
MAS〈modified Ashworth scale〉における筋緊張のレベルはどれか。

1. 0 2. 1 3. 1+ 4. 2 5. 3

問題.85

解答:5 (2024 85)

正常歩行の立脚相で筋活動が最大となるのが最も遅いのはどれか。

1. 大殿筋 2. 大腿四頭筋 3. 大腿二頭筋 4. 前脛骨筋 5. 下腿三頭筋

問題.86

解答: 2,4 (2024 86)

二重積の規定因子はどれか。2つ選べ。

1. 呼吸数
2. 心拍数
3. 一回拍出量
4. 収縮期血圧
5. 動静脈酸素較差

問題.87

解答: 3 (2024 87)

痙直型脳性麻痺児の陽性徴候はどれか。

1. 運動麻痺
2. 感覚障害
3. 共同運動
4. 筋力低下
5. 巧緻運動障害

問題.88

解答: 1,4 (2024 88)

四肢切断後の幻肢痛への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. ミラーセラピーが有用である。
2. 経皮的電気刺激法は禁忌である。
3. 義肢装着練習は幻肢痛を増悪させる。
4. 患者に幻肢痛が残存している部位をイラストで図示させる。
5. 鎮痛薬はプレガバリンよりも非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉を優先する。

問題.89

解答: 5 (2024 89)

寛解期にある多発性硬化症に対する理学療法の禁忌はどれか。

1. 他動的な関節可動域練習
2. 中等度強度の有酸素運動
3. 低強度の筋力増強練習
4. 電気刺激療法
5. 温熱療法

問題.90

解答: 3 (2024 90)

末梢神経障害による感覚障害に伴う運動失調の治療法で適切でないのはどれか。

1. 重錘負荷
2. 弾性緊縛帯
3. 電気刺激療法
4. 姿勢鏡を用いた立位練習
5. 歩行補助具を用いた歩行練習

問題.91

解答: 2,4 (2024 91)

間質性肺疾患の所見で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 湿性咳嗽を生じる。
2. 拡散障害による低酸素血症を呈する。
3. 呼吸機能検査で閉塞性換気障害を呈する。
4. 胸部単純エックス線写真で線維化を呈する。
5. コースクラックル〈coarse crackles・水泡音〉を聴取する。

問題.92

解答: 3,5 (2024 92)

MRC 〈Medical Research Council〉 sum scoreによる筋力が集中治療室獲得性筋力低下 〈ICU-AW〉 の判定を満たすのはどれか。
。2つ選べ。

1. すべて同一の背臥位姿勢で測定する。
2. ICU入室時の検査で判定する。
3. 両側合計で 48点未満である。
4. 握力が 20kg未満である。
5. 平均が 4点未満である。

問題.93

解答: 2 (2024 93)

介護予防事業の基本チェックリストで低栄養判断基準となるBMIはどれか。

1. 16.5未満
2. 18.5未満
3. 20.5未満
4. 22.5未満
5. 24.5未満

問題.94

解答: 2 (2024 94)

介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。

1. 浴室段差の解消
2. 階段昇降機の設置
3. 外階段に手すりの設置
4. トイレ扉を引き 戸に交換
5. 和式便座を洋式便座に交換

問題.95

解答: 3 (2024 95)

特別支援学校の教育環境で誤っているのはどれか。

1. 自立活動関係教室を設置する。
2. 発達障害を有する児も在籍する。
3. 学級編成人数は 10名以上である。
4. 複数の食形態での食事が可能である。
5. ベッドタイプのトイレが併設された学校もある。

問題.96

解答: 1 (2024 96)

NICU入室中の低緊張児に対する理学療法で優先順位が低いのはどれか。

1. 装具療法
2. 運動発達指導
3. 呼吸理学療法
4. ポジショニング
5. 保護者への育児指導

問題.97

解答: 2,3 (2024 97)

予防接種法に基づく集団予防を目的とした定期接種に該当する疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. A型肝炎 2. B型肝炎 3. 日本脳炎 4. インフルエンザ 5. 流行性耳下腺炎

問題.98

解答: 1 (2024 98)

歩行練習中に患者が転倒した場合、最も優先して行うのはどれか。

1. 患者の安全確保
2. 主治医への報告
3. 診療録への記載
4. スタッフへの応援要請
5. バイタルサインの測定

問題.99

解答: 3,4 (2024 99)

骨折の名称と部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. Cotton骨折————大腿骨
2. Dupuytren骨折————第1中手骨
3. Galeazzi骨折————橈骨
4. Jefferson骨折————環椎
5. Straddle骨折————上腕骨

問題.100

解答: 5 (2024 100)

ADL評価で正しいのはどれか。

1. Barthel indexで自立の得点は7点である。
2. Barthel indexは食事の支度の項目を含む。
3. FIMでは時間をかけても一人でできれば完全自立である。
4. FIMはできるADLを評価する。
5. WeeFIMは小児のADLを評価する。