

問題.1

解答: 5 (2024.1)

外胚葉から発生するのはどれか。

1. 筋 2. 子 宮 3. 甲状腺 4. 消化管 5. 松果体

問題.2

解答: 1,5 (2024.2)

ミオシンフィラメントが存在するのはどれか。2つ選べ。

1. A帯 2. S帯 3. I帯 4. Z帯 5. 筋 節

問題.3

解答: 1,5 (2024.3)

肩甲背神経に支配される筋はどれか。2つ選べ。

1. 肩甲挙筋 2. 鎖骨下筋 3. 前鋸筋 4. 僧帽筋 5. 菱形筋

問題.4

解答: 2,3 (2024.4)

脳神経と支配筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 動眼神経———眼輪筋
2. 三叉神経———咬 筋
3. 顔面神経———広頸筋
4. 舌咽神経———舌 筋
5. 副神経———側頭筋

問題.5

解答: 1 (2024.5)

ドーパミンが主に神経伝達物質となっている部位はどれか。

1. 黒 質 2. 視 床 3. 小 脳 4. 脳 梁 5. 前頭葉

問題.6

解答: 5 (2024.6)

反回神経で正しいのはどれか。

1. 味覚を伝える。
2. 交感神経線維を含む。
3. 横隔神経から分枝する。
4. 輪状甲状筋を支配する。
5. 左側の走行は右側よりも長い。

問題.7

解答: 1,2 (2024.7)

左右一対あるのはどれか。2つ選べ。

1. 総頸動脈 2. 椎骨動脈 3. 脳底動脈 4. 腕頭動脈 5. 前交通動脈

問題.8

解答:1 (2024.8)

呼吸器で正しいのはどれか。

1. 気管支は下気道に含まれる。
2. 輪状軟骨は弾性軟骨である。
3. 気管の長さは約20cmである。
4. 咽頭の下端はC8の位置にある。
5. 気管の延長線に対する分岐角度は左気管支より右気管支の方が大きい。

問題.9

解答:1 (2024.9)

視覚器で誤っているのはどれか。

1. 虹彩と水晶体の間を前眼房という。
2. 眼房水は毛様体上皮から産生される。
3. 眼房水は強膜静脈洞へ吸収される。
4. 毛様体筋が収縮すると毛様体小体は弛緩する。
5. 毛様体小体が弛緩すると水晶体は厚くなる。

問題.10

解答:4 (2024.10)

右上肢を右外側より見た図を示す。

腕橈骨筋のすぐ尺側で矢印部を走行する筋はどれか。

No. 6 (P 問題 60)



1. 示指伸筋 2. 小指伸筋 3. 総指伸筋 4. 長橈側手根伸筋 5. 長母指伸筋

問題.11

解答:3 (2024.11)

伸張反射で正しいのはどれか。

1. 侵害受容反射である。
2. 多シナプス反射である。
3. 求心性線維はIa群線維である。
4. α 運動線維は筋紡錘内の錘内線維を支配する。
5. γ 運動線維は伸張された筋の拮抗筋を支配する。

問題.12

解答:3,5 (2024.12)

運動単位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 運動単位には求心性線維が含まれる。
2. 筋を徐々に収縮すると大きな運動単位が先に活動を始める。
3. 筋が収縮する際に運動単位の数が増加していく過程を動員という。
4. 細かい動きが要求される筋は一つの運動ニューロンが支配する筋線維数が多い。
5. 一つの運動ニューロンを刺激すると、その支配下にある筋線維が同時に収縮する。

問題.13

解答:2 (2024.13)

副交感神経の機能を持つのはどれか。

1. 横隔神経
2. 骨盤神経
3. 舌下神経
4. 内耳神経
5. 肋間神経

問題.14

解答:1,3 (2024.14)

肺拡散能に影響を与えるのはどれか。2つ選べ。

1. ヘモグロビン
2. 死腔換気量
3. 肺胞表面積
4. 気道抵抗
5. 残気量

問題.15

解答:3 (2024.15)

線維素溶解系で働く因子はどれか。

1. カルシウムイオン
2. フィブリノゲン
3. プラスミノゲン
4. プロトロンビン
5. von Willebrand因子

問題.16

解答:1 (2024.16)

免疫グロブリンで正しいのはどれか。

1. IgGは胎盤を透過する。
2. IgMは唾液に含まれる。
3. IgDは肥満細胞を活性化する。
4. IgAは血漿中に占める割合が最も多い。
5. T細胞が抗原の刺激を受けて産生する。

問題.17

解答: 3,4 (2024 17)

肝臓の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 血球の産生
2. 胆汁の貯蔵
3. 尿素の生成
4. 薬物の代謝
5. グルカゴンの分泌

問題.18

解答: 3 (2024 18)

同一の臓器から分泌されるホルモンの組合せで正しいのはどれか。

1. アルドステロン———エリスロポエチン
2. グルカゴン———ガストリン
3. パソプレシン———オキシトシン
4. パラトルモン———カルシトニン
5. レニン———コルチゾール

問題.19

解答: 2 (2024 19)

エネルギー代謝で正しいのはどれか。

1. 基礎代謝量は安静時代謝量より大きい。
2. 安静時代謝量は体重減少により低下する。
3. 呼吸商は糖質の燃焼が多くなると低下する。
4. 代謝当量〈METs〉は基礎代謝量を基準にしている。
5. エネルギー代謝率〈RMR〉は安静時代謝量を基準にしている。

問題.20

解答: 3 (2024 20)

筋と下顎の運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 咬 筋———下 制
2. 顎二腹筋———挙 上
3. 外側翼突筋———前 突
4. 内側翼突筋———後 退
5. オトガイ舌筋———側方移動

問題.21

解答: 1 (2024 21)

手の運動で正しいのはどれか。

1. 橈骨手根関節の運動軸は2つである。
2. PIP関節の側副靱帯は伸展位で弛緩する。
3. 手関節背屈には長母指外転筋が作用する。
4. 手関節橈屈の可動域は前腕回外位より回内位で大きい。
5. 対立運動における横アーチの変化には第2CM関節が関与する。

問題.22

解答: 3,4 (2024.22)

足関節で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 距腿関節は2度の運動自由度をもつ。
2. 後脛骨筋は外がえしの共同筋である。
3. ヒラメ筋は足部内がえしに作用する。
4. 足根中足関節の主な運動は滑りである。
5. 立方骨は内側縦アーチを構成する骨の一つである。

問題.23

解答: 1 (2024.23)

片側の筋収縮と体幹運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 外腹斜筋————同側への側屈
2. 脊柱起立筋————対側への側屈
3. 内腹斜筋————対側への回旋
4. 腹直筋————対側への回旋
5. 腰方形筋————同側への回旋

問題.24

解答: 3 (2024.24)

健常成人の歩行で重心が最も高くなる時期はどれか。

1. 初期接地
2. 荷重応答期
3. 立脚中期
4. 立脚終期
5. 前遊脚期

問題.25

解答: 5 (2024.25)

病因のうち化学的要因はどれか。

1. 熱
2. 圧 力
3. 紫外線
4. 放射線
5. アスベスト

問題.26

解答: 1,5 (2024.26)

末梢血管抵抗が低下する ショック をきたす病態はどれか。2つ選べ。

1. アナフィラキシー
2. 消化管出血
3. 心筋梗塞
4. 心タンポナーデ
5. 敗血症

問題.27

解答: 5 (2024.27)

咳をしたときに生じる尿失禁はどれか。

1. 溢流性
2. 機能性
3. 切迫性
4. 反射性
5. 腹圧性

問題.28

解答:4 (2024 28)

左右対称のインクのシミでできた図版を順番に提示する検査はどれか。

1. バウムテスト
2. MMPI
3. P-Fスタディ
4. Rorschachテスト
5. WPPSI

問題.29

解答:3 (2024 29)

陽性転移はどれか。

1. 医療者が患者に過剰な親近感を抱く。
2. 医療者が患者に怒りの感情を示す。
3. 患者が医療者に好意を寄せる。
4. 患者が医療者を強く軽蔑する。
5. 患者が医療者を嫌悪する。

問題.30

解答:4 (2024 30)

他者の模範行動を観察して、自らの行動変容をきたすようにする治療法はどれか。

1. 系統的脱感作法
2. 行動活性化技法
3. マインドフルネス
4. モデリング法
5. 問題解決技法

問題.31

解答:4 (2024 31)

技法としてホームワーク〈宿題〉を用いるのはどれか。

1. 支持的精神療法
2. 精神分析療法
3. 内観療法
4. 認知行動療法
5. 森田療法

問題.32

解答:1 (2024 32)

ADLで正しいのはどれか。

1. 環境要因によって影響を受ける。
2. IADLが概念の基礎となっている。
3. 生活機能より包括的な概念である。
4. 2000年代初頭に世界保健機関によって定義された。
5. 評価スケールとしてFugl-Meyer Assessment scaleが用いられる。

問題.33

解答: 4 (2024 33)

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査〈JDDST-R〉で「母指と示指によるつまみ動作」の通過率 75%が含まれる時期はどれか

1. 3～4か月
2. 6～7か月
3. 9～10か月
4. 12～13か月
5. 15～16か月

問題.34

解答: 5 (2024 34)

脳卒中回復期の嚥下障害に対する最も適切な栄養管理はどれか。

1. 水分にとろみは使用しない。
2. 胃瘻造設後には経口摂取は行わない。
3. 経鼻胃管による経管栄養は誤嚥の危険はない。
4. 点滴管理は栄養摂取量を考慮する必要はない。
5. 経鼻胃管による経管栄養は長期的栄養管理には適さない。

問題.35

解答: 5 (2024 35)

出生時に出現していないのはどれか。

1. Moro反射
2. Galant反射
3. Babinski反射
4. 緊張性迷路反射
5. 対称性緊張性頸反射

問題.36

解答: 4 (2024 36)

頭部MRIで正しいのはどれか。

1. T2強調画像で髄液は低信号に描出される。
2. 頭部 CTに比べて脳幹部の病巣を観察しにくい。
3. T2強調画像で脳梗塞による信号変化はみられない。
4. 拡散強調画像は急性期の脳梗塞の診断に有用である。
5. 頭部 CTに比べて急性期の脳出血の診断に有用である。

問題.37

解答: 2,5 (2024 37)

AEDで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 使用には医師の指示が必要である。
2. 心臓ペースメーカーの植込み患者に使用できる。
3. 衣服の上から使用できる。
4. 電気的除細動時は四肢を押さえる。
5. 電気的除細動は自動的に行われる。

問題.38

解答: 1,3 (2024 38)

背臥位における褥瘡の好発部位はどれか。2つ選べ。

1. 踵 部 2. 膝窩部 3. 仙骨部 4. 内果部 5. 大転子部

問題.39

解答: 2 (2024 39)

外傷性脊髄損傷で正しいのはどれか。

1. 男性より女性に多い。
2. 頸髄損傷が胸腰髄損傷より多い。
3. 交通事故による受傷が最も多い。
4. 発症者の年齢は 20 歳代が最も 多い。
5. 頸髄損傷では完全麻痺者の比率が高い。

問題.40

解答: 3 (2024 40)

骨粗鬆症で正しいのはどれか。

1. 女性より男性に多い。
2. 遺伝的要因は影響しない。
3. 続発性より原発性が多い。
4. 骨折は大腿骨近位部が最も多い。
5. 日本の患者数は約 100 万人である。

問題.41

解答: 3,4 (2024 41)

脳卒中患者の身体機能評価に用いられる評価尺度はどれか。2つ選べ。

1. GMFCS 2. MMPI 3. NIHSS 4. SIAS 5. UPDRS

問題.42

解答: 4 (2024 42)

手根管症候群でみられる症候はどれか。

1. 下垂手
2. 骨間筋の萎縮
3. 小指のしびれ
4. 母指球筋の萎縮
5. Guyon 管の Tinel 徴候陽性

問題.43

解答: 3 (2024 43)

ケトアシドーシスによって Kussmaul 呼吸が起こる理由で正しいのはどれか。

1. O_2 を取り込むため。
2. H^+ が減少したため。
3. CO_2 を排出するため。
4. HCO_3^- が増加したため。
5. pH の上昇を基準値に戻すため。

問題.44

解答:5 (2024 44)

急性心筋梗塞が疑われる場合に最も優先度が低い検査はどれか。

1. 心電図
2. 心エコー
3. 冠動脈 CT
4. 冠動脈造影
5. 心筋シンチグラフィー

問題.45

解答:1 (2024 45)

Lewy小体型認知症の早期にみられる症状はどれか。

1. 幻 視
2. 妄想伝播
3. 失 語
4. 人格変化
5. 脱抑制

問題.46

解答:2 (2024 46)

統合失調症で正しいのはどれか。

1. 急性発症は予後が悪い。
2. 若年発症は予後が悪い。
3. 女性は男性より予後が悪い。
4. 男性の発症率は女性の約2倍である。
5. 発症から治療開始までの期間と予後は無関係である。

問題.47

解答:2 (2024 47)

全般性不安障害で正しいのはどれか。

1. 慢性化はまれである。
2. 男性と比較して女性に多い。
3. 自律神経系の過活動はみられない。
4. 症状の消長に環境要因は影響しない。
5. 他の精神疾患と併存することはない。

問題.48

解答:4 (2024 48)

ミオクロニー発作で正しいのはどれか。

1. 意識消失を伴うことが多い。
2. 高齢で発症することが多い。
3. 数分間持続する。
4. 光刺激で誘発される。
5. 片側性である。

問題.49

解答:5 (2024 49)

ノンレム睡眠で正しいのはどれか。

1. 夢を見る。
2. 陰茎が勃起する。
3. 急速眼球運動がみられる。
4. 心拍数が不規則に変化する。
5. 成人の睡眠の大半を占める。

問題.50

解答:2 (2024 50)

入眠困難を訴えるうつ病患者に対する睡眠衛生指導で最も適切なのはどれか。

1. 「夕方1時間以上の昼寝をしましょう」
2. 「できるだけ一定時刻に起床しましょう」
3. 「就床直前にアルコール飲料を飲みましょう」
4. 「眠くなくても一定の時刻に就床しましょう」
5. 「入眠できなくても寝床から出ないようにしましょう」

問題.51

解答:3 (2024 51)

関節の組合せで正しいのはどれか。

1. 肩関節———臼状関節
2. 胸鎖関節———蝶番関節
3. 上撓尺関節———車軸関節
4. 腕尺関節———球関節
5. MCP関節———鞍関節

問題.52

解答:5 (2024 52)

ヤコビー〈Jacoby〉線上に位置する椎骨はどれか。

1. T12
2. L1
3. L2
4. L3
5. L4

問題.53

解答:3 (2024 53)

滑車神経が支配する外眼筋はどれか。

1. 下斜筋
2. 下直筋
3. 上斜筋
4. 上直筋
5. 外側直筋

問題.54

解答:5 (2024 54)

温痛覚の経路はどれか。

1. 脊髓小脳路
2. 皮質脊髓路
3. 前脊髓視床路
4. 網様体脊髓路
5. 外側脊髓視床路

問題.55

解答:5 (2024 55)

一次ニューロンの細胞体が主に存在する部位はどれか。

1. 後角
2. 後索
3. 前角
4. 側索
5. 後根神経節

問題.56

解答:1 (2024 56)

腋窩神経で正しいのはどれか。

1. 三角筋を支配する。
2. 広背筋を支配する。
3. 後骨間神経を分枝する。
4. 上腕内側の皮府感覚を支配する。
5. 腕神経叢の外側神経束から分枝する。

問題.57

解答:3,5 (2024 57)

後腹膜に存在するのはどれか。2つ選べ。

1. 胃
2. 空 腸
3. 腎 臓
4. 横行結腸
5. 十二指腸

問題.58

解答:3 (2024 58)

甲状腺が分泌するホルモンはどれか。

1. メラトニン
2. オキシトシン
3. カルシトニン
4. バソプレシン
5. パラトルモン

問題.59

解答:3 (2024 59)

平衡聴覚器で正しいのはどれか。

1. 耳石器は鼓室にある。
2. 蝸牛神経は耳管を通る。
3. 半規管は角加速度を知覚する。
4. アブミ骨筋は前庭神経に支配される。
5. 内耳道は内リンパ液で満たされている。

問題.60

解答:3 (2024 60)

体細胞分裂の開始に関わる細胞内小器官はどれか。

1. 核小体
2. 小胞体
3. 中心小体
4. Golgi装置
5. ミトコンドリア

問題.61

解答:4 (2024 61)

末梢神経のC線維で正しいのはどれか。

1. 有髄線維である。
2. 骨格筋を支配する。
3. 受容器は筋紡錘である。
4. B線維より直径が小さい。
5. Aα線維より伝導速度が速い。

問題.62

解答:5 (2024 62)

交感神経の節前線維で直接支配されるのはどれか。

1. 肝 臓 2. 心 臓 3. 気管支 4. 唾液腺 5. 副腎髄質

問題.63

解答:5 (2024 63)

呼吸の生理で正しいのはどれか。

1. 呼気時に横隔神経の活動電位が生じる。
2. 迷走神経が亢進すると気道抵抗は低下する。
3. 肺コンプライアンスが増加すると機能的残気量は減少する。
4. pHが上昇すると酸素はヘモグロビンから解離しやすくなる。
5. 呼吸商は単位時間あたりの二酸化炭素産生量と酸素消費量の比である。

問題.64

解答:4 (2024 64)

各臓器と血流量の局所性調節の組合せで正しいのはどれか。

1. 骨格筋—————乳酸の蓄積が血管を収縮
2. 心 臓—————低酸素が冠細動脈を収縮
3. 脳—————二酸化炭素分圧上昇が細動脈を収縮
4. 肺—————低酸素が細動脈を収縮
5. 皮 膚—————交感神経亢進が細動脈を拡張

問題.65

解答:5 (2024 65)

ワルファリンの抗凝固作用に拮抗するのはどれか。

1. ビタミンA 2. ビタミンC 3. ビタミンD 4. ビタミンE 5. ビタミンK

問題.66

解答:1 (2024 66)

脂質の消化と吸収で誤っているのはどれか。

1. Langerhans 〈ランゲルハンス〉 島からリパーゼが分泌される。
2. リパーゼは脂質を脂肪酸とグリセリンに消化する。
3. 胆汁酸は脂肪酸を乳化しミセルを形成する。
4. ミセルは小腸粘膜で吸収される。
5. 小腸で吸収された胆汁酸は門脈を介して肝臓へ運ばれる。

問題.67

解答:2 (2024 67)

近位尿細管における再吸収率が最も高いのはどれか。

1. 水 2. グルコース 3. 水素イオン 4. クレアチニン 5. ナトリウムイオン

問題.68

解答:1 (2024 68)

体温の調節機構で正しいのはどれか。

1. 体温の調節中枢は間脳にある。
2. 体温は午前より午後の方が低い。
3. 精神性発汗によって体温は上昇する。
4. 体温が上昇すると骨格筋は収縮する。
5. 甲状腺ホルモンは熱生産を低下させる。

問題.69

解答:4 (2024 69)

骨格筋の筋張力で正しいのはどれか。

1. 全張力と静止張力の和が活動張力となる。
2. 活動張力は筋長が長くなるほど大きくなる。
3. 求心性運動では速度が速いほど最大筋張力大きい。
4. 筋張力が一定の場合、短縮速度は負荷が小さいほど速い。
5. 求心性運動は遠心性運動より大きな筋張力を発揮することができる。

問題.70

解答:2 (2024 70)

肩甲上腕関節の内旋作用をもつのはどれか。

1. 棘下筋
2. 広背筋
3. 小円筋
4. 三角筋後部線維
5. 上腕二頭筋長頭

問題.71

解答:1,5 (2024 71)


膝関節で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 膝関節は顆状関節である。
2. 内側半月はO字状の形状である。
3. 外側側副靭帯は屈曲時に緊張する。
4. 前十字靭帯は脛骨の後方への逸脱を防いでいる。
5. 完全伸展位に近づくと脛骨は大腿に対し外旋する。

問題.72

解答:2 (2024 72)

距骨上面の高さの足関節部と下腿筋との位置関係を図に示す。
正しいのはどれか。



1. ①長腓骨筋 2. ②前脛骨筋 3. ③長指伸筋 4. ④後脛骨筋 5. ⑤第3腓骨筋

問題.73

解答:4 (2024 73)

成人の正常立位姿勢で正しいのはどれか。

1. 仙骨は前弯を示す。
2. 腰仙角は約5度である。
3. 重心の位置は小児より相対的に頭部に近い。
4. 矢状面における重心は仙骨の前方に位置する。
5. 矢状面上における身体の重心線は大転子の前方を通る。

問題.74

解答:5 (2024 74)

運動学習で最も適切なのはどれか。

1. 学習初期から二重課題法を取り入れる。
2. 学習課題の難易度は高いほど効果がある。
3. 療法士の助言は内在的フィードバックである。
4. 記憶障害がある場合は試行錯誤学習を適応する。
5. 運動技能が向上すればエネルギー効率が良くなる。

問題.75

解答:5 (2024 75)

疾患と病因・病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。

1. Creutzfeldt Jakob病———神経変性疾患
2. Parkinson病———腫瘍性疾患
3. 肝性脳症———感染性疾患
4. 多系統萎縮症———脳血管疾患
5. 多発性硬化症———脱髄疾患

問題.76

解答:2,5 (2024 76)

前頭葉の損傷による高次脳機能障害で生じるのはどれか。2つ選べ。

1. 視覚失調
2. 肢節運動失行
3. 触覚失認
4. 相貌失認
5. Broca失語

問題.77

解答:4 (2024 77)

アポトーシスによる細胞の変化はどれか。

1. 核の融解
2. 細胞の膨化
3. 細胞内容の放出
4. 散在性の細胞死
5. 周囲の炎症反応

問題.78

解答:1 (2024 78)

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。

1. 学童期に発症する。
2. 心筋障害はまれである。
3. 下肢に伸展拘縮をきたす。
4. 常染色体劣性遺伝である。
5. 筋形質膜にジストロフィン蛋白がみられる。

問題.79

解答:3 (2024 79)

無意識の願望と思考を意識的に気付きから排除する防衛機制はどれか。

1. 昇華
2. 統制
3. 抑圧
4. 抑制
5. 歪曲

問題.80

解答:4 (2024 80)

Freudの発達論で6～12歳ころはどれか。

1. 感覚運動期
2. 形式的操作期
3. 性器期
4. 潜在期
5. 前操作期

問題.81

解答:4 (2024 81)

日常生活場面で必要とされる記憶の障害を検出するのに最も適した検査はどれか。

1. HDS-R
2. MMSE
3. RAVLT
4. RBMT
5. WMS-R

問題.82

解答:5 (2024 82)

フレイルの高齢者の特徴で正しいのはどれか。

1. 筋量が増加する。
2. TUG時間が短くなる。
3. 長座位前屈距離が短くなる。
4. 運動負荷時の Borg指数が低値になる。
5. FBS 〈Functional balance scale〉 が低値になる。

問題.83

解答:4 (2024 83)

不動による廃用症候群で生じやすい病態はどれか。

1. 安静時心拍数の低下
2. 間質性肺疾患
3. 自律神経過反射
4. 深部静脈血栓
5. 低カルシウム血症

問題.84

解答:5 (2024 84)

抗てんかん薬の副作用で最も頻度の低いのはどれか。

1. 傾 眠
2. 複 視
3. めまい
4. 肝機能障害
5. 末梢神経障害

問題.85

解答:3 (2024 85)

Guillain-Barré症候群の診断で有用なのはどれか。

1. CT
2. MRI
3. 髄液検査
4. 脳波検査
5. 血液培養検査

問題.86

解答:1 (2024 86)

便秘を最も生じやすい薬剤はどれか。

1. モルヒネ
2. グリセリン
3. センノシド
4. ラクッロース
5. 酸化マグネシウム

問題.87

解答:3 (2024 87)

装具療法の主たる目的でないのはどれか。

1. 機能の補助
2. 局所の免荷
3. 筋力の強化
4. 疼痛の軽減
5. 変形の矯正

問題.88

解答:5 (2024 88)

変形性股関節症で正しいのはどれか。

1. 発症は遺伝の影響を受けない。
2. 有病率は女性より男性が高い。
3. 一次性の頻度は二次性より高い。
4. 変形性膝関節症の合併リスクは低い。
5. 重量物作業を伴う職業は発症のリスク要因である。

問題.89

解答:3 (2024 89)

後縦靱帯骨化症で正しいのはどれか。

1. 日本人より欧米人に多い。
2. 腰椎部に最も多く発生する。
3. 進行すれば痙性麻痺を生じる。
4. 発症は遺伝の影響を受けない。
5. 有病率は男性より女性が高い。

問題.90

解答:2 (2024 90)

骨粗鬆症の危険因子で誤っているのはどれか。

1. 長期の臥床
2. ビタミン A の不足
3. エストロゲンの減少
4. 原発性副甲状腺機能亢進症
5. 副腎皮質ステロイドの長期投与

問題.91

解答:3 (2024 91)

筋萎縮性側索硬化症における典型的な筋電図検査所見で正しいのはどれか。

1. 運動神経伝導検査における遠位潜時延長
2. 感覚神経伝導検査における伝導ブロック
3. 針筋電図検査における線維束攣縮の電位出現
4. 反復刺激試験における漸減現象〈Waning〉
5. 反復刺激試験における漸増現象〈Waxing〉

問題.92

解答:4 (2024 92)

先天性心疾患の中で頻度が高いのはどれか。

1. 三尖弁狭窄症
2. 動脈管開存症
3. 肺動脈狭窄症
4. 心室中隔欠損症
5. 心房中隔欠損症

問題.93

解答:5 (2024 93)

感染症で正しいのはどれか。

1. 癩癬はネズミによって媒介される。
2. 帯状疱疹は麻疹と同じウイルスが原因で発症する。
3. ボツリヌス菌による食中毒は感染型である。
4. ポリオは血液を介して感染する。
5. レジオネラ症は空調設備が感染源となる。

問題.94

解答:5 (2024 94)

転移性骨腫瘍で正しいのはどれか。

1. 頭蓋骨に好発する。
2. 前立腺癌では溶骨性転移が多い。
3. 高率に低カルシウム血症をきたす。
4. 痛みには温熱療法が第一選択となる。
5. 造骨性の骨転移では病的骨折は少ない。

問題.95

解答:3 (2024 95)

広範囲熱傷の病態と急性期治療で誤っているのはどれか。

1. 高血糖になる。
2. 全身浮腫を生じる。
3. 輸液量を制限する。
4. 基礎代謝量は増加する。
5. 高蛋白の栄養療法にする。

問題.96

解答:1 (2024 96)

うつ病と比較した場合の双極性障害の特徴はどれか。

1. 発症年齢が低い。
2. 生涯有病率が高い。
3. 遺伝的素因が少ない。
4. 自殺のリスクが低い。
5. 生涯有病率の男女差が大きい。

問題.97

解答:2 (2024 97)

せん妄で正しいのはどれか。

1. 認知機能は保たれる。
2. 高齢は危険因子となる。
3. 睡眠覚醒リズムは保たれる。
4. 症状の経過は不可逆的である。
5. 夜間に起こることはまれである。

問題.98

解答:1,2 (2024 98)

統合失調症の陰性症状はどれか。2つ選べ。

1. 意欲低下
2. 感情の平板化
3. 幻覚
4. 妄想
5. 連合弛緩

問題.99

解答: 4 (2024 99)

自閉症スペクトラム障害児が母親の手をとり目的の物に持っていく行動はどれか。

1. 常同運動
2. 運動チェック
3. オウム返し
4. クレーン現象
5. タイムスリップ現象

問題.100

解答: 3 (2024 100)

振戦せん妄で正しいのはどれか。

1. 生命への危険性は低い。
2. 羽ばたき振戦がみられる。
3. ベンゾジアゼピン系薬を使用する。
4. 飲酒停止後24時間以内に多くみられる。
5. アルコール血中濃度の上昇に伴って生じる。