

問題.1

解答:3 (2025 51)

80歳の女性。右変形性股関節症に対し人工関節全置換術を施行。1週間が経過し、歩行器での移動が可能となった。本症例にDanielsらの徒手筋力テストに基づき、左中殿筋の段階4の評価を行う。
適切な測定はどれか。

1. 側臥位を計測姿勢とする。
2. 右側の股関節は屈曲させる。
3. 骨盤が回旋しないように固定する。
4. 左下肢は外旋位とする。
5. 最大の抵抗を足関節から加え、姿勢を保持できる。

問題.2

解答:1 (2025 52)

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。
疑うべき疾患はどれか。

No. 1 (P 問題2)




1. Perthes病
2. 大腿骨頭壊死症
3. 大腿骨頭すべり症
4. 単純性股関節炎
5. 発育性股関節形成不全

問題.3

解答:3,5 (2025 53)

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。
この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

No. 1 (P 問題2)



1. 右股関節の内転位保持
2. 短下肢装具での立位練習
3. 対称的な座位バランス練習
4. 右側方からの起き上がり動作指導
5. 坐骨結節で負荷できる下肢装具での歩行練習

問題.4

解答:3 (2025 54)

70歳の女性。急性心筋梗塞で入院した。身長160cm。体重70kg。
安静時心拍数70/分。安静時血圧130/70mmHg。心臓超音波
検査にて低左心機能(LVEF<40%)が指摘されている。

Karvonen法($k=0.5$)を用いて計算した全身持久力運動の目標心拍数で正しいのはどれか。

1. 90/分 2. 100/分 3. 110/分 4. 120/分 5. 130/分

問題.5

解答:3 (2025 55)

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に従って図のように背臥位で右股関節の可動域を測定する。

正しいのはどれか。



1. 運動方向は内旋である。
2. 参考可動域は45度である。
3. 股関節が外旋しないようにする。
4. 基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ直線である。
5. 移動軸は上前腸骨棘と第二中足骨長軸を結ぶ線である。

問題.6

解答:5 (2025 56)

5歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺である。背臥位で図のような姿勢を示す。
影響しているのはどれか。



1. Moro反射
2. 陽性支持反射
3. 緊張性迷路反射
4. 対称性緊張性頸反射
5. 非対称性緊張性頸反射

問題.7

解答:2 (2025 57)

30歳の男性。右腱板損傷の修復術後6か月。図に示す方法で等張性筋力増強運動を行っている。
このトレーニングで対象となる筋はどれか。




1. 烏口腕筋 2. 棘下筋 3. 小胸筋 4. 前鋸筋 5. 大胸筋

問題.8

解答:3,5 (2025 58)

32歳の男性。交通事故で4週前に右大腿骨を図のように遠位部で切断した。今後、大腿義足を作製する。
切断側の身体計測で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 測定肢位は背臥位とする。
2. 断端最小前後径は大転子レベルで計測する。
3. 大腿長は坐骨結節から断端末までの距離である。
4. 大腿長は断端末の軟部組織を押し上げて計測する。
5. 切断肢側の力源となる実質的な長さを確認するために機能的断端長を測定する。

問題.9

解答:2 (2025 59)

20歳の男性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが右膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。
この検査の対象はどれか。
ただし、矢印は検査者が力を加えた方向を示す。



1. 前十字靱帯
2. 後十字靱帯
3. 内側側副靱帯
4. 外側側副靱帯
5. 内側半月板

問題.10

解答:4 (2025 60)

70歳の男性。食道癌術後に集中治療室に入室中。
積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1. RASS-3である。
2. 疼痛がNRS8である。
3. 心拍数120/分である。
4. 平均動脈圧80mmHgである。
5. SOFA〈Sequential Organ Failure Assessment〉scoreが前日より4点増加している。

問題.11

解答:4 (2025 61)

70歳の男性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅢ。歩行時にたびたびすくみ足や小刻み歩行からの突進を生じる。
この患者の歩行練習で適切なのはどれか。

1. 直線上を継ぎ足歩行する。
2. できるだけ歩行速度を上げる。
3. 簡単な計算をしながら歩行する。
4. 等間隔の線を踏みながら歩行する。
5. 足首に重錘バンドをつけて歩行する。

問題.12

解答:3 (2025 62)

58歳の男性。胸髄の脊髄腫瘍摘出術後、両下肢に明らかな運動麻痺、表在感覚障害はないが、深部感覚に重度鈍麻がみられた。開眼すると立位保持可能だが、閉眼するとふらついて倒れそうになる。また、歩行時にもふらつきがあり、踵打歩行が認められる。

運動療法で適切なのはどれか。


1. Buerer体操
2. Codman体操
3. Frenkel体操
4. Klapp体操
5. Williams体操

問題.13

解答:3 (2025 63)

15歳の女子。検診で体幹前屈による肋骨の突出を認め受診した。レントゲン検査で胸椎に30度のCobb角を認めた。処方された体幹装具を図に示す。

この装具の名称はどれか。



1. Halo装具
2. Jewett装具
3. Milwaukee装具
4. SOMI装具
5. Taylor型装具

問題.14

解答:4 (2025 64)

75歳の男性。間質性肺疾患で入院中。安静時も頻呼吸で、頸部の呼吸補助筋活動が亢進し、吸気時の胸骨上切痕および鎖骨上窩の陥凹を認める。

この患者に対する理学療法で最も適切なのはどれか。

1. 気道の吸引を行う。
2. 上肢の筋力増強運動を行う。
3. 腹部引き込み動作の練習を行う。
4. 徒手的な胸郭可動域の拡大運動を行う。
5. 負荷を加えて吸気筋トレーニングを行う。


問題.15

解答:3 (2025 65)

25歳の女性。1か月ほど前から熱いラーメンを吹いて冷ましていると右の手足に力が入らなくなる症状が数分続くことがあったが、その後回復したため様子を見ていた。数日前にも同様の症状があり、心配になり病院を受診した。既往歴に特記すべきことはない。脳血管造影検査の正面像および側面像を示す。

この患者で疑う疾患はどれか。

No. 2 (P 問題 15)



正面像



側面像

1. 脳 炎
2. 脳腫瘍
3. もやもや病
4. 硬膜動静脈瘻
5. アテローム性脳梗塞

問題.16

解答:5 (2025 66)


75歳の男性。糖尿病性腎症のため維持血液透析中。
この患者の運動耐容能を評価する検査はどれか。

1. CAVI
2. HOMA-R
3. HRV 〈Heart Rate Viability〉
4. 足関節上腕血圧比 〈ABI〉
5. 心肺運動負荷試験 〈CPX〉

問題.17

解答:5 (2025 67)

介護予防事業におけるスクリーニングテストを図に示す。
このテストで確認可能なのはどれか。



1. サルコペニア
2. ダイナペニア
3. ポストポリオ症候群
4. メタボリックシンドローム
5. ロコモティブシンドローム

問題.18

解答:5 (2025 68)

77歳の女性。自宅で転倒し救急車で搬入。右大腿骨頸部骨折に対し、人工骨頭置換術が施行された。術後の右股関節は背臥位で外旋位を呈していた。翌日に患者が右足の筋力低下を訴えたため、MMTを評価したところ右足関節背屈筋0であった。右足関節背屈筋力低下に対する物理療法で適切なのはどれか。

1. 温熱療法
2. 赤外線療法
3. 体外衝撃波療法
4. 超音波療法
5. 電気刺激療法

問題.19

解答: 2 (2025 69)

62歳の男性。転倒し前額部を強打し、脊髄損傷と診断された。受傷後3日目のKey muscleのMMTは両側三角筋4、肘屈筋5、肘伸筋2、手関節背屈筋3、中指末節屈筋0、小指外転筋0、下肢筋0。両側乳頭部以下の触覚と痛覚は脱失。肛門の随意収縮と感覚は保たれていた。

この患者のASIA機能障害尺度[ASIA Impairment Scale <AIS>]はどれか。

1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

問題.20

解答: 4 (2025 70)

75歳の男性。体重75kg。慢性心不全。運動療法中の心電図を示す。Aは運動開始前、Bは自転車エルゴメーター30W負荷の運動療法中である。

正しいのはどれか。

No. 3

(P 問題 20)

A
25 mm/sec
1 mV=10 mm
血圧 96/60 mmHg



B
25 mm/sec
1 mV=10 mm
血圧 120/80 mmHg



1. Aでは陰性T波を認める。
2. Aの心拍数は60/分未満である。
3. AはLown分類Ⅲである。
4. BではSTの低下を認める。
5. Bの心拍数は120/分以上である。

問題.21

解答: 1,4 (2025 71)

CBRマトリクスに含まれる項目はどれか。2つ選べ。

1. 教育
2. 人生の質
3. パリアフリー
4. エンパワメント
5. ユニバーサルデザイン

問題.22

解答:1 (2025 72)

要介護者を対象としたケアプラン第1表に記載される項目はどれか。

1. 総合的な援助の方針
2. 生活全般の解決すべき課題〈ニーズ〉
3. 週間サービスの内容
4. サービス担当者会議の要点
5. 支援経過

問題.23

解答:1 (2025 73)

国際疾病分類はどれか。

1. ICD
2. ICF
3. ICF-CY
4. ICHI
5. ICIDH

問題.24

解答:1 (2025 74)

診療報酬は通常何年ごとに改定されるか。

1. 2年ごと
2. 3年ごと
3. 4年ごと
4. 5年ごと
5. 6年ごと

問題.25

解答:3 (2025 75)

短下肢装具で自立歩行が可能な二分脊椎児。

該当する機能残存レベルの上限はどれか。

1. L2
2. L3
3. L4
4. L5
5. S1

問題.26

解答:2 (2025 76)

褥瘡の危険因子でないのはどれか。

1. 低栄養
2. 血圧の上昇
3. 体動の減少
4. 局所的な圧迫
5. 骨の突出部位

問題.27

解答:2 (2025 77)

腰椎椎間板ヘルニアの疼痛誘発テストはどれか。

1. Adsonテスト
2. Bragardテスト
3. Eichhoffテスト
4. Thomsenテスト
5. Yergasonテスト

問題.28

解答:2 (2025 78)

関節可動域測定（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に基づく関節角度測定の運動方向と参考可動域角度の組合せで正しいのはどれか。

1. 頸部屈曲———80度
2. 胸腰部屈曲———45度
3. 肩伸展———30度
4. 股外転———25度
5. 足屈曲（底屈）——60度

問題.29

解答:3 (2025 79)

Parkinson病で見られるのはどれか。

1. 痙 縮
2. 分回し歩行
3. 姿勢反射障害
4. 膝蓋腱反射亢進
5. Babinski反射陽性

問題.30

解答:2 (2025 80)

SF-36の下位尺度に含まれないのはどれか。

1. 活 力
2. 栄養状態
3. 体の痛み
4. 社会生活機能
5. 全体的健康観

問題.31

解答:3,5 (2025 81)

Down症候群に特徴的な二次障害に含まれないのはどれか。2つ選べ。

1. 体幹の側弯
2. 股関節の脱臼
3. 足部の内反変形
4. 環軸関節の亜脱臼
5. 膝関節の屈曲拘縮

問題.32

解答:1 (2025 82)

アミロイドの沈着が見られるのはどれか。

1. Alzheimer病
2. Huntington病
3. Pick病
4. Wernicke脳症
5. 多発性硬化症

問題.33

解答:1 (2025 83)

原発性骨粗鬆症の診断基準に含まれる脆弱性骨折の部位はどれか。

1. 椎 体
2. 上腕骨遠位部
3. 橈骨近位部
4. 大腿骨遠位部
5. 距 骨

問題.34

解答:2,5 (2025 84)

運動軸が1つの関節はどれか。2つ選べ。

1. 顎関節
2. 距腿関節
3. 椎間関節
4. 腕橈関節
5. 下橈尺関節

問題.35

解答:5 (2025 85)

末梢動脈疾患で正しいのはどれか。

1. 女性に多い。
2. 足関節上腕血圧比が高い。
3. 間欠性跛行を呈することはない。
4. 閉塞性動脈硬化症の頻度が低い。
5. 下肢切断が必要になることがある。

問題.36

解答:1 (2025 86)

糖尿病患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1. インスリン抵抗性を改善する。
2. 血糖値に関わらず推奨される。
3. 尿中への糖の排泄を目的とする。
4. Borg指数で17程度が適している。
5. シックデイに関わらず推奨される。

問題.37

解答:2 (2025 87)

急性心筋梗塞の胸痛の特徴で正しいのはどれか。

1. 数分以内に消失する。
2. 冷汗を伴うことが多い。
3. 感冒様の前駆症状がある。
4. 放散痛は生じないことが多い。
5. 硝酸薬の投与で速やかに消失する。

問題.38

解答:3 (2025 88)

患者との面接時における開かれた質問はどれか。

1. 「右膝は痛みますか」
2. 「朝食を食べましたか」
3. 「退院後は何をしますか」
4. 「昨晚は熟睡できましたか」
5. 「椅子から立ち上がれますか」

問題.39

解答:4 (2025 89)

ステロイドの副作用で正しいのはどれか。

1. 筋固縮
2. 低血圧
3. 低血糖
4. 大腿骨頭壊死
5. 高カリウム血症

問題.40

解答:5 (2025 90)

正常成人の立位姿勢で持続的に活動している筋はどれか。

1. 腸腰筋
2. 大殿筋
3. 大腿四頭筋
4. 大腿二頭筋
5. ヒラメ筋

問題.41

解答: 4,5 (2025 91)

大腿義足歩行の立脚中期で体幹の義足側への側屈がみられた。
原因はどれか。2つ選べ。

1. 体重荷重線が足部内側にある。
2. 義足が非切断肢よりも長すぎる。
3. ソケット初期内転角が大きすぎる。
4. ソケット外壁の高さが不足している。
5. 義足側股関節外転筋群に筋力低下がある。

問題.42

解答: 1 (2025 92)

災害リハビリテーション支援で誤っているのはどれか。

1. 理学療法士は災害復興期から活動を開始する。
2. 被災者自身が廃用症候群を予防できるよう支援する。
3. 発災時に迅速な対応ができるように平時から対策する。
4. 災害規模によって数か月程度の長期的な支援が必要となる。
5. 支援統括組織に日本災害リハビリテーション支援協会[Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team <JRAT>]がある。

問題.43

解答: 1 (2025 93)

神経伝導検査でF波の潜時延長と出現率減少がみられる疾患はどれか。

1. Guillain-Barré症候群
2. Parkinson病
3. 重症筋無力症
4. 進行性核上性麻痺
5. 多系統萎縮症

問題.44

解答: 3 (2025 94)

神経筋疾患と理学療法の組合せで正しいのはどれか。

1. Guillain-Barré症候群———Böhler体操
2. 筋萎縮性側索硬化症 <ALS> ——重錘を装着した歩行練習
3. ジストニア———筋電図バイオフィードバック
4. 重症筋無力症———漸増抵抗運動
5. 多発性硬化症———交代浴

問題.45

解答: 3 (2025 95)

髄膜刺激徴候を誘発しやすい体位はどれか。

1. 側臥位
2. 端座位
3. 長座位
4. 背臥位
5. 腹臥位

問題.46

解答: 2,4 (2025 96)

脳の領域と機能の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 角 回—————情 動
2. 縁上回—————空間的構成
3. Broca野—————聴 覚
4. 前頭前野—————行動の抑制
5. Wernicke野————運動のプログラミング

問題.47

解答: 5 (2025 97)

顔面の皮膚感覚を支配する脳神経はどれか。

1. 第Ⅰ脳神経
2. 第Ⅱ脳神経
3. 第Ⅲ脳神経
4. 第Ⅳ脳神経
5. 第Ⅴ脳神経

問題.48

解答: 4 (2025 98)

Wernicke-Mann肢位の特徴で正しい組合せはどれか。

1. 肩関節—————外転位
2. 肘関節—————伸展位
3. 手 指—————伸展位
4. 膝関節—————伸展位
5. 足関節—————背屈位

問題.49

解答: 4 (2025 99)

診療記録で正しいのはどれか。

1. 保存期間は1年間である。
2. SOAPのPはProblemである。
3. 紙媒体では鉛筆で記載してもよい。
4. 患者は自分の診療記録の開示を請求できる。
5. 時間がない場合は後日まとめて記載してよい。

問題.50

解答: 1 (2025 100)

感染症対策で正しいのはどれか。

1. 使用後の手袋は裏返しにして捨てる。
2. 手袋使用後の手指消毒は不要である。
3. 感染症患者以外には標準予防策は不要である。
4. マスクなしで咳をするときは手掌で口を覆う。
5. 気感染予防のためには隔離室内の気圧を陽圧に設定する。

問題.51

解答: 1 (2025 51)

骨代謝で正しいのはどれか。

1. 骨芽細胞が分化して骨細胞になる。
2. 破骨細胞は間葉系幹細胞に由来する。
3. 骨形成が優位になると骨粗鬆症になる。
4. 副甲状腺ホルモンは骨形成を促進する。
5. 骨に負荷がかかると骨吸収が促進される。

問題.52

解答:1 (2025 52)

関節と構造の組合せで正しいのはどれか。

1. 腕尺関節———らせん関節
2. 手根間関節———鞍関節
3. 肩甲上腕関節———楕円関節
4. 橈骨手根関節———平面関節
5. 母指手根中手関節——球関節

問題.53

解答:2,3 (2025 53)

味覚を支配する脳神経はどれか。2つ選べ。

1. 三叉神経
2. 舌咽神経
3. 迷走神経
4. 副神経
5. 舌下神経

問題.54

解答:1 (2025 54)

胃で正しいのはどれか。

1. 幽門には弁がある。
2. 胃底は噴門より下部にある。
3. 噴門は第1腰椎レベルにある。
4. 幽門は第11胸椎レベルにある。
5. 胃切痕は大彎の遠位1/3にある。

問題.55

解答:1 (2025 55)

平衡聴覚器で正しいのはどれか。


1. 蝸牛は内耳にある。
2. 内リンパと外リンパは交通している。
3. 耳管により内耳と咽頭は交通している。
4. 骨半規管は2つの半規管で構成される。
5. 鼓膜に付着している耳小骨はキヌタ骨である。

問題.56

解答: 2,4 (2025 56)

母指を橈側外転させた右手を図に示す。

矢印の腱はどれか。2つ選べ。



1. 短母指外転筋
2. 短母指伸筋
3. 長橈側手根伸筋
4. 長母指外転筋
5. 長母指伸筋

問題.57

解答: 2 (2025 57)

筋とその停止部の組合せで正しいのはどれか。

1. 肩甲挙筋———肩甲骨の肩甲切痕
2. 小円筋———上腕骨の大結節
3. 上腕筋———橈骨粗面
4. 半膜様筋———腓骨頭
5. 前脛骨筋———第2中足骨底

問題.58

解答: 3 (2025 58)

皮質脊髓路に含まれるのはどれか。

1. 海馬
2. 視床
3. 大脳脚
4. 中心後回
5. 内包前脚

問題.59

解答: 2 (2025 59)

内頸動脈の分枝はどれか。

1. 顎動脈
2. 眼動脈
3. 舌動脈
4. 顔面動脈
5. 椎骨動脈

問題.60

解答: 4 (2025 60)

門脈に流入する血管はどれか。

1. 肝静脈
2. 奇静脈
3. 腎静脈
4. 脾静脈
5. 総腸骨静脈

問題.61

解答: 3 (2025 61)

心筋で正しいのはどれか。

1. 平滑筋である。
2. 心筋線維は多核である。
3. ギャップ結合がみられる。
4. ATPは嫌気性呼吸で産生される。
5. 収縮は運動神経のインパルスによって起こる。

問題.62

解答: 1,3 (2025 62)

筋紡錘の求心性線維はどれか。2つ選べ

1. Ia 2. Ib 3. II 4. III 5. IV

問題.63

解答: 1 (2025 63)

体温で正しいのはどれか。

1. 体内の熱は呼気から放散される。
2. 熱産生は骨格筋に次いで心臓が大きい。
3. 激しい運動でも直腸温は40℃を超えない。
4. 腹腔には体温の変化を検出する受容器がない。
5. 体温が1℃上昇すると基礎代謝は約1%増える。

問題.64

解答: 4 (2025 64)

嫌気性解糖で正しいのはどれか。

1. TCA回路が利用される。
2. ミトコンドリア内で行われる。
3. 供給エネルギーの持続時間は約15秒である。
4. グルコースはピルビン酸から乳酸に変換される。
5. グルコース1分子から4分子のATPが得られる。

問題.65

解答: 2,3 (2025 65)

副交感神経の作用で分泌が促進されるのはどれか。2つ選べ。

1. 汗 腺 2. 涙 腺 3. 舌下腺 4. レニン 5. ノルアドレナリン

問題.66

解答: 1 (2025 66)

アルカローシスをきたすのはどれか。

1. 嘔 吐 2. 飢 餓 3. 下 痢 4. 重症の喘息 5. CO₂ ナルコーシス

問題.67

解答: 2 (2025 67)

体液性免疫で作動するのはどれか。

1. 単 球 2. B細胞 3. 好中球 4. NK細胞 5. マクロファージ

問題.68

解答:5 (2025 68)

排便中枢はどれか。

1. 第1～3胸髄
2. 第5～7胸髄
3. 第10～12胸髄
4. 第3～5腰髄
5. 第2～4仙髄

問題.69

解答:2 (2025 69)

肩甲骨の筋と運動の組み合わせで正しいのはどれか。

1. 僧帽筋上部線維——外転
2. 僧帽筋下部線維——上方回旋
3. 菱形筋——下制
4. 前鋸筋——下方回旋
5. 小胸筋——拳上

問題.70

解答:5 (2025 70)


膝関節で正しいのはどれか。

1. 関節面は内側顆より外側顆が広い。
2. 前十字靭帯は屈曲運動の制限となる。
3. 屈曲位から伸展すると下腿は内旋する。
4. 大腿骨と脛骨の長軸は一直線上にある。
5. 屈曲の最終可動域に近づくにつれ滑り運動となる。

問題.71

解答:3 (2025 71)

体幹の伸展運動を図に示す。
伸展を制動する靭帯はどれか。



1. 棘上靭帯 2. 棘間靭帯 3. 前縦靭帯 4. 後縦靭帯 5. 横突間靭帯

問題.72

解答:3 (2025 72)

努力性呼気時に働く筋で誤っているのはどれか。

1. 腹直筋 2. 肋下筋 3. 外肋間筋 4. 内腹斜筋 5. 内肋間筋後部

問題.73

解答:2 (2025 73)

上肢の筋と運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 烏口腕筋————肩伸展
2. 上腕二頭筋————前腕回外
3. 上腕筋————肘伸展
4. 腕橈骨筋————肘伸展
5. 長橈側手根伸筋——前腕回内

問題.74

解答:1 (2025 74)

運動学習で正しいのはどれか。

1. 運動学習の過程には小脳が関与する。
2. 運動学習の初期段階で手続き記憶が得られる。
3. 覚醒レベルとパフォーマンス向上は比例関係である。
4. 課題に習熟するとフィードバック制御で運動が行われる。
5. 練習量と達成度の関係を示す学習曲線は逆U字型である。

問題.75

解答:5 (2025 75)

免疫反応で最初に産生されるのはどれか。

1. IgA 2. IgD 3. IgE 4. IgG 5. IgM

問題.76

解答:4 (2025 76)

過形成で正しいのはどれか。

1. 細胞数は一定である。
2. 急性刺激により生じる。
3. 細胞の容積は増大する。
4. 刺激がなくなれば停止する。
5. 臓器のサイズは一定である。

問題.77

解答:4 (2025 77)

リンパ浮腫への対応で正しいのはどれか。

1. 利尿薬で治療する。
2. 水分摂取を制限する。
3. 患肢の体毛を剃毛する。
4. 患肢の皮膚を保湿する。
5. 患肢を低い位置に保つ。

問題.78

解答:3 (2025 78)

アポトーシスで正しいのはどれか。

1. 核が融解する。
2. 細胞の大きさは膨化する。
3. 細胞死は散在性に認められる。
4. 受動的に生じる細胞死である。
5. 細胞内容物は細胞外へ放出される。

問題.79

解答:2 (2025 79)

無意識のなかに抑え込まれた欲動が精神症状として現れると想定し、その葛藤を明らかにすることによって症状の改善を目指すのはどれか。

1. 支持的精神療法
2. 精神分析療法
3. 認知行動療法
4. 森田療法
5. 来談者中心療法

問題.80

解答:4 (2025 80)

数字の順唱によって評価できる記憶で最も適切なのはどれか。

1. 遠隔記憶
2. 近時記憶
3. 作動記憶〈ワーキングメモリー〉
4. 即時記憶
5. 手続き記憶

問題.81

解答:1 (2025 81)

Eriksonの心理・社会的発達論で高齢者が克服すべきなのはどれか。

1. 統合
2. 自発性
3. 自律性
4. 同一性
5. 基本的信頼

問題.82

解答:4 (2025 82)

深部感覚障害で陽性となるのはどれか。

1. Barré徴候
2. Kernig徴候
3. Lasègue徴候
4. Romberg徴候
5. カーテン徴候

問題.83

解答:1,3 (2025 83)

小脳障害でみられる症候はどれか。2つ選べ。

1. 筋緊張低下
2. 静止時振戦
3. ジスメトリー
4. 深部感覚障害
5. 病的反射陽性

問題.84

解答:4 (2025 84)

嚥下機能で反回神経麻痺により障害される期はどれか。

1. 先行期
2. 準備期
3. 口腔期
4. 咽頭期
5. 食道期

問題.85

解答:5 (2025 85)

出生後、消失するのが最も遅いのはどれか。

1. 吸啜反射
2. Galant反射
3. 手掌把握反射
4. 足底把握反射
5. 交叉性伸展反射

問題.86

解答:5 (2025 86)

多発性硬化症で正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 遺伝性の疾患である。
3. 温熱療法が効果的である。
4. 末梢神経の脱髄疾患である。
5. MRI検査が診断に有用である。

問題.87

解答:2,3 (2025 87)

AEDによる電氣的除細動の適応となるのはどれか。2つ選べ。

1. 心静止
2. 心室細動
3. 心室頻拍
4. 洞性頻脈
5. 房室ブロック

問題.88

解答:2 (2025 88)

神経ブロックで正しいのはどれか。

1. 三叉神経痛の治療に硬膜外ブロックを行う。
2. 星状神経節ブロックの合併症に嚔声がある。
3. ボツリヌス毒素の作用部位は筋内神経である。
4. ボツリヌス毒素注射の効果持続期間は約3日である。
5. ボツリヌス毒素注射は Lambert-Eaton 症候群に適応がある。

問題.89

解答:1 (2025 89)

女性に有病率の高い疾患はどれか。

1. 関節リウマチ
2. 強直性脊椎炎
3. 大腿骨頭すべり症
4. 特発性大腿骨頭壊死
5. 腰椎椎間板ヘルニア

問題.90

解答:5 (2025 90)

腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

1. 小児期に多く発生する。
2. 膀胱直腸障害は生じない。
3. 人口の約15%が罹患する。
4. Myerson徴候は陽性である。
5. 脱出髄核は吸収されることがある。

問題.91

解答:2 (2025 91)

くも膜下出血の早期診断で優先度の高い検査はどれか。

1. 腰椎穿刺
2. 頭部CT検査
3. 頭部X線検査
4. 脳血管造影検査
5. 脳血流シンチグラフィ

問題.92

解答:1 (2025 92)

脳血管障害のうち、日本で2021年以降に発症数が最も多いのはどれか。

1. 脳梗塞
2. 脳出血
3. くも膜下出血
4. 脳静脈血栓症
5. 慢性硬膜下血腫

問題.93

解答:1 (2025 93)

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。

1. 遺伝性疾患である。
2. 女性に多く発症する。
3. 主に成人後に発症する。
4. 感染が発症の契機となる。
5. 平均寿命は約60歳である。

問題.94

解答:2 (2025 94)

尿毒症で正しいのはどれか。

1. 腎不全の初期にみられる。
2. 代謝性アシドーシスを示す。
3. 低カリウム血症を生じやすい。
4. 透析患者の死亡原因で最も多い。
5. 血清クレアチニン濃度は低下する。

問題.95

解答:4 (2025 95)

周術期の肺塞栓症で誤っているのはどれか。

1. 呼吸困難を生じる。
2. 突然死のリスクが高い。
3. 歩行開始時に発症しやすい。
4. 予防のため安静臥床とする。
5. 下肢の静脈血栓が原因となることが多い。

問題.96

解答:1 (2025 96)

自殺危険率の高いうつ病患者の特徴でないのはどれか。

1. 女 性
2. 精神科入院歴
3. 自殺企図の既往
4. 不安障害の合併
5. 薬物依存の合併

問題.97

解答:1 (2025 97)

常染色体のトリソミーで引き起こされる疾患はどれか。

1. Down症候群
2. Klinefelter症候群
3. Turner症候群
4. von Recklinghausen病
5. フェニルケトン尿症

問題.98

解答: 3,5 (2025 98)

統合失調症の陽性症状はどれか。2つ選べ。

1. 意欲減退 2. 会話の貧困 3. 幻 覚 4. 注意の障害 5. 思考の障害

問題.99

解答: 5 (2025 99)

うつ病の症状はどれか。

1. 観念奔逸 2. 誇大妄想 3. 思考奪取 4. 思考途絶 5. 無価値感

問題.100

解答: 5 (2025 100)

強迫症〈強迫性障害〉の症状で正しいのはどれか。

1. 強迫行為中の記憶は残らない。
2. 家族を巻き込むことは稀である。
3. 強迫観念は睡眠中も持続している。
4. 強迫行為を命令する幻聴に怯えている。
5. 強迫観念を不合理であると認識している。