

問題.1

ノーマライゼーションで正しいのはどれか。

1. 医学的モデルに基づいた概念である。
2. 日本からはじまった社会理念である。
3. 障害者が自己決定権を有することである。
4. 福祉サービスを利用せずに生活することである。
5. 身体機能の改善によって生活を正常化させることである。

問題.2

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。

1. T字杖
2. ウォーカーケイン
3. 車椅子
4. 特殊寝台
5. 移動用リフト

問題.3

ICFの分類で環境因子に含まれるのはどれか。

1. 移動
2. 疾患
3. 職業
4. 制度
5. 既往歴

問題.4

障害者自立支援法が障害者総合支援法になったことに伴い新たに支援対象として追加されたのはどれか。

1. 難病
2. 身体障害
3. 精神障害
4. 知的障害
5. 高次脳機能障害

問題.5

6～12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1. I ——— 階段で手すり使用
2. II ——— 装具なしで歩行
3. III ——— 不整地の歩行
4. IV ——— 通常の椅子で座位保持
5. V ——— 四つ這い移動可能

問題.6

我が国の65歳以上の高齢者における軽度認知障害〈MCI〉の有病率で適切なのはどれか。

1. 5%
2. 15%
3. 35%
4. 55%
5. 75%

問題.7

スワンネック変形で過伸展となるのはどれか。

1. 遠位指節間関節
2. 遠位橈尺関節
3. 近位指節間関節
4. 手根中手関節
5. 中手指節間関節

問題.8

基礎代謝量で正しいのはどれか。

1. 温上昇に伴い低くなる。
2. 慢性炎症性疾患では高くなる。
3. 除脂肪体重が少ないと高くなる。
4. 春期以降は加齢とともに高くなる。
5. 同一年齢では男性のほうが女性より低い。

問題.9

UPDRS＜Unified Parkinson's Disease Rating Scale＞Version3.0の運動能力検査の項目はどれか。

1. 嚥下
2. 固縮
3. 転倒
4. 寝返り
5. 歩行中のすくみ

問題.10

Fugl-Meyer Assessmentで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 評価は4段階で行う。
2. 満点は226点である。
3. 感覚は痛覚を評価する。
4. 評価項目は4つである。
5. Brunnstrom法ステージと共通する評価項目がある。

問題.11

WeeFIMで正しいのはどれか。

1. できる活動を評価する。
2. 検査項目は15項目である。
3. 適応年齢は8歳以上である。
4. 介助の程度に応じて6段階で評価する。
5. 社会的交流として、遊びへの参加を評価する。

問題.12

認知症の中核症状はどれか。2つ選べ。

1. 失認
2. 徘徊
3. 妄想
4. 抑うつ
5. 見当識障害

問題.13

フレイルの判定要件はどれか。2つ選べ。

1. 骨密度の減少
2. 柔軟性の低下
3. 肺活量の低下
4. 歩行速度の低下
5. 身体活動量の減少

問題.14

Functional Reach Testで正しいのはどれか。

1. 歩行速度の簡易予測に用いる。
2. リーチ時に踵を浮かせてよい。
3. リーチ距離の水平成分を測定する。
4. 両上肢をそろえて前方にリーチさせる。
5. SPPB 〈Short Physical Performance Battery〉 検査の一部である。

問題.15

酸素療法機器で正しいのはどれか。

1. 鼻カニューラは高流量系である。
2. 高流量系機器は加湿不要である。
3. 医療ガスの酸素ボンベは緑色である。
4. ベンチュリマスクは低流量系である。
5. 在宅酸素療法では酸素濃縮器を用いる。

問題.16

口すぼめ呼吸の指導で正しいのはどれか。

1. 吸気を延長させる。
2. 呼吸数を増加させる。
3. COPD患者に適用する。
4. 機能的残気量を増加させる。
5. 頬を膨らませるように指導する

問題.17

MRC sum scoreで評価できるのはどれか。

1. ICU-AW
2. 意識障害
3. 嚥下障害
4. 入院関連能力低下[HAD 〈Hospitalization Associated Disability〉]
5. 抑うつ

問題.18

理学療法評価における社会的情報に該当しないのはどれか。

1. 趣味 2. 職業 3. 体重 4. 配偶者の有無 5. 家屋内の段差の有無

問題.19

血液検査項目と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1. CK-MB——末梢動脈疾患[PAD 〈peripheral artery disease〉]
2. Dダイマー ——深部静脈血栓症<DVT>
3. eGFR——慢性閉塞性肺疾患 〈COPD〉
4. NT-proBNP——間質性肺疾患 〈ILD〉
5. SP-D——慢性心不全 〈CHF〉

問題.20

筋力増強運動で正しいのはどれか。

1. 高齢者では高負荷低頻度で実施するのがよい。
2. 運動の効果には対象者の運動経験は影響しない。
3. 等張性収縮には求心性収縮と遠心性収縮がある。
4. 筋力維持には最大筋力の40～50%以上の負荷が必要である。
5. 等速性収縮の角速度高速域での運動は筋出力効果が増大する。

問題.21

前十字靭帯損傷で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 単独損傷が8割以上である。
2. Lachman testが陽性となる。
3. 再建術は受傷後1年以降が推奨されている。
4. 受傷前レベルへのスポーツ復帰率は9割以上である。
5. ハムストリングスの収縮により損傷部位の緊張は低下する。

問題.22

日本で最初の理学療法士養成教育機関が開設された時期はどれか。

1. 1950年代
2. 1960年代
3. 1970年代
4. 1980年代
5. 1990年代

問題.23

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018に示されている集中リハビリテーションの転帰指標はどれか。

1. SARA 2. 筋 力 3. 咳嗽力 4. 深部感覚 5. 関節可動域

問題.24

登はん性起立を示すのはどれか。

1. 筋強直性ジストロフィー
2. 肢帯型筋ジストロフィー
3. 先天型筋ジストロフィー
4. Duchenne型筋ジストロフィー
5. 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

問題.25

正常歩行周期で膝関節伸展モーメントが最も作用するのはどれか。

1. 初期接地 2. 荷重応答期 3. 立脚終期 4. 前遊脚期 5. 遊脚中期

問題.26

錐体外路に含まれないのはどれか。

1. 黒 質
2. 視床下核
3. 錐体交叉
4. 線条体
5. 淡蒼球

問題.27

自律神経障害の症状はどれか。2つ選べ。

1. 振 戦
2. 複 視
3. 不整脈
4. 血圧低下
5. 視力低下

問題.28

小脳梗塞でみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 眼 振
2. 球麻痺
3. 運動失調
4. 同名半盲
5. 遂行機能障害

問題.29

無作為化比較試験で正しいのはどれか。

1. 観察研究である。
2. 交絡因子の影響を小さくできる。
3. インフォームドコンセントは不要である。
4. 因子間の相互関係を調べることが目的である。
5. 診療録に記載してある過去の記録で調査できる。

問題.30

三次予防にあたるのはどれか。

1. 高血圧患者の薬物療法
2. 高齢者の骨折予防指導
3. 乳癌のマンモグラフィ検診
4. 脳卒中患者の職場復帰支援
5. インフルエンザワクチンの接種

問題.31

CBRマトリクスに含まれる項目はどれか。2つ選べ。

1. 教 育
2. 人生の質
3. パリアフリー
4. エンパワメント
5. ユニバーサルデザイン

問題.32

要介護者を対象としたケアプラン第1表に記載される項目はどれか。

1. 総合的な援助の方針
2. 生活全般の解決すべき課題〈ニーズ〉
3. 週間サービスの内容
4. サービス担当者会議の要点
5. 支援経過

問題.33

国際疾病分類はどれか。

1. ICD
2. ICF
3. ICF-CY
4. ICHI
5. ICIDH

問題.34

診療報酬は通常何年ごとに改定されるか。

1. 2年ごと
2. 3年ごと
3. 4年ごと
4. 5年ごと
5. 6年ごと

問題.35

短下肢装具で自立歩行が可能な二分脊椎児。

該当する機能残存レベルの上限はどれか。

1. L2
2. L3
3. L4
4. L5
5. S1

問題.36

褥瘡の危険因子でないのはどれか。

1. 低栄養
2. 血圧の上昇
3. 体動の減少
4. 局所的な圧迫
5. 骨の突出部位

問題.37

腰椎椎間板ヘルニアの疼痛誘発テストはどれか。

1. Adsonテスト
2. Bragardテスト
3. Eichhoffテスト
4. Thomsenテスト
5. Yergasonテスト

問題.38

関節可動域測定（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に基づく関節角度測定の運動方向と参考可動域角度の組合せで正しいのはどれか。

1. 頸部屈曲———80度
2. 胸腰部屈曲———45度
3. 肩伸展———30度
4. 股外転———25度
5. 足屈曲（底屈）——60度

問題.39

Parkinson病でみられるのはどれか。

1. 痙 縮
2. 分回し歩行
3. 姿勢反射障害
4. 膝蓋腱反射亢進
5. Babinski反射陽性

問題.40

SF-36の下位尺度に含まれないのはどれか。

1. 活 力
2. 栄養状態
3. 体の痛み
4. 社会生活機能
5. 全体的健康観

問題.41

Down症候群に特徴的な二次障害に含まれないのはどれか。2つ選べ。

1. 体幹の側弯
2. 股関節の脱臼
3. 足部の内反変形
4. 環軸関節の亜脱臼
5. 膝関節の屈曲拘縮

問題.42

アミロイドの沈着がみられるのはどれか。

1. Alzheimer病
2. Huntington病
3. Pick病
4. Wernicke脳症
5. 多発性硬化症

問題.43

原発性骨粗鬆症の診断基準に含まれる脆弱性骨折の部位はどれか。

1. 椎 体
2. 上腕骨遠位部
3. 橈骨近位部
4. 大腿骨遠位部
5. 距 骨

問題.44

運動軸が1つの関節はどれか。2つ選べ。

1. 顎関節
2. 距腿関節
3. 椎間関節
4. 腕橈関節
5. 下橈尺関節

問題.45

末梢動脈疾患で正しいのはどれか。

1. 女性に多い。
2. 足関節上腕血圧比が高い。
3. 間欠性跛行を呈することはない。
4. 閉塞性動脈硬化症の頻度が低い。
5. 下肢切断が必要になることがある。

問題.46

糖尿病患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1. インスリン抵抗性を改善する。
2. 血糖値に関わらず推奨される。
3. 尿中への糖の排泄を目的とする。
4. Borg指数で17程度が適している。
5. シックデイに関わらず推奨される。

問題.47

急性心筋梗塞の胸痛の特徴で正しいのはどれか。

1. 数分以内に消失する。
2. 冷汗を伴うことが多い。
3. 感冒様の前駆症状がある。
4. 放散痛は生じないことが多い。
5. 硝酸薬の投与で速やかに消失する。

問題.48

患者との面接時における開かれた質問はどれか。

1. 「右膝は痛みますか」
2. 「朝食を食べましたか」
3. 「退院後は何をしますか」
4. 「昨晚は熟睡できましたか」
5. 「椅子から立ち上がれますか」

問題.49

ステロイドの副作用で正しいのはどれか。

1. 筋固縮
2. 低血圧
3. 低血糖
4. 大腿骨頭壊死
5. 高カリウム血症

問題.50

正常成人の立位姿勢で持続的に活動している筋はどれか。

1. 腸腰筋
2. 大殿筋
3. 大腿四頭筋
4. 大腿二頭筋
5. ヒラメ筋

問題.51

大腿義足歩行の立脚中期で体幹の義足側への側屈がみられた。
原因はどれか。2つ選べ。

1. 体重荷重線が足部内側にある。
2. 義足が非切断肢よりも長すぎる。
3. ソケット初期内転角が大きすぎる。
4. ソケット外壁の高さが不足している。
5. 義足側股関節外転筋群に筋力低下がある。

問題.52

災害リハビリテーション支援で誤っているのはどれか。

1. 理学療法士は災害復興期から活動を開始する。
2. 被災者自身が廃用症候群を予防できるよう支援する。
3. 発災時に迅速な対応ができるように平時から対策する。
4. 災害規模によって数か月程度の長期的な支援が必要となる。
5. 支援統括組織に日本災害リハビリテーション支援協会[Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team 〈JRAT〉]がある。

問題.53

神経伝導検査でF波の潜時延長と出現率減少がみられる疾患はどれか。

1. Guillain-Barré症候群
2. Parkinson病
3. 重症筋無力症
4. 進行性核上性麻痺
5. 多系統萎縮症

問題.54

神経筋疾患と理学療法の組合せて正しいのはどれか。

1. Guillain-Barré症候群———Böhler体操
2. 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉——重錘を装着した歩行練習
3. ジストニア———筋電図バイオフィードバック
4. 重症筋無力症———漸増抵抗運動
5. 多発性硬化症———交代浴

問題.55

髄膜刺激徴候を誘発しやすい体位はどれか。

1. 側臥位
2. 端座位
3. 長座位
4. 背臥位
5. 腹臥位

問題.56

脳の領域と機能の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 角 回—————情 動
2. 縁上回—————空間的構成
3. Broca野—————聴 覚
4. 前頭前野—————行動の抑制
5. Wernicke野————運動のプログラミング

問題.57

顔面の皮膚感覚を支配する脳神経はどれか。

1. 第Ⅰ脳神経
2. 第Ⅱ脳神経
3. 第Ⅲ脳神経
4. 第Ⅳ脳神経
5. 第Ⅴ脳神経

問題.58

Wernicke-Mann肢位の特徴で正しい組合せはどれか。

1. 肩関節—————外転位
2. 肘関節—————伸展位
3. 手 指—————伸展位
4. 膝関節—————伸展位
5. 足関節—————背屈位

問題.59

診療記録で正しいのはどれか。

1. 保存期間は1年間である。
2. SOAPのPはProblemである。
3. 紙媒体では鉛筆で記載してもよい。
4. 患者は自分の診療記録の開示を請求できる。
5. 時間がない場合は後日まとめて記載してよい。

問題.60

感染症対策で正しいのはどれか。

1. 使用後の手袋は裏返しにして捨てる。
2. 手袋使用後の手指消毒は不要である。
3. 感染症患者以外には標準予防策は不要である。
4. マスクなしで咳をするときは手掌で口を覆う。
5. 気感染予防のためには隔離室内の気圧を陽圧に設定する。