


問題.1

左大腿中央部の横断面を図に示す。
aの筋はどれか。



1. 薄 筋
2. 縫工筋
3. 大内転筋
4. 短内転筋
5. 長内転筋

問題.2

関節唇を有するのはどれか。2つ選べ。

1. 肩関節
2. 肘関節
3. 股関節
4. 膝関節
5. 足関節

問題.3

運動神経線維のみの脳神経はどれか。

1. 動眼神経
2. 三叉神経
3. 顔面神経
4. 舌咽神経
5. 副神経

問題.4

尺骨神経の支配を受けるのはどれか。

1. 長母指屈筋
2. 母指内転筋
3. 第1虫様筋
4. 短母指外転筋
5. 短母指屈筋浅頭

問題.5

食道で正しいのはどれか。

1. 長さは約35cmである。
2. 甲状軟骨下縁から始まる。
3. 生理的狭窄部は4か所ある。
4. 左主気管支により圧迫される。
5. 下部の60%は横紋筋からなる。

問題.6

下垂体後葉から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。

1. グレリン
2. エストロゲン
3. オキシトシン
4. バソプレシン
5. アルドステロン

問題.7

視覚器で正しいのはどれか。

1. 杵体は色を感知する。
2. 網膜の黄斑には錐体が多い。
3. 角膜には神経は分布していない。
4. 網膜の中心窩は視野に盲点を生じる。
5. 硝子体は屈折率の変化により焦点距離を調整する。

問題.8

動脈とその触診部位の組合せで誤っているのはどれか。

1. 内頸動脈——鎖骨内側1/3
2. 上腕動脈——上腕二頭筋腱内側
3. 橈骨動脈——橈側手根屈筋腱外側
4. 大腿動脈——上前腸骨棘と恥骨結節を結ぶ中点
5. 足背動脈——長母指伸筋腱外側

問題.9

脊髄で運動神経の細胞体が主に存在する部位はどれか。

1. 後角
2. 後索
3. 前角
4. 前索
5. 側索

問題.10

被殻の支配動脈を分枝するのはどれか。

1. 前大脳動脈
2. 中大脳動脈
3. 後大脳動脈
4. 脳底動脈
5. 椎骨動脈

問題.11

ATP産生に関わる細胞小器官はどれか。

1. 中心小体
2. Golgi装置
3. 滑面小胞体
4. リボソーム
5. ミトコンドリア

問題.12

タイプII筋線維と比較した場合のタイプI筋線維の特徴はどれか。

1. 発生張力が弱い。
2. 筋線維の径が太い。
3. 酸化酵素活性が低い。
4. ミオグロビン量が少ない。
5. ミトコンドリア密度が低い。

問題.13

自律神経で正しいのはどれか。

1. 節後線維は有髄線維である。
2. 随意的に内臓の機能を調節する。
3. 断続的に臓器へインパルスを発する。
4. 汗腺は交感神経と副交感神経の二重支配である。
5. 節前線維の末端からアセチルコリンが放出される。

問題.14

呼吸の調節機構で正しいのはどれか。

1. 呼吸中枢は視床下部にある。
2. 末梢の化学受容器は椎骨動脈にある。
3. 横隔膜や肋間筋は随意的に収縮できない。
4. 末梢の化学受容器は酸素分圧の上昇により興奮する。
5. 肺の伸展受容器の興奮は迷走神経を介して呼吸中枢に伝わる。

問題.15

心臓の刺激伝導系で正しいのはどれか。

1. 洞房結節は左心房にある。
2. 心筋細胞はK⁺の流入によって脱分極する。
3. 心電図のP波は心室の興奮に対応している。
4. 副交感神経が興奮すると心拍数は増加する。
5. 房室結節の興奮はHis束を経て心室に伝わる。

問題.16

血球と機能の組合せで正しいのはどれか。

1. 単球———抗体産生
2. 顆粒球———酸素運搬
3. 血小板———止血
4. 赤血球———細胞性免疫
5. リンパ球———細菌貪食

問題.17

胆汁で正しいのはどれか。

1. アルカリ性である。
2. 胆嚢で産生される。
3. 蛋白質を分解する。
4. リパーゼが含まれる。
5. 主に大腸で再吸収される。

問題.18

月経で誤っているのはどれか。

1. 分泌期は10日間である。
2. 月経血は非凝固性である。
3. 月経期は黄体の退縮により生じる。
4. エストロゲンは子宮内膜の再生に作用する。
5. プロゲステロンは子宮内膜の分泌活動に作用する。

問題.19

運動単位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 運動単位には求心性線維が含まれる。
2. 神経支配比が大きいほど精密な動きができる。
3. 活動電位の大きな運動単位が先に活動を始める。
4. 同じ運動単位に属する筋線維は同期して興奮する。
5. 運動ニューロンとそれに支配される筋線維群を運動単位という。

問題.20

肺気量分画のうちの2つを用いて肺胞換気量を算出する場合、使用するのはどれか。2つ選べ。

1. 残気量 2. 1回換気量 3. 死腔換気量 4. 予備吸気量 5. 予備呼気量

問題.21

頭頸部の屈曲と伸展の両方に作用する筋はどれか。

1. 前斜角筋 2. 前頭直筋 3. 頭板状筋 4. 胸鎖乳突筋 5. 脊柱起立筋

問題.22

健常者の股関節で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 鞍関節である。
2. 頸体角は120～130度である。
3. 恥骨大腿靱帯は伸展運動で緊張する。
4. 大腿骨の垂直軸に対する運動軸は約15度である。
5. 大腿骨頭の前方は寛骨臼に完全に被覆されている。

問題.23

立位姿勢が安定しているのはどれか。

1. 支持基底面が狭い。
2. 重心の位置が高い。
3. 重心線は膝関節中心の前方を通る。
4. 床と足底の接触面の摩擦抵抗が小さい。
5. 重心線の位置が支持基底面の中心から離れている。

問題.24

正常歩行で正しいのはどれか。

1. 立脚相の後半は抑制期である。
2. 重心は立脚中期で最も側方へ移動する。
3. 前額面において遊脚側の骨盤は上方傾斜する。
4. 歩行速度が速くなると遊脚相の比率は低下する。
5. 遊脚相で下肢が体幹の後方にある時期を減速期という。

問題.25

疾病発症の外因のうち、物理的要因はどれか。

1. 鉛
2. 喫煙
3. 紫外線
4. 肺炎球菌
5. アルコール

問題.26

急性炎症と比較した場合の慢性炎症の特徴はどれか。2つ選べ。

1. 血管の増殖
2. 好中球の集積
3. 組織の線維化
4. 血漿蛋白の浸出
5. 血管内皮細胞の損傷

問題.27

良性腫瘍と比較した場合の悪性腫瘍の特徴はどれか。

1. 核分裂が少ない。
2. 出血は稀である。
3. 発育速度が遅い。
4. 細胞の異型性が強い。
5. 周囲との境界が明瞭である。

問題.28

正しい組合せはどれか。

1. オペラント条件づけ———A.Beck
2. 自動思考———J.Kabat-Zinn
3. 社会生活技能訓練———R.Liberman
4. 動機づけ———I.Pavlov
5. マインドフルネス———W.Miller

問題.29

「明日朝9時に会議に出席する」と決めた。
翌朝になると会議の予定が思い出せるのはどれか。

1. 意味記憶 2. 作動記憶 3. 展望記憶 4. 手続き記憶 5. エピソード記憶

問題.30

Piaget発達論で0～2歳ころはどれか。

1. 感覚運動期 2. 具体的操作期 3. 形式的操作期 4. 潜在期 5. 前操作期

問題.31

投影法の人格検査はどれか。

1. MMPI
2. TAT
3. TEG
4. Y-G性格検査
5. 内田クレペリン精神検査

問題.32

取り組みが始まった時期の年代順でただしいのはどれか。
①国際障害者年②ノーマライゼーション③自立生活運動<IL運動>

1. ①→②→③ 2. ①→③→② 3. ②→①→③ 4. ②→③→① 5. ③→①→②

問題.33

長期間の安静臥床で増加するのはどれか。

1. 骨密度
2. 筋持久性
3. 腸管蠕動運動
4. 関節の結合組織
5. 最大酸素摂取量

問題.34

関節リウマチのSteinbrockerのステージIVの特徴はどれか。

1. 腱鞘炎 2. 関節強直 3. 骨粗鬆症 4. 軟骨下骨の破壊 5. 関節周囲の筋萎縮

問題.35

加齢で低下するのはどれか。

1. 骨塩量
2. 肺残気量
3. 自己抗体形成
4. 末梢血管抵抗
5. 炎症性サイトカイン

問題.36

末梢神経伝導検査が診断に有用なのはどれか。

1. Parkinson病
2. 手根管症候群
3. 多系統萎縮症
4. 筋ジストロフィー
5. 閉塞性動脈硬化症

問題.37

股関節屈曲拘縮を調べるのはどれか。

1. Allisテスト
2. McMurrayテスト
3. Patrickテスト
4. Simmondsテスト
5. Thomasテスト

問題.38

胃全摘出術後の悪性貧血に関与するのはどれか。

1. ビタミンB₁
2. ビタミンB₂
3. ビタミンB₁₂
4. ビタミンC
5. ビタミンD

問題.39

肘離断性骨軟骨炎で誤っているのはどれか。

1. 10～20代に多い。
2. 投球を伴うスポーツで多い。
3. 初期では保存療法が第一選択である。
4. 超音波画像は初期診断に有用である。
5. 学童期の野球選手の有病率は20～30%である。

問題.40

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。

1. 若年者に多い。
2. 予後不良である。
3. 感染性疾患である。
4. 結髪動作が困難になる。
5. 手術療法が優先される。

問題.41

Parkinson病の治療薬はどれか。

1. β 遮断薬
2. L-ドーパ
3. インスリン
4. カルシウム拮抗薬
5. ペニシリン系抗菌薬

問題.42

Guillain-Barré症候群の初期症状で特徴的なのはどれか。

1. 体重減少
2. 激しい関節痛
3. 突然の視覚喪失
4. 皮膚の色素沈着
5. 遠位中心の筋力低下

問題.43

高齢者にみられる病態のうち、低栄養と関連が少ないのはどれか。

1. 褥瘡
2. 貧血
3. サルコペニア
4. 変形性膝関節症
5. 大腿骨頸部骨折

問題.44

成人の熱傷で正しいのはどれか。

1. 化学損傷には洗浄は避ける。
2. 重症熱傷では蛋白質の異化は低下する。
3. 受傷後早期には創傷被覆材は使用しない。
4. II度20%の熱傷には初期輸液が行われる。
5. 広範囲熱傷の壊死組織に対して早期手術は行わない。

問題.45

高齢者の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1. 歩隔の減少
2. 歩幅の減少
3. 歩行率の増加
4. 遊脚期の延長
5. 両脚支持期の短縮

問題.46

アルコール離脱症状の後遺症はどれか。

1. Kleine-Levin症候群
2. Korsakoff症候群
3. Lennox-Gastaut症候群
4. Rett症候群
5. 悪性症候群

問題.47

統合失調症の前駆期にみられるのはどれか。

1. 自生思考 2. 滅裂思考 3. 奇異な妄想 4. 感情の平板化 5. 緊張病症状候群

問題.48

複雑部分発作〈焦点意識減損発作〉を起こして自宅室内を徘徊しているてんかん患者に対して、まず行うのはどれか。

1. 救急搬送を要請する。
2. 室内に一人きりにする。
3. 周囲の危険物を取り除く。
4. 身体を押さえて保護する。
5. タオルを嚙ませる。

問題.49

自閉スペクトラム症〈自閉症スペクトラム障害〉児にみられる特徴はどれか。

1. 表情変化に乏しい。
2. 共感性が豊かである。
3. 図鑑を見るより物語を好む。
4. 想像力を必要とする遊びを好む。
5. 暗黙のルールの理解が良好である。

問題.50

注意欠如・多動症〈注意欠如・多動性障害〉に対する心理社会的治療で適切でないのはどれか。

1. 指示は1つずつ出す。
2. 視覚化した指示を出す。
3. 雑談しながら作業をさせる。
4. 軽微な症状が出ても許容する。
5. 好ましい行動をしたらすぐにほめる。

問題.51

骨代謝で正しいのはどれか。

1. 骨芽細胞が分化して骨細胞になる。
2. 破骨細胞は間葉系幹細胞に由来する。
3. 骨形成が優位になると骨粗鬆症になる。
4. 副甲状腺ホルモンは骨形成を促進する。
5. 骨に負荷がかかると骨吸収が促進される。

問題.52

関節と構造の組合せで正しいのはどれか。

1. 腕尺関節———らせん関節
2. 手根間関節———鞍関節
3. 肩甲上腕関節———楕円関節
4. 橈骨手根関節———平面関節
5. 母指手根中手関節——球関節

問題.53

味覚を支配する脳神経はどれか。2つ選べ。

1. 三叉神経
2. 舌咽神経
3. 迷走神経
4. 副神経
5. 舌下神経

問題.54

胃で正しいのはどれか。

1. 幽門には弁がある。
2. 胃底は噴門より下部にある。
3. 噴門は第1腰椎レベルにある。
4. 幽門は第11胸椎レベルにある。
5. 胃切痕は大彎の遠位1/3にある。

問題.55


平衡聴覚器で正しいのはどれか。

1. 蝸牛は内耳にある。
2. 内リンパと外リンパは交通している。
3. 耳管により内耳と咽頭は交通している。
4. 骨半規管は2つの半規管で構成される。
5. 鼓膜に付着している耳小骨はキヌタ骨である。

問題.56

母指を橈側外転させた右手を図に示す。

矢印の腱はどれか。2つ選べ。



1. 短母指外転筋
2. 短母指伸筋
3. 長橈側手根伸筋
4. 長母指外転筋
5. 長母指伸筋

問題.57

筋とその停止部の組合せで正しいのはどれか。

1. 肩甲挙筋———肩甲骨の肩甲切痕
2. 小円筋———上腕骨の大結節
3. 上腕筋———橈骨粗面
4. 半膜様筋———腓骨頭
5. 前脛骨筋———第2中足骨底

問題.58

皮質脊髓路に含まれるのはどれか。

1. 海馬
2. 視床
3. 大脳脚
4. 中心後回
5. 内包前脚

問題.59

内頸動脈の分枝はどれか。

1. 顎動脈
2. 眼動脈
3. 舌動脈
4. 顔面動脈
5. 椎骨動脈

問題.60

門脈に流入する血管はどれか。

1. 肝静脈
2. 奇静脈
3. 腎静脈
4. 脾静脈
5. 総腸骨静脈

問題.61

心筋で正しいのはどれか。

1. 平滑筋である。
2. 心筋線維は多核である。
3. ギャップ結合がみられる。
4. ATPは嫌気性呼吸で産生される。
5. 収縮は運動神経のインパルスによって起こる。

問題.62

筋紡錘の求心性線維はどれか。2つ選べ

1. Ia
2. Ib
3. II
4. III
5. IV

問題.63

体温で正しいのはどれか。

1. 体内の熱は呼気から放散される。
2. 熱産生は骨格筋に次いで心臓が大きい。
3. 激しい運動でも直腸温は40℃を超えない。
4. 腹腔には体温の変化を検出する受容器がない。
5. 体温が1℃上昇すると基礎代謝は約1%増える。

問題.64

嫌気性解糖で正しいのはどれか。

1. TCA回路が利用される。
2. ミトコンドリア内で行われる。
3. 供給エネルギーの持続時間は約15秒である。
4. グルコースはピルビン酸から乳酸に変換される。
5. グルコース1分子から4分子のATPが得られる。

問題.65

副交感神経の作用で分泌が促進されるのはどれか。2つ選べ。

1. 汗 腺
2. 涙 腺
3. 舌下腺
4. レニン
5. ノルアドレナリン

問題.66

アルカローシスをきたすのはどれか。

1. 嘔 吐
2. 飢 餓
3. 下 痢
4. 重症の喘息
5. CO₂ ナルコーシス

問題.67

体液性免疫で作動するのはどれか。

1. 単 球
2. B細胞
3. 好中球
4. NK細胞
5. マクロファージ

問題.68

排便中枢はどれか。

1. 第1～3胸髄
2. 第5～7胸髄
3. 第10～12胸髄
4. 第3～5腰髄
5. 第2～4仙髄

問題.69

肩甲骨の筋と運動の組み合わせで正しいのはどれか。

1. 僧帽筋上部線維——外転
2. 僧帽筋下部線維——上方回旋
3. 菱形筋————下制
4. 前鋸筋————下方回旋
5. 小胸筋————挙上

問題.70


膝関節で正しいのはどれか。

1. 関節面は内側顆より外側顆が広い。
2. 前十字靭帯は屈曲運動の制限となる。
3. 屈曲位から伸展すると下腿は内旋する。
4. 大腿骨と脛骨の長軸は一直線上にある。
5. 屈曲の最終可動域に近づくにつれ滑り運動となる。

問題.71

体幹の伸展運動を図に示す。

伸展を制動する靭帯はどれか。



1. 棘上靭帯
2. 棘間靭帯
3. 前縦靭帯
4. 後縦靭帯
5. 横突間靭帯

問題.72

努力性呼吸時に働く筋で誤っているのはどれか。

1. 腹直筋
2. 肋下筋
3. 外肋間筋
4. 内腹斜筋
5. 内肋間筋後部

問題.73

上肢の筋と運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 烏口腕筋————肩伸展
2. 上腕二頭筋————前腕回外
3. 上腕筋————肘伸展
4. 腕橈骨筋————肘伸展
5. 長橈側手根伸筋——前腕回内

問題.74

運動学習で正しいのはどれか。

1. 運動学習の過程には小脳が関与する。
2. 運動学習の初期段階で手続き記憶が得られる。
3. 覚醒レベルとパフォーマンス向上は比例関係である。
4. 課題に習熟するとフィードバック制御で運動が行われる。
5. 練習量と達成度の関係を示す学習曲線は逆U字型である。

問題.75

免疫反応で最初に産生されるのはどれか。

1. IgA 2. IgD 3. IgE 4. IgG 5. IgM

問題.76

過形成で正しいのはどれか。

1. 細胞数は一定である。
2. 急性刺激により生じる。
3. 細胞の容積は増大する。
4. 刺激がなくなれば停止する。
5. 臓器のサイズは一定である。

問題.77

リンパ浮腫への対応で正しいのはどれか。

1. 利尿薬で治療する。
2. 水分摂取を制限する。
3. 患肢の体毛を剃毛する。
4. 患肢の皮膚を保湿する。
5. 患肢を低い位置に保つ。

問題.78

アポトーシスで正しいのはどれか。

1. 核が融解する。
2. 細胞の大きさは膨化する。
3. 細胞死は散在性に認められる。
4. 受動的に生じる細胞死である。
5. 細胞内容物は細胞外へ放出される。

問題.79

無意識のなかに抑え込まれた欲動が精神症状として現れると想定し、その葛藤を明らかにすることによって症状の改善を目指すのはどれか。

1. 支持的精神療法
2. 精神分析療法
3. 認知行動療法
4. 森田療法
5. 来談者中心療法

問題.80

数字の順唱によって評価できる記憶で最も適切なのはどれか。

1. 遠隔記憶
2. 近時記憶
3. 作動記憶〈ワーキングメモリー〉
4. 即時記憶
5. 手続き記憶

問題.81

Eriksonの心理・社会的発達論で高齢者が克服すべきなのはどれか。

1. 統合
2. 自発性
3. 自律性
4. 同一性
5. 基本的信頼

問題.82

深部感覚障害で陽性となるのはどれか。

1. Barré徴候
2. Kernig徴候
3. Lasègue徴候
4. Romberg徴候
5. カーテン徴候

問題.83

小脳障害でみられる症候はどれか。2つ選べ。

1. 筋緊張低下
2. 静止時振戦
3. ジスメトリー
4. 深部感覚障害
5. 病的反射陽性

問題.84

嚥下機能で反回神経麻痺により障害される期はどれか。

1. 先行期
2. 準備期
3. 口腔期
4. 咽頭期
5. 食道期

問題.85

出生後、消失するのが最も遅いのはどれか。

1. 吸啜反射
2. Galant反射
3. 手掌把握反射
4. 足底把握反射
5. 交叉性伸展反射

問題.86

多発性硬化症で正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 遺伝性の疾患である。
3. 温熱療法が効果的である。
4. 末梢神経の脱髄疾患である。
5. MRI検査が診断に有用である。

問題.87

AEDによる電氣的除細動の適応となるのはどれか。2つ選べ。

1. 心静止
2. 心室細動
3. 心室頻拍
4. 洞性頻脈
5. 房室ブロック

問題.88

神経ブロックで正しいのはどれか。

1. 三叉神経痛の治療に硬膜外ブロックを行う。
2. 星状神経節ブロックの合併症に嚔声がある。
3. ボツリヌス毒素の作用部位は筋内神経である。
4. ボツリヌス毒素注射の効果持続期間は約3日である。
5. ボツリヌス毒素注射は Lambert-Eaton 症候群に適応がある。

問題.89

女性に有病率の高い疾患はどれか。

1. 関節リウマチ
2. 強直性脊椎炎
3. 大腿骨頭すべり症
4. 特発性大腿骨頭壊死
5. 腰椎椎間板ヘルニア

問題.90

腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

1. 小児期に多く発生する。
2. 膀胱直腸障害は生じない。
3. 人口の約15%が罹患する。
4. Myerson徴候は陽性である。
5. 脱出髄核は吸収されることがある。

問題.91

くも膜下出血の早期診断で優先度の高い検査はどれか。

1. 腰椎穿刺
2. 頭部CT検査
3. 頭部X線検査
4. 脳血管造影検査
5. 脳血流シンチグラフィ

問題.92

脳血管障害のうち、日本で2021年以降に発症数が最も多いのはどれか。

1. 脳梗塞
2. 脳出血
3. くも膜下出血
4. 脳静脈血栓症
5. 慢性硬膜下血腫

問題.93

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。

1. 遺伝性疾患である。
2. 女性に多く発症する。
3. 主に成人後に発症する。
4. 感染が発症の契機となる。
5. 平均寿命は約60歳である。

問題.94

尿毒症で正しいのはどれか。

1. 腎不全の初期にみられる。
2. 代謝性アシドーシスを示す。
3. 低カリウム血症を生じやすい。
4. 透析患者の死亡原因で最も多い。
5. 血清クレアチニン濃度は低下する。

問題.95

周術期の肺塞栓症で誤っているのはどれか。

1. 呼吸困難を生じる。
2. 突然死のリスクが高い。
3. 歩行開始時に発症しやすい。
4. 予防のため安静臥床とする。
5. 下肢の静脈血栓が原因となることが多い。

問題.96

自殺危険率の高いうつ病患者の特徴でないのはどれか。

1. 女性
2. 精神科入院歴
3. 自殺企図の既往
4. 不安障害の合併
5. 薬物依存の合併

問題.97

常染色体のトリソミーで引き起こされる疾患はどれか。

1. Down症候群
2. Klinefelter症候群
3. Turner症候群
4. von Recklinghausen病
5. フェニルケトン尿症

問題.98

統合失調症の陽性症状はどれか。2つ選べ。

1. 意欲減退
2. 会話の貧困
3. 幻 覚
4. 注意の障害
5. 思考の障害

問題.99

うつ病の症状はどれか。

1. 観念奔逸
2. 誇大妄想
3. 思考奪取
4. 思考途絶
5. 無価値感

問題.100

強迫症〈強迫性障害〉の症状で正しいのはどれか。

1. 強迫行為中の記憶は残らない。
2. 家族を巻き込むことは稀である。
3. 強迫観念は睡眠中も持続している。
4. 強迫行為を命令する幻聴に怯えている。
5. 強迫観念を不合理であると認識している。