

問題.1

Danielsらの徒手筋力テストを図に示す。
対象となる筋はどれか。



1. 棘上筋 2. 僧帽筋 3. 菱形筋 4. 肩甲下筋 5. 上腕三頭筋

問題.2

次の文により、2、3の問いに答えよ。
80歳の男性。間質性肺疾患の急性増悪で入院中。酸素化が不良で気管切開による人工呼吸管理を受けている。肺炎は認めないが血圧変動が大きい。
理学療法で最も適切なのはどれか。


1. 咳嗽練習
2. 歩行練習
3. 移乗動作練習
4. 関節可動域運動
5. 等尺性筋力増強運動

問題.3

80歳の男性。間質性肺疾患の急性増悪で入院中。酸素化が不良で気管切開による人工呼吸管理を受けている。肺炎は認めないが血圧変動が大きい。その後、人工呼吸器を離脱して気管切開孔を閉鎖したが、右肺に気胸を生じ、経鼻酸素療法中である。胸部エックス線写真を示す。

この時期の理学療法で最も適切なのはどれか。

No. 1 (P 問題3)



1. 状態が安定すれば離床を進める。
2. 呼吸理学療法手技で気胸側の胸郭を拡張させる。
3. 修正 Borgスケール 9以上の強度で運動療法を行う。
4. 呼吸筋力の低下に対して吸気筋トレーニングを行う。
5. 呼吸数／一回換気量 (f/TV)が 150以上であれば筋力増強運動を行う。

問題.4

50歳の男性。身長175cm、体重80kg。日常的な身体活動量を計測したところ、毎日5METs、30分間の歩行運動を実施していた。

この歩行運動の消費エネルギーはどれか。

1. 110kcal
2. 160kcal
3. 210kcal
4. 260kcal
5. 310kcal

問題.5

65歳の男性。脳出血による弛緩性右片麻痺で肩関節に2横指の亜脱臼がある。

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に従って右肩関節外転の関節可動域検査を行う際に正しいのはどれか。

1. 基本軸は体幹である。
2. 肘関節屈曲位で計測する。
3. 肩甲骨は動かないように固定する。
4. 90度以上の外転では前腕を回外させる。
5. 上肢の長軸方向に牽引を加えて測定する。

問題.6

6歳の男児。1年前から歩行時の転倒が頻回にみられるようになったため病院を受診し、遺伝子検査でDuchenne型筋ジストロフィーと診断された。四肢体幹筋は萎縮しており、MMTで両側下肢の近位筋が2、遠位筋が3である。屋内は四つ這いで移動し、小学校の普通学級に車椅子で通学している。

機能障害度（厚生省筋萎縮症研究班）のステージで正しいのはどれか。

1. ステージ 4
2. ステージ 5
3. ステージ 6
4. ステージ 7
5. ステージ 8

問題.7

22歳の男性。大学の野球部に所属している。右上肢の投球動作時の違和感を訴えて受診し、理学療法が開始された。

図に示す手法で伸長される筋はどれか。



1. 棘下筋
2. 棘上筋
3. 小門筋
4. 前鋸筋
5. 大円筋

問題.8


60歳の男性。交通事故による右足部の開放骨折のため入院した。1週後に右足部の腫脹、熱感が出現し、右中足骨の骨髓炎と診断され、右足間接離断術が施行された。

製作すべき義足はどれか。

1. PTB式下腿義足
2. TSB式下腿義足
3. 吸着式下腿義足
4. サイム義足
5. 足根中足義足

問題.9

32歳の男性。右上肢の筋力低下を訴えて受診し、理学療法が開始された。筋力を評価するために、右上肢を前方挙上して壁を押させた時の様子を図に示す。その結果、右肩甲骨の内側縁全体が胸郭から離れる現象が認められた。筋力低下が最も疑われる筋はどれか。



1. 棘下筋 2. 肩甲下筋 3. 広背筋 4. 前鋸筋 5. 大円筋

問題.10

65歳の女性。右利き。突然の意識障害で急性期病院に搬送され、脳出血と診断された。左上下肢の運動麻痺、感覚障害は中等度。端座位では体幹が麻痺側に傾くが、理学療法士の修正に抵抗することなく正中位に戻ることが可能である。常に非麻痺側を向いているが、麻痺側からの刺激にも反応する。食事や歯磨きは非麻痺側上肢で行うが、麻痺側の食べ残しや、磨き残しが多い。

この患者に用いる検査で最も優先順位が高いのはどれか。

1. WAB
2. WCST
3. 線分抹消試験
4. 道具を使用したパントマイム
5. SCP 〈Scale for Contraversive Pushing〉

問題.11

Parkinson病患者30名に対してリズムカルな運動を導入した。導入1週後の歩行速度の変化について、統計処理を実施したところ、有意差($p < 0.05$)を認めた。

選択した統計処理で適切なのはどれか。

なお、歩行速度のデータは正規分布を示す。

1. Paired-t検定
2. 一元配置分散分析
3. Kruskal-Wallis検定
4. Mann-WhitneyのU検定
5. Wilcoxonの符号順位検定

問題.12

70歳の女性。脳出血による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢IV、下肢IV。独居にて自宅で生活し、屋内は短下肢装具と杖を使用して歩行可能である。最近歩行時にふらつきが生じるなど転倒への不安が強まったことから、通所リハビリテーションを利用することとなった。

通所時の転倒リスク評価で適切なのはどれか。

1. TUG
2. NIHSS
3. UPDRS
4. modified Tardieu scale
5. Physiological cost index 〈PCI〉

問題.13

17歳の男子。2か月前の体育の授業中に左膝の痛み気付いたが、放置していた。最近は歩行時の左膝の痛みが出現したため病院を受診した。精査の結果、左大腿直筋の平滑筋肉腫と診断され、左大腿四頭筋の広範囲切除術が施行された。術後の左膝の関節可動域は屈曲120°、伸展-10°でMMTは屈曲4、伸展3であった。

最も適切な補装具はどれか。

1. 車椅子
2. PTB式免荷装具
3. 両側金属支柱付膝装具
4. 両側金属支柱付短下肢装具
5. 両側金属支柱付長下肢装具

問題.14

56歳の男性。身長165cm、体重45kg。肺癌の外来化学療法の治療中であったが、1週前から息苦しさがあり、呼吸困難が増悪したため緊急入院した。精査の結果、両肺の癌性胸膜炎と診断され、胸部単純CTで両側胸水を認めた。意識は清明。心拍数60/分、整。血圧102/78mmHg。呼吸数20/分。SpO₂95%(room air)。痰の喀出量が多く、頻回に努力性の咳嗽が出現し、安静時でも呼吸困難を訴えている。

理学療法の方針で適切なのはどれか。

1. 背臥位をとらせる。
2. 有酸素運動を行う。
3. 理学療法は中止する。
4. ハフティングを指導する。
5. 口すぼめ呼吸を指導する。

問題.15

64歳の男性。バイク走行中に転倒し、救命救急センターへ搬入された。救急外来到着時の頸椎単純CTを示す。頸椎脱臼骨折と診断され、同日手術が施行された。術後、四肢麻痺と肛門周囲の感覚脱失を認め、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B1完全麻痺の頸髄損傷と診断された。

目標として設定する動作で最も適切なのはどれか。

No. 2 (P 問題 15)



1. 起き上がり動作
2. 屋内平地での車椅子駆動
3. 電動車椅子を用いた移動
4. 側方アプローチの移乗動作
5. 床から車椅子への移乗動作

問題.16


70歳の男性。COVID-19による肺炎で入院し、マスクで酸素10L/分を投与している。PaO₂ 背臥位では60mmHgであったのに対して腹臥位では100mmHgに改善した。

PaO₂ の改善に最も大きく影響した要因はどれか。

1. 肺拡散能
2. 換気血流比
3. 解剖学的死腔
4. 肺動静脈奇形
5. 吸入気酸素濃度

問題.17

75歳の男性。右変形性股関節症で歩行時に疼痛の訴えがあった。歩行時床反力の垂直分力（両側）を図に示す。右大腿直筋が活動する期はどれか。2つ選べ。



1. ①
2. ②
3. ③
4. ④
5. ⑤


問題.18

55歳の男性。1か月前に急性心筋梗塞で入院し、経皮的冠動脈形成術を受けた。退院後に在宅において実施する全身持久力運動で正しいのはどれか。

1. 運動頻度は週 2回以内とする。
2. 1回10分以下の運動を勧める。
3. Borg指数11～13の運動を勧める。
4. 拡張期血圧120mmHgでは運動が可能である。
5. 運動強度は最高酸素摂取量の10～20%で実施する。

問題.19

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）を図に示す。
正しいのはどれか。



1. 肩甲骨挙上 2. 肩水平伸展 3. 股伸展 4. 膝屈曲 5. 足底屈（屈曲）

問題.20

75歳の女性。右大腿骨頸部骨折に対して人工骨頭置換術が施行され、入院中である。現在T字杖用いて50m以上歩行可能で、階段昇降は杖と手すりを使用して12段まで可能である。その他のADLはすべて自立している。
FIM運動項目の得点はどれか。

1. 83点 2. 85点 3. 87点 4. 89点 5. 91点

問題.21

ノーマライゼーションで正しいのはどれか。

1. 医学的モデルに基づいた概念である。
2. 日本からはじまった社会理念である。
3. 障害者が自己決定権を有することである。
4. 福祉サービスを利用せずに生活することである。
5. 身体機能の改善によって生活を正常化させることである。

問題.22

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。

1. T字杖 2. ウォーカーケイン 3. 車椅子 4. 特殊寝台 5. 移動用リフト

問題.23

ICFの分類で環境因子に含まれるのはどれか。

1. 移 動 2. 疾 患 3. 職 業 4. 制 度 5. 既往歴

問題.24

障害者自立支援法が障害者総合支援法になったことに伴い新たに支援対象として追加されたのはどれか。

1. 難 病 2. 身体障害 3. 精神障害 4. 知的障害 5. 高次脳機能障害

問題.25

6～12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1. I ―――― 階段で手すり使用
2. II ―――― 装具なしで歩行
3. III ―――― 不整地の歩行
4. IV ―――― 通常の椅子で座位保持
5. V ―――― 四つ這い移動可能

問題.26

我が国の65歳以上の高齢者における軽度認知障害〈MCI〉の有病率で適切なのはどれか。

1. 5% 2. 15% 3. 35% 4. 55% 5. 75%

問題.27

スワンネック変形で過伸展となるのはどれか。

1. 遠位指節間関節
2. 遠位橈尺関節
3. 近位指節間関節
4. 手根中手関節
5. 中手指節間関節

問題.28

基礎代謝量で正しいのはどれか。

1. 温上昇に伴い低くなる。
2. 慢性炎症性疾患では高くなる。
3. 除脂肪体重が少ないと高くなる。
4. 春期以降は加齢とともに高くなる。
5. 同一年齢では男性のほうが女性より低い。

問題.29

UPDRS〈Unified Parkinson's Disease Rating Scale〉Version3.0の運動能力検査の項目はどれか。

1. 嚥 下 2. 固 縮 3. 転 倒 4. 寝返り 5. 歩行中のすくみ

問題.30

Fugl-Meyer Assessmentで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 評価は4段階で行う。
2. 満点は226点である。
3. 感覚は痛覚を評価する。
4. 評価項目は4つである。
5. Brunnstrom法ステージと共通する評価項目がある。

問題.31

WeeFIMで正しいのはどれか。

1. できる活動を評価する。
2. 検査項目は15項目である。
3. 適応年齢は8歳以上である。
4. 介助の程度に応じて6段階で評価する。
5. 社会的交流として、遊びへの参加を評価する。

問題.32

認知症の中核症状はどれか。2つ選べ。

1. 失認
2. 徘徊
3. 妄想
4. 抑うつ
5. 見当識障害

問題.33

フレイルの判定要件はどれか。2つ選べ。

1. 骨密度の減少
2. 柔軟性の低下
3. 肺活量の低下
4. 歩行速度の低下
5. 身体活動量の減少

問題.34

Functional Reach Testで正しいのはどれか。

1. 歩行速度の簡易予測に用いる。
2. リーチ時に踵を浮かせてよい。
3. リーチ距離の水平成分を測定する。
4. 両上肢をそろえて前方にリーチさせる。
5. SPPB〈Short Physical Performance Battery〉検査の一部である。

問題.35

酸素療法機器で正しいのはどれか。

1. 鼻カニューラは高流量系である。
2. 高流量系機器は加湿不要である。
3. 医療ガスの酸素ボンベは緑色である。
4. ベンチュリマスクは低流量系である。
5. 在宅酸素療法では酸素濃縮器を用いる。

問題.36

口すぼめ呼吸の指導で正しいのはどれか。

1. 吸気を延長させる。
2. 呼吸数を増加させる。
3. COPD患者に適用する。
4. 機能的残気量を増加させる。
5. 頬を膨らませるように指導する

問題.37

MRC sum scoreで評価できるのはどれか。

1. ICU-AW
2. 意識障害
3. 嚥下障害
4. 入院関連能力低下[HAD 〈Hospitalization Associated Disability〉]
5. 抑うつ

問題.38

理学療法評価における社会的情報に該当しないのはどれか。

1. 趣味 2. 職業 3. 体重 4. 配偶者の有無 5. 家屋内の段差の有無

問題.39

血液検査項目と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1. CK-MB——末梢動脈疾患[PAD 〈peripheral artery disease〉]
2. Dダイマー——深部静脈血栓症<DVT>
3. eGFR——慢性閉塞性肺疾患 〈COPD〉
4. NT-proBNP——間質性肺疾患 〈ILD〉
5. SP-D——慢性心不全 〈CHF〉

問題.40

筋力増強運動で正しいのはどれか。

1. 高齢者では高負荷低頻度で実施するのがよい。
2. 運動の効果には対象者の運動経験は影響しない。
3. 等張性収縮には求心性収縮と遠心性収縮がある。
4. 筋力維持には最大筋力の40～50%以上の負荷が必要である。
5. 等速性収縮の角速度高速域での運動は筋出力効果が増大する。

問題.41

前十字靱帯損傷で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 単独損傷が8割以上である。
2. Lachman testが陽性となる。
3. 再建術は受傷後1年以降が推奨されている。
4. 受傷前レベルへのスポーツ復帰率は9割以上である。
5. ハムストリングスの収縮により損傷部位の緊張は低下する。

問題.42

日本で最初の理学療法士養成教育機関が開設された時期はどれか。

1. 1950年代
2. 1960年代
3. 1970年代
4. 1980年代
5. 1990年代

問題.43

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018に示されている集中リハビリテーションの転帰指標はどれか。

1. SARA
2. 筋力
3. 咳嗽力
4. 深部感覚
5. 関節可動域

問題.44

登はん性起立を示すのはどれか。

1. 筋強直性ジストロフィー
2. 肢帯型筋ジストロフィー
3. 先天型筋ジストロフィー
4. Duchenne型筋ジストロフィー
5. 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

問題.45

正常歩行周期で膝関節伸展モーメントが最も作用するのはどれか。

1. 初期接地
2. 荷重応答期
3. 立脚終期
4. 前遊脚期
5. 遊脚中期

問題.46

錐体外路に含まれないのはどれか。

1. 黒質
2. 視床下核
3. 錐体交叉
4. 線条体
5. 淡蒼球

問題.47

自律神経障害の症状はどれか。2つ選べ。

1. 振戦
2. 複視
3. 不整脈
4. 血圧低下
5. 視力低下

問題.48

小脳梗塞でみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 眼振
2. 球麻痺
3. 運動失調
4. 同名半盲
5. 遂行機能障害

問題.49

無作為化比較試験で正しいのはどれか。

1. 観察研究である。
2. 交絡因子の影響を小さくできる。
3. インフォームドコンセントは不要である。
4. 因子間の相互関係を調べるのが目的である。
5. 診療録に記載してある過去の記録で調査できる。

問題.50


三次予防にあたるのはどれか。

1. 高血圧患者の薬物療法
2. 高齢者の骨折予防指導
3. 乳癌のマンモグラフィ検診
4. 脳卒中患者の職場復帰支援
5. インフルエンザワクチンの接種

問題.51

左大腿中央部の横断面を図に示す。

aの筋はどれか。



1. 薄 筋
2. 縫工筋
3. 大内転筋
4. 短内転筋
5. 長内転筋

問題.52

関節唇を有するのはどれか。2つ選べ。

1. 肩関節
2. 肘関節
3. 股関節
4. 膝関節
5. 足関節

問題.53

運動神経線維のみの脳神経はどれか。

1. 動眼神経
2. 三叉神経
3. 顔面神経
4. 舌咽神経
5. 副神経

問題.54

尺骨神経の支配を受けるのはどれか。

1. 長母指屈筋
2. 母指内転筋
3. 第1虫様筋
4. 短母指外転筋
5. 短母指屈筋浅頭

問題.55

食道で正しいのはどれか。

1. 長さは約35cmである。
2. 甲状軟骨下縁から始まる。
3. 生理的狭窄部は4か所ある。
4. 左主気管支により圧迫される。
5. 下部の60%は横紋筋からなる。

問題.56

下垂体後葉から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。

1. グレリン
2. エストロゲン
3. オキシトシン
4. バソプレシン
5. アルドステロン

問題.57

視覚器で正しいのはどれか。

1. 杆体は色を感知する。
2. 網膜の黄斑には錐体が多い。
3. 角膜には神経は分布していない。
4. 網膜の中心窩は視野に盲点を生じる。
5. 硝子体は屈折率の変化により焦点距離を調整する。

問題.58

動脈とその触診部位の組合せで誤っているのはどれか。

1. 内頸動脈——鎖骨内側1/3
2. 上腕動脈——上腕二頭筋腱内側
3. 橈骨動脈——橈側手根屈筋腱外側
4. 大腿動脈——上前腸骨棘と恥骨結節を結ぶ中点
5. 足背動脈——長母指伸筋腱外側

問題.59

脊髄で運動神経の細胞体が主に存在する部位はどれか。

1. 後 角
2. 後 索
3. 前 角
4. 前 索
5. 側 索

問題.60

被殻の支配動脈を分枝するのはどれか。

1. 前大脳動脈
2. 中大脳動脈
3. 後大脳動脈
4. 脳底動脈
5. 椎骨動脈

問題.61

ATP産生に関わる細胞小器官はどれか。

1. 中心小体
2. Golgi装置
3. 滑面小胞体
4. リボソーム
5. ミトコンドリア

問題.62

タイプII筋線維と比較した場合のタイプI筋線維の特徴はどれか。

1. 発生張力が弱い。
2. 筋線維の径が太い。
3. 酸化酵素活性が低い。
4. ミオグロビン量が少ない。
5. ミトコンドリア密度が低い。

問題.63

自律神経で正しいのはどれか。

1. 節後線維は有髄線維である。
2. 随意的に内臓の機能を調節する。
3. 断続的に臓器へインパルスを発する。
4. 汗腺は交感神経と副交感神経の二重支配である。
5. 節前線維の末端からアセチルコリンが放出される。

問題.64

呼吸の調節機構で正しいのはどれか。

1. 呼吸中枢は視床下部にある。
2. 末梢の化学受容器は椎骨動脈にある。
3. 横隔膜や肋間筋は随意的に収縮できない。
4. 末梢の化学受容器は酸素分圧の上昇により興奮する。
5. 肺の伸展受容器の興奮は迷走神経を介して呼吸中枢に伝わる。

問題.65

心臓の刺激伝導系で正しいのはどれか。

1. 洞房結節は左心房にある。
2. 心筋細胞はK⁺の流入によって脱分極する。
3. 心電図のP波は心室の興奮に対応している。
4. 副交感神経が興奮すると心拍数は増加する。
5. 房室結節の興奮はHis束を経て心室に伝わる。

問題.66

血球と機能の組合せで正しいのはどれか。

1. 単 球 ———— 抗体産生
2. 顆粒球 ———— 酸素運搬
3. 血小板 ———— 止 血
4. 赤血球 ———— 細胞性免疫
5. リンパ球 ———— 細菌貪食

問題.67

胆汁で正しいのはどれか。

1. アルカリ性である。
2. 胆嚢で産生される。
3. 蛋白質を分解する。
4. リパーゼが含まれる。
5. 主に大腸で再吸収される。

問題.68

月経で誤っているのはどれか。

1. 分泌期は10日間である。
2. 月経血は非凝固性である。
3. 月経期は黄体の退縮により生じる。
4. エストロゲンは子宮内膜の再生に作用する。
5. プロゲステロンは子宮内膜の分泌活動に作用する。

問題.69

運動単位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 運動単位には求心性線維が含まれる。
2. 神経支配比が大きいほど精密な動きができる。
3. 活動電位の大きな運動単位が先に活動を始める。
4. 同じ運動単位に属する筋線維は同期して興奮する。
5. 運動ニューロンとそれに支配される筋線維群を運動単位という。

問題.70

肺気量分画のうちの2つを用いて肺胞換気量を算出する場合、使用するのはどれか。2つ選べ。

1. 残気量
2. 1回換気量
3. 死腔換気量
4. 予備吸気量
5. 予備呼気量

問題.71

頭頸部の屈曲と伸展の両方に作用する筋はどれか。

1. 前斜角筋
2. 前頭直筋
3. 頭板状筋
4. 胸鎖乳突筋
5. 脊柱起立筋

問題.72

健常者の股関節で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 鞍関節である。
2. 頸体角は120～130度である。
3. 恥骨大腿靱帯は伸展運動で緊張する。
4. 大腿骨の垂直軸に対する運動軸は約15度である。
5. 大腿骨頭の前方は寛骨臼に完全に被覆されている。

問題.73

立位姿勢が安定しているのはどれか。

1. 支持基底面が狭い。
2. 重心の位置が高い。
3. 重心線は膝関節中心の前方を通る。
4. 床と足底の接触面の摩擦抵抗が小さい。
5. 重心線の位置が支持基底面の中心から離れている。

問題.74

正常歩行で正しいのはどれか。

1. 立脚相の後半は抑制期である。
2. 重心は立脚中期で最も側方へ移動する。
3. 前額面において遊脚側の骨盤は上方傾斜する。
4. 歩行速度が速くなると遊脚相の比率は低下する。
5. 遊脚相で下肢が体幹の後方にある時期を減速期という。

問題.75

疾病発症の外因のうち、物理的要因はどれか。

1. 鉛
2. 喫煙
3. 紫外線
4. 肺炎球菌
5. アルコール

問題.76

急性炎症と比較した場合の慢性炎症の特徴はどれか。2つ選べ。

1. 血管の増殖
2. 好中球の集積
3. 組織の線維化
4. 血漿蛋白の浸出
5. 血管内皮細胞の損傷

問題.77

良性腫瘍と比較した場合の悪性腫瘍の特徴はどれか。

1. 核分裂が少ない。
2. 出血は稀である。
3. 発育速度が遅い。
4. 細胞の異型性が強い。
5. 周囲との境界が明瞭である。

問題.78

正しい組合せはどれか。

1. オペラント条件づけ———A.Beck
2. 自動思考———J.Kabat-Zinn
3. 社会生活技能訓練———R.Liberman
4. 動機づけ———I.Pavlov
5. マインドフルネス———W.Miller

問題.79

「明日朝9時に会議に出席する」と決めた。

翌朝になると会議の予定が思い出せるのはどれか。

1. 意味記憶
2. 作動記憶
3. 展望記憶
4. 手続き記憶
5. エピソード記憶

問題.80

Piaget発達論で0～2歳ころはどれか。

1. 感覚運動期
2. 具体的操作期
3. 形式的操作期
4. 潜在期
5. 前操作期

問題.81

投影法の人格検査はどれか。

1. MMPI
2. TAT
3. TEG
4. Y-G性格検査
5. 内田クレベリン精神検査

問題.82

取り組みが始まった時期の年代順でただしいのはどれか。

①国際障害者年②ノーマライゼーション③自立生活運動<IL運動>

1. ①→②→③
2. ①→③→②
3. ②→①→③
4. ②→③→①
5. ③→①→②

問題.83

長期間の安静臥床で増加するのはどれか。

1. 骨密度
2. 筋持久性
3. 腸管蠕動運動
4. 関節の結合組織
5. 最大酸素摂取量

問題.84

関節リウマチのSteinbrockerのステージIVの特徴はどれか。

1. 腱鞘炎
2. 関節強直
3. 骨粗鬆症
4. 軟骨下骨の破壊
5. 関節周囲の筋萎縮

問題.85

加齢で低下するのはどれか。

1. 骨塩量
2. 肺残気量
3. 自己抗体形成
4. 末梢血管抵抗
5. 炎症性サイトカイン

問題.86

末梢神経伝導検査が診断に有用なのはどれか。

1. Parkinson病
2. 手根管症候群
3. 多系統萎縮症
4. 筋ジストロフィー
5. 閉塞性動脈硬化症

問題.87

股関節屈曲拘縮を調べるのはどれか。

1. Allisテスト
2. McMurrayテスト
3. Patrickテスト
4. Simmondsテスト
5. Thomasテスト

問題.88

胃全摘出術後の悪性貧血に関与するのはどれか。

1. ビタミンB₁
2. ビタミンB₂
3. ビタミンB₁₂
4. ビタミンC
5. ビタミンD

問題.89

肘離断性骨軟骨炎で誤っているのはどれか。

1. 10～20代に多い。
2. 投球を伴うスポーツで多い。
3. 初期では保存療法が第一選択である。
4. 超音波画像は初期診断に有用である。
5. 学童期の野球選手の有病率は20～30%である。

問題.90

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。

1. 若年者に多い。
2. 予後不良である。
3. 感染性疾患である。
4. 結髪動作が困難になる。
5. 手術療法が優先される。

問題.91

Parkinson病の治療薬はどれか。

1. β 遮断薬
2. L-ドーパ
3. インスリン
4. カルシウム拮抗薬
5. ペニシリン系抗菌薬

問題.92

Guillain-Barré症候群の初期症状で特徴的なのはどれか。

1. 体重減少
2. 激しい関節痛
3. 突然の視覚喪失
4. 皮膚の色素沈着
5. 遠位中心の筋力低下

問題.93

高齢者にみられる病態のうち、低栄養と関連が少ないのはどれか。

1. 褥瘡 2. 貧血 3. サルコペニア 4. 変形性膝関節症 5. 大腿骨頸部骨折

問題.94

成人の熱傷で正しいのはどれか。

1. 化学損傷には洗浄は避ける。
2. 重症熱傷では蛋白質の異化は低下する。
3. 受傷後早期には創傷被覆材は使用しない。
4. II度20%の熱傷には初期輸液が行われる。
5. 広範囲熱傷の壊死組織に対して早期手術は行わない。

問題.95

高齢者の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1. 歩隔の減少
2. 歩幅の減少
3. 歩行率の増加
4. 遊脚期の延長
5. 両脚支持期の短縮

問題.1

80歳の女性。右変形性股関節症に対し人工関節全置換術を施行。1週間が経過し、歩行器での移動が可能となった。本症例にDanielsらの徒手筋力テストに基づき、左中殿筋の段階4の評価を行う。
適切な測定はどれか。

1. 側臥位を計測姿勢とする。
2. 右側の股関節は屈曲させる。
3. 骨盤が回旋しないように固定する。
4. 左下肢は外旋位とする。
5. 最大の抵抗を足関節から加え、姿勢を保持できる。

問題.2

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。
疑うべき疾患はどれか。

No. 1 (P 問題2)



1. Perthes病
2. 大腿骨頭壊死症
3. 大腿骨頭すべり症
4. 単純性股関節炎
5. 発育性股関節形成不全

問題.3

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。
この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

No. 1 (P 問題2)



1. 右股関節の内転位保持
2. 短下肢装具での立位練習
3. 対称的な座位バランス練習
4. 右側方からの起き上がり動作指導
5. 坐骨結節で負荷できる下肢装具での歩行練習

問題.4

70歳の女性。急性心筋梗塞で入院した。身長160cm。体重70kg。
安静時心拍数70/分。安静時血圧130/70mmHg。心臓超音波
検査にて低左心機能(LVEF<40%)が指摘されている。

Karvonen法($k=0.5$)を用いて計算した全身持久力運動の目標心拍数で正しいのはどれか。

1. 90/分 2. 100/分 3. 110/分 4. 120/分 5. 130/分

問題.5

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に従って図のように背臥位で右股関節の可動域を測定する。

正しいのはどれか。



1. 運動方向は内旋である。
2. 参考可動域は45度である。
3. 股関節が外旋しないようにする。
4. 基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ直線である。
5. 移動軸は上前腸骨棘と第二中足骨長軸を結ぶ線である。

問題.6

5歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺である。背臥位で図のような姿勢を示す。
影響しているのはどれか。



1. Moro反射
2. 陽性支持反射
3. 緊張性迷路反射
4. 対称性緊張性頸反射
5. 非対称性緊張性頸反射

問題.7


30歳の男性。右腱板損傷の修復術後6か月。図に示す方法で等張性筋力増強運動を行っている。
このトレーニングで対象となる筋はどれか。



1. 烏口腕筋 2. 棘下筋 3. 小胸筋 4. 前鋸筋 5. 大胸筋

問題.8

32歳の男性。交通事故で4週前に右大腿骨を図のように遠位部で切断した。今後、大腿義足を作製する。
切断側の身体計測で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 測定肢位は背臥位とする。
2. 断端最小前後径は大転子レベルで計測する。
3. 大腿長は坐骨結節から断端末までの距離である。
4. 大腿長は断端末の軟部組織を押し上げて計測する。
5. 切断肢側の力源となる実質的な長さを確認するために機能的断端長を測定する。

問題.9

20歳の男性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが右膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。
この検査の対象はどれか。
ただし、矢印は検査者が力を加えた方向を示す。



1. 前十字靱帯
2. 後十字靱帯
3. 内側側副靱帯
4. 外側側副靱帯
5. 内側半月板

問題.10

70歳の男性。食道癌術後に集中治療室に入室中。
積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1. RASS-3である。
2. 疼痛がNRS8である。
3. 心拍数120/分である。
4. 平均動脈圧80mmHgである。
5. SOFA〈Sequential Organ Failure Assessment〉scoreが前日より4点増加している。

問題.11

70歳の男性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅢ。歩行時にたびたびすくみ足や小刻み歩行からの突進を生じる。

この患者の歩行練習で適切なのはどれか。

1. 直線上を継ぎ足歩行する。
2. できるだけ歩行速度を上げる。
3. 簡単な計算をしながら歩行する。
4. 等間隔の線を踏みながら歩行する。
5. 足首に重錘バンドをつけて歩行する。

問題.12

58歳の男性。胸髄の脊髄腫瘍摘出術後、両下肢に明らかな運動麻痺、表在感覚障害はないが、深部感覚に重度鈍麻がみられた。開眼すると立位保持可能だが、閉眼するとふらついて倒れそうになる。また、歩行時にもふらつきがあり、踵打歩行が認められる。


運動療法で適切なのはどれか。

1. Buerer体操
2. Codman体操
3. Frenkel体操
4. Klapp体操
5. Williams体操

問題.13

15歳の女子。検診で体幹前屈による肋骨の突出を認め受診した。レントゲン検査で胸椎に30度のCobb角を認めた。処方された体幹装具を図に示す。

この装具の名称はどれか。



1. Halo装具
2. Jewett装具
3. Milwaukee装具
4. SOMI装具
5. Taylor型装具

問題.14

75歳の男性。間質性肺疾患で入院中。安静時も頻呼吸で、頸部の呼吸補助筋活動が亢進し、吸気時の胸骨上切痕および鎖骨上窩の陥凹を認める。

この患者に対する理学療法で最も適切なのはどれか。


1. 気道の吸引を行う。
2. 上肢の筋力増強運動を行う。
3. 腹部引き込み動作の練習を行う。
4. 徒手的な胸郭可動域の拡大運動を行う。
5. 負荷を加えて吸気筋トレーニングを行う。

問題.15

25歳の女性。1か月ほど前から熱いラーメンを吹いて冷ましていると右の手足に力が入らなくなる症状が数分続くことがあったが、その後回復したため様子を見ていた。数日前にも同様の症状があり、心配になり病院を受診した。既往歴に特記すべきことはない。脳血管造影検査の正面像および側面像を示す。

この患者で疑う疾患はどれか。

No. 2 (P 問題 15)



正面像



側面像

1. 脳 炎
2. 脳腫瘍
3. もやもや病
4. 硬膜動静脈瘻
5. アテローム性脳梗塞


問題.16

75歳の男性。糖尿病性腎症のため維持血液透析中。
この患者の運動耐容能を評価する検査はどれか。

1. CAVI
2. HOMA-R
3. HRV 〈Heart Rate Variability〉
4. 足関節上腕血圧比 〈ABI〉
5. 心肺運動負荷試験 〈CPX〉

問題.17

介護予防事業におけるスクリーニングテストを図に示す。
このテストで確認可能なのはどれか。



1. サルコペニア
2. ダイナペニア
3. ポストポリオ症候群
4. メタボリックシンドローム
5. ロコモティブシンドローム

問題.18

77歳の女性。自宅で転倒し救急車で搬入。右大腿骨頸部骨折に対し、人工骨頭置換術が施行された。術後の右股関節は背臥位で外旋位を呈していた。翌日に患者が右足の筋力低下を訴えたため、MMTを評価したところ右足関節背屈筋0であった。右足関節背屈筋力低下に対する物理療法で適切なものはどれか。

1. 温熱療法
2. 赤外線療法
3. 体外衝撃波療法
4. 超音波療法
5. 電気刺激療法

問題.19

62歳の男性。転倒し前額部を強打し、脊椎損傷と診断された。受傷後3日目のKey muscleのMMTは両側三角筋4、肘屈筋5、肘伸筋2、手関節背屈筋3、中指末節屈筋0、小指外転筋0、下肢筋0。両側乳頭部以下の触覚と痛覚は脱失。肛門の随意収縮と感覚は保たれていた。

この患者のASIA機能障害尺度[ASIA Impairment Scale 〈AIS〉]はどれか。

1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

問題.20

75歳の男性。体重75kg。慢性心不全。運動療法中の心電図を示す。Aは運動開始前、Bは自転車エルゴメーター30W負荷の運動療法中である。

正しいのはどれか。

No. 3

(P 問題 20)

A
25 mm/sec
1 mV=10 mm
血圧 96/60 mmHg



B
25 mm/sec
1 mV=10 mm
血圧 120/80 mmHg



1. Aでは陰性T波を認める。
2. Aの心拍数は60/分未満である。
3. AはLown分類Ⅲである。
4. BではSTの低下を認める。
5. Bの心拍数は120/分以上である。

問題.21

CBRマトリクスに含まれる項目はどれか。2つ選べ。

1. 教 育
2. 人生の質
3. パリアフリー
4. エンパワメント
5. ユニバーサルデザイン

問題.22

要介護者を対象としたケアプラン第1表に記載される項目はどれか。

1. 総合的な援助の方針
2. 生活全般の解決すべき課題〈ニーズ〉
3. 週間サービスの内容
4. サービス担当者会議の要点
5. 支援経過

問題.23

国際疾病分類はどれか。

1. ICD
2. ICF
3. ICF-CY
4. ICHI
5. ICIDH

問題.24

診療報酬は通常何年ごとに改定されるか。

1. 2年ごと
2. 3年ごと
3. 4年ごと
4. 5年ごと
5. 6年ごと

問題.25

短下肢装具で自立歩行が可能な二分脊椎児。

該当する機能残存レベルの上限はどれか。

1. L2
2. L3
3. L4
4. L5
5. S1

問題.26

褥瘡の危険因子でないのはどれか。

1. 低栄養
2. 血圧の上昇
3. 体動の減少
4. 局所的な圧迫
5. 骨の突出部位

問題.27

腰椎椎間板ヘルニアの疼痛誘発テストはどれか。

1. Adsonテスト
2. Bragardテスト
3. Eichhoffテスト
4. Thomsenテスト
5. Yergasonテスト

問題.28

関節可動域測定（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に基づく関節角度測定の運動方向と参考可動域角度の組合せで正しいのはどれか。

1. 頸部屈曲———80度
2. 胸腰部屈曲———45度
3. 肩伸展———30度
4. 股外転———25度
5. 足屈曲（底屈）——60度

問題.29

Parkinson病でみられるのはどれか。

1. 痙縮
2. 分回し歩行
3. 姿勢反射障害
4. 膝蓋腱反射亢進
5. Babinski反射陽性

問題.30

SF-36の下位尺度に含まれないのはどれか。

1. 活力
2. 栄養状態
3. 体の痛み
4. 社会生活機能
5. 全体的健康観

問題.31

Down症候群に特徴的な二次障害に含まれないのはどれか。2つ選べ。

1. 体幹の側弯
2. 股関節の脱臼
3. 足部の内反変形
4. 環軸関節の亜脱臼
5. 膝関節の屈曲拘縮

問題.32

アミロイドの沈着がみられるのはどれか。

1. Alzheimer病
2. Huntington病
3. Pick病
4. Wernicke脳症
5. 多発性硬化症

問題.33

原発性骨粗鬆症の診断基準に含まれる脆弱性骨折の部位はどれか。

1. 椎体
2. 上腕骨遠位部
3. 橈骨近位部
4. 大腿骨遠位部
5. 距骨

問題.34

運動軸が1つの関節はどれか。2つ選べ。

1. 顎関節
2. 距腿関節
3. 椎間関節
4. 腕橈関節
5. 下橈尺関節

問題.35

末梢動脈疾患で正しいのはどれか。

1. 女性に多い。
2. 足関節上腕血圧比が高い。
3. 間欠性跛行を呈することはない。
4. 閉塞性動脈硬化症の頻度が低い。
5. 下肢切断が必要になることがある。

問題.36

糖尿病患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1. インスリン抵抗性を改善する。
2. 血糖値に関わらず推奨される。
3. 尿中への糖の排泄を目的とする。
4. Borg指数で17程度が適している。
5. シックデイに関わらず推奨される。

問題.37

急性心筋梗塞の胸痛の特徴で正しいのはどれか。

1. 数分以内に消失する。
2. 冷汗を伴うことが多い。
3. 感冒様の前駆症状がある。
4. 放散痛は生じないことが多い。
5. 硝酸薬の投与で速やかに消失する。

問題.38

患者との面接時における開かれた質問はどれか。

1. 「右膝は痛みますか」
2. 「朝食を食べましたか」
3. 「退院後は何をしますか」
4. 「昨晚は熟睡できましたか」
5. 「椅子から立ち上がれますか」

問題.39

ステロイドの副作用で正しいのはどれか。

1. 筋固縮
2. 低血圧
3. 低血糖
4. 大腿骨頭壊死
5. 高カリウム血症

問題.40

正常成人の立位姿勢で持続的に活動している筋はどれか。

1. 腸腰筋
2. 大殿筋
3. 大腿四頭筋
4. 大腿二頭筋
5. ヒラメ筋

問題.41

大腿義足歩行の立脚中期で体幹の義足側への側屈がみられた。
原因はどれか。2つ選べ。

1. 体重荷重線が足部内側にある。
2. 義足が非切断肢よりも長すぎる。
3. ソケット初期内転角が大きすぎる。
4. ソケット外壁の高さが不足している。
5. 義足側股関節外転筋群に筋力低下がある。

問題.42

災害リハビリテーション支援で誤っているのはどれか。

1. 理学療法士は災害復興期から活動を開始する。
2. 被災者自身が廃用症候群を予防できるよう支援する。
3. 発災時に迅速な対応ができるように平時から対策する。
4. 災害規模によって数か月程度の長期的な支援が必要となる。
5. 支援統括組織に日本災害リハビリテーション支援協会[Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team 〈JRAT〉]がある。

問題.43

神経伝導検査でF波の潜時延長と出現率減少がみられる疾患はどれか。

1. Guillain-Barré症候群
2. Parkinson病
3. 重症筋無力症
4. 進行性核上性麻痺
5. 多系統萎縮症

問題.44

神経筋疾患と理学療法の組合せて正しいのはどれか。

1. Guillain-Barré症候群———Böhler体操
2. 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉——重錘を装着した歩行練習
3. ジストニア———筋電図バイオフィードバック
4. 重症筋無力症———漸増抵抗運動
5. 多発性硬化症———交代浴

問題.45

髄膜刺激徴候を誘発しやすい体位はどれか。

1. 側臥位
2. 端座位
3. 長座位
4. 背臥位
5. 腹臥位

問題.46

脳の領域と機能の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 角回—————情動
2. 縁上回—————空間的構成
3. Broca野—————聴覚
4. 前頭前野—————行動の抑制
5. Wernicke野—————運動のプログラミング

問題.47

顔面の皮膚感覚を支配する脳神経はどれか。

1. 第Ⅰ脳神経
2. 第Ⅱ脳神経
3. 第Ⅲ脳神経
4. 第Ⅳ脳神経
5. 第Ⅴ脳神経

問題.48

Wernicke-Mann肢位の特徴で正しい組合せはどれか。

1. 肩関節—————外転位
2. 肘関節—————伸展位
3. 手指—————伸展位
4. 膝関節—————伸展位
5. 足関節—————背屈位

問題.49

診療記録で正しいのはどれか。

1. 保存期間は1年間である。
2. SOAPのPはProblemである。
3. 紙媒体では鉛筆で記載してもよい。
4. 患者は自分の診療記録の開示を請求できる。
5. 時間がない場合は後日まとめて記載してよい。

問題.50

感染症対策で正しいのはどれか。

1. 使用後の手袋は裏返しにして捨てる。
2. 手袋使用後の手指消毒は不要である。
3. 感染症患者以外には標準予防策は不要である。
4. マスクなしで咳をするときは手掌で口を覆う。
5. 気感染予防のためには隔離室内の気圧を陽圧に設定する。

問題.51

骨代謝で正しいのはどれか。

1. 骨芽細胞が分化して骨細胞になる。
2. 破骨細胞は間葉系幹細胞に由来する。
3. 骨形成が優位になると骨粗鬆症になる。
4. 副甲状腺ホルモンは骨形成を促進する。
5. 骨に負荷がかかると骨吸収が促進される。

問題.52

関節と構造の組合せで正しいのはどれか。

1. 腕尺関節———らせん関節
2. 手根間関節———鞍関節
3. 肩甲上腕関節———楕円関節
4. 橈骨手根関節———平面関節
5. 母指手根中手関節——球関節

問題.53

味覚を支配する脳神経はどれか。2つ選べ。

1. 三叉神経
2. 舌咽神経
3. 迷走神経
4. 副神経
5. 舌下神経

問題.54

胃で正しいのはどれか。

1. 幽門には弁がある。
2. 胃底は噴門より下部にある。
3. 噴門は第1腰椎レベルにある。
4. 幽門は第11胸椎レベルにある。
5. 胃切痕は大彎の遠位1/3にある。


問題.55

平衡聴覚器で正しいのはどれか。

1. 蝸牛は内耳にある。
2. 内リンパと外リンパは交通している。
3. 耳管により内耳と咽頭は交通している。
4. 骨半規管は2つの半規管で構成される。
5. 鼓膜に付着している耳小骨はキヌタ骨である。

問題.56

母指を橈側外転させた右手を図に示す。
矢印の腱はどれか。2つ選べ。



1. 短母指外転筋
2. 短母指伸筋
3. 長橈側手根伸筋
4. 長母指外転筋
5. 長母指伸筋

問題.57

筋とその停止部の組合せで正しいのはどれか。

1. 肩甲挙筋———肩甲骨の肩甲切痕
2. 小円筋———上腕骨の大結節
3. 上腕筋———橈骨粗面
4. 半膜様筋———腓骨頭
5. 前脛骨筋———第2中足骨底

問題.58

皮質脊髓路に含まれるのはどれか。

1. 海馬
2. 視床
3. 大脳脚
4. 中心後回
5. 内包前脚

問題.59

内頸動脈の分枝はどれか。

1. 顎動脈
2. 眼動脈
3. 舌動脈
4. 顔面動脈
5. 椎骨動脈

問題.60

門脈に流入する血管はどれか。

1. 肝静脈
2. 奇静脈
3. 腎静脈
4. 脾静脈
5. 総腸骨静脈

問題.61

心筋で正しいのはどれか。

1. 平滑筋である。
2. 心筋線維は多核である。
3. ギャップ結合がみられる。
4. ATPは嫌気性呼吸で産生される。
5. 収縮は運動神経のインパルスによって起こる。

問題.62

筋紡錘の求心性線維はどれか。2つ選べ

1. Ia 2. Ib 3. II 4. III 5. IV

問題.63

体温で正しいのはどれか。

1. 体内の熱は呼気から放散される。
2. 熱産生は骨格筋に次いで心臓が大きい。
3. 激しい運動でも直腸温は40℃を超えない。
4. 腹腔には体温の変化を検出する受容器がない。
5. 体温が1℃上昇すると基礎代謝は約1%増える。

問題.64

嫌気性解糖で正しいのはどれか。

1. TCA回路が利用される。
2. ミトコンドリア内で行われる。
3. 供給エネルギーの持続時間は約15秒である。
4. グルコースはピルビン酸から乳酸に変換される。
5. グルコース1分子から4分子のATPが得られる。

問題.65

副交感神経の作用で分泌が促進されるのはどれか。2つ選べ。

1. 汗 腺 2. 涙 腺 3. 舌下腺 4. レニン 5. ノルアドレナリン

問題.66

アルカローシスをきたすのはどれか。

1. 嘔 吐 2. 飢 餓 3. 下 痢 4. 重症の喘息 5. CO₂ナルコーシス

問題.67

体液性免疫で作動するのはどれか。

1. 単 球 2. B細胞 3. 好中球 4. NK細胞 5. マクロファージ

問題.68

排便中枢はどれか。

1. 第1～3胸髄
2. 第5～7胸髄
3. 第10～12胸髄
4. 第3～5腰髄
5. 第2～4仙髄

問題.69

肩甲骨の筋と運動の組み合わせで正しいのはどれか。

1. 僧帽筋上部線維——外転
2. 僧帽筋下部線維——上方回旋
3. 菱形筋————下制
4. 前鋸筋————下方回旋
5. 小胸筋————拳上


問題.70

膝関節で正しいのはどれか。

1. 関節面は内側顆より外側顆が広い。
2. 前十字靭帯は屈曲運動の制限となる。
3. 屈曲位から伸展すると下腿は内旋する。
4. 大腿骨と脛骨の長軸は一直線上にある。
5. 屈曲の最終可動域に近づくにつれ滑り運動となる。

問題.71

体幹の伸展運動を図に示す。
伸展を制動する靭帯はどれか。



1. 棘上靭帯 2. 棘間靭帯 3. 前縦靭帯 4. 後縦靭帯 5. 横突間靭帯

問題.72

努力性呼気時に働く筋で誤っているのはどれか。

1. 腹直筋 2. 肋下筋 3. 外肋間筋 4. 内腹斜筋 5. 内肋間筋後部

問題.73

上肢の筋と運動の組合せで正しいのはどれか。

1. 烏口腕筋————肩伸展
2. 上腕二頭筋————前腕回外
3. 上腕筋————肘伸展
4. 腕橈骨筋————肘伸展
5. 長橈側手根伸筋——前腕回内

問題.74

運動学習で正しいのはどれか。

1. 運動学習の過程には小脳が関与する。
2. 運動学習の初期段階で手続き記憶が得られる。
3. 覚醒レベルとパフォーマンス向上は比例関係である。
4. 課題に習熟するとフィードバック制御で運動が行われる。
5. 練習量と達成度の関係を示す学習曲線は逆U字型である。

問題.75

免疫反応で最初に産生されるのはどれか。

1. IgA 2. IgD 3. IgE 4. IgG 5. IgM

問題.76

過形成で正しいのはどれか。

1. 細胞数は一定である。
2. 急性刺激により生じる。
3. 細胞の容積は増大する。
4. 刺激がなくなれば停止する。
5. 臓器のサイズは一定である。

問題.77

リンパ浮腫への対応で正しいのはどれか。

1. 利尿薬で治療する。
2. 水分摂取を制限する。
3. 患肢の体毛を剃毛する。
4. 患肢の皮膚を保湿する。
5. 患肢を低い位置に保つ。

問題.78

アポトーシスで正しいのはどれか。

1. 核が融解する。
2. 細胞の大きさは膨化する。
3. 細胞死は散在性に認められる。
4. 受動的に生じる細胞死である。
5. 細胞内容物は細胞外へ放出される。

問題.79

無意識のなかに抑え込まれた欲動が精神症状として現れると想定し、その葛藤を明らかにすることによって症状の改善を目指すのはどれか。

1. 支持的精神療法
2. 精神分析療法
3. 認知行動療法
4. 森田療法
5. 来談者中心療法

問題.80

数字の順唱によって評価できる記憶で最も適切なのはどれか。

1. 遠隔記憶
2. 近時記憶
3. 作動記憶〈ワーキングメモリー〉
4. 即時記憶
5. 手続き記憶

問題.81

Eriksonの心理・社会的発達論で高齢者が克服すべきなのはどれか。

1. 統合
2. 自発性
3. 自律性
4. 同一性
5. 基本的信頼

問題.82

深部感覚障害で陽性となるのはどれか。

1. Barré徴候
2. Kernig徴候
3. Lasègue徴候
4. Romberg徴候
5. カーテン徴候

問題.83

小脳障害でみられる症候はどれか。2つ選べ。

1. 筋緊張低下
2. 静止時振戦
3. ジスメトリー
4. 深部感覚障害
5. 病的反射陽性

問題.84

嚥下機能で反回神経麻痺により障害される期はどれか。

1. 先行期
2. 準備期
3. 口腔期
4. 咽頭期
5. 食道期

問題.85

出生後、消失するのが最も遅いのはどれか。

1. 吸啜反射
2. Galant反射
3. 手掌把握反射
4. 足底把握反射
5. 交叉性伸展反射

問題.86

多発性硬化症で正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 遺伝性の疾患である。
3. 温熱療法が効果的である。
4. 末梢神経の脱髄疾患である。
5. MRI検査が診断に有用である。

問題.87

AEDによる電氣的除細動の適応となるのはどれか。2つ選べ。

1. 心静止
2. 心室細動
3. 心室頻拍
4. 洞性頻脈
5. 房室ブロック

問題.88

神経ブロックで正しいのはどれか。

1. 三叉神経痛の治療に硬膜外ブロックを行う。
2. 星状神経節ブロックの合併症に嚔声がある。
3. ボツリヌス毒素の作用部位は筋内神経である。
4. ボツリヌス毒素注射の効果持続期間は約3日である。
5. ボツリヌス毒素注射は Lambert-Eaton 症候群に適応がある。

問題.89

女性に有病率の高い疾患はどれか。

1. 関節リウマチ
2. 強直性脊椎炎
3. 大腿骨頭すべり症
4. 特発性大腿骨頭壊死
5. 腰椎椎間板ヘルニア

問題.90

腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

1. 小児期に多く発生する。
2. 膀胱直腸障害は生じない。
3. 人口の約15%が罹患する。
4. Myerson 徴候は陽性である。
5. 脱出髄核は吸収されることがある。

問題.91

くも膜下出血の早期診断で優先度の高い検査はどれか。

1. 腰椎穿刺
2. 頭部CT検査
3. 頭部X線検査
4. 脳血管造影検査
5. 脳血流シンチグラフィ

問題.92

脳血管障害のうち、日本で2021年以降に発症数が最も多いのはどれか。

1. 脳梗塞
2. 脳出血
3. くも膜下出血
4. 脳静脈血栓症
5. 慢性硬膜下血腫

問題.93

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。

1. 遺伝性疾患である。
2. 女性に多く発症する。
3. 主に成人後に発症する。
4. 感染が発症の契機となる。
5. 平均寿命は約60歳である。

問題.94

尿毒症で正しいのはどれか。

1. 腎不全の初期にみられる。
2. 代謝性アシドーシスを示す。
3. 低カリウム血症を生じやすい。
4. 透析患者の死亡原因で最も多い。
5. 血清クレアチニン濃度は低下する。

問題.95

周術期の肺塞栓症で誤っているのはどれか。

1. 呼吸困難を生じる。
2. 突然死のリスクが高い。
3. 歩行開始時に発症しやすい。
4. 予防のため安静臥床とする。
5. 下肢の静脈血栓が原因となることが多い。

問題.96

自殺危険率の高いうつ病患者の特徴でないのはどれか。

1. 女性
2. 精神科入院歴
3. 自殺企図の既往
4. 不安障害の合併
5. 薬物依存の合併

問題.97

常染色体のトリソミーで引き起こされる疾患はどれか。

1. Down症候群
2. Klinefelter症候群
3. Turner症候群
4. von Recklinghausen病
5. フェニルケトン尿症

問題.98

統合失調症の陽性症状はどれか。2つ選べ。

1. 意欲減退 2. 会話の貧困 3. 幻 覚 4. 注意の障害 5. 思考の障害

問題.99

うつ病の症状はどれか。

1. 観念奔逸 2. 誇大妄想 3. 思考奪取 4. 思考途絶 5. 無価値感

問題.100

強迫症〈強迫性障害〉の症状で正しいのはどれか。

1. 強迫行為中の記憶は残らない。
2. 家族を巻き込むことは稀である。
3. 強迫観念は睡眠中も持続している。
4. 強迫行為を命令する幻聴に怯えている。
5. 強迫観念を不合理であると認識している。

問題.96

アルコール離脱症状の後遺症はどれか。

1. Kleine-Levin症候群
2. Korsakoff症候群
3. Lennox-Gastaut症候群
4. Rett症候群
5. 悪性症候群

問題.97

統合失調症の前駆期にみられるのはどれか。

1. 自生思考
2. 滅裂思考
3. 奇異な妄想
4. 感情の平板化
5. 緊張病症候群

問題.98

複雑部分発作〈焦点意識減損発作〉を起こして自宅室内を徘徊しているてんかん患者に対して、まず行うのはどれか。

1. 救急搬送を要請する。
2. 室内に一人きりにする。
3. 周囲の危険物を取り除く。
4. 身体を押さえて保護する。
5. タオルを嚙ませる。

問題.99

自閉スペクトラム症〈自閉症スペクトラム障害〉児にみられる特徴はどれか。

1. 表情変化に乏しい。
2. 共感性が豊かである。
3. 図鑑を見るより物語を好む。
4. 想像力を必要とする遊びを好む。
5. 暗黙のルールの理解が良好である。

問題.100

注意欠如・多動症〈注意欠如・多動性障害〉に対する心理社会的治療で適切でないのはどれか。

1. 指示は1つずつ出す。
2. 視覚化した指示を出す。
3. 雑談しながら作業をさせる。
4. 軽微な症状が出ても許容する。
5. 好ましい行動をしたらすぐにほめる。