19　中心的単純代数

§19 の設定

- F, K : 体.
- A : 有限次元 F 代数.
- D : 有限次元可除 F 代数

注意 19.1. 本節では F 代数は**有限次元**であるとする．また以下の略称を使うことがある．

- SA: 単純代数 (simple algebra)
- CSA: 中心的単純代数 (central simple algebra)
- SSA: 半単純代数 (semisimple algebra)
- DA: 可除代数 (division algebra)
- CDA: 中心的可除代数 (central division algebra)

この節では前節で見た単純代数に，さらに中心的であるという条件を加えた中心的単純代数について観察していく．まず基本的な概念を定める．

定義 19.2. 中心的単純代数

(1)（有限次元とは限らない）F 代数 A と部分集合 $B \subseteq A$ に対して

$$\mathrm{Z}_A(B) = \{a \in A \mid \forall b \in B, ab = ba\}$$

を A での B の中心化代数という．これは部分代数となる．

(2) $\mathrm{Z}(A) = \mathrm{Z}_A(A)$ を A の中心という．

(3)（有限次元とは限らない）F 代数 A について $\mathrm{Z}(A) = F$ であるとき，A は中心的であるという．

まず中心の性質を見ていこう．

命題 19.3. 中心の性質

F 代数 A, A_λ について，以下が成り立つ．

(1) $\mathrm{Z}\left(\bigoplus_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right) = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda} \mathrm{Z}(A_\lambda)$.

(2) $\mathrm{Z}\left(\mathrm{M}_r(A)\right) = \mathrm{Z}(A)I_r$.

(3) D が可除環のとき $\mathrm{Z}(D)$ は体である．

(4) $\mathrm{Z}(A)$ は F 代数である．

(5) A が単純代数なら $\mathrm{Z}(A)$ は F の有限次拡大体である．

(6) A が半単純代数なら $\mathrm{Z}(A)$ は有限個の F の有限次拡大体の直和である．

(7) 半単純代数 A について $\mathrm{Z}(A)$ が体なら A は単純である．

証明. (1)-(4) 簡単に示される．

(5) 定理**??**と (2),(3) よりしたがう．
(6)(7) 定理**??**と (1),(5) よりしたがう． □

これから中心的単純代数の具体的な形がわかる．

命題 19.4. 中心的単純代数の構造

単純 F 代数 A について，A が中心的であることと，A が可除部分が中心的可除 F 代数であることは同値である．つまり中心的単純 F 代数は D を可除 F 代数，$r \in \mathbb{N}$ として $\mathrm{M}_r(D)$ と同型である．

証明. 命題 19.3(2) からしたがう． □

19.1　代数のテンソル積

詳しく中心的単純代数を調べるにあたってテンソル積を用いるため，まずテンソル積について代数がどう振る舞うかを見ていく．まず代数のテンソル積を定める．

定義 19.5. F **代数のテンソル積**

（有限次元とは限らない）F 代数 A, B に対して,F ベクトル空間としてのテンソル積 $A \otimes_F B$ に積を

$$(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2$$

が第一，二引数に対して F 線形になるように拡張して定める．これは well-defined であり，この積により $A \otimes B$ は F 代数となる．

証明. 積の well-definedness を示す．双線型写像 $\Phi : (A \otimes_F B) \times (A \otimes_F B) \to A \otimes_F B$ であって

$$\Phi(a_1 \otimes b_1, a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2$$

なるものの存在を示せば良い．$a_2 \in A, b_2 \in B$ を任意にとる．テンソル積の普遍性より，双線型写像

$$A \times B \ni (a_1, b_1) \mapsto a_1 a_2 \otimes b_1 b_2 \in A \otimes_F B$$

から誘導される線型写像を $\Psi_{a_2, b_2} \in \mathrm{Hom}_F(A \otimes_F B, A \otimes_F B)$ とする．これにより

$$\Psi : A \times B \to \mathrm{Hom}_F(A \otimes_F B, A \otimes_F B)$$

が定めるが，これは双線型写像である．よって Ψ が誘導する線型写像

$$\Phi' : A \otimes_F B \to \mathrm{Hom}_F(A \otimes_F B, A \otimes_F B)$$

が定まる．これが誘導する写像

$$\Phi : (A \otimes_F B) \times (A \otimes_F B) \ni (x, y) \to \Phi'(y)(x) \in A \otimes_F B$$

は双線型写像であり $\Phi(a_1 \otimes b_1, a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2$ を満たす． □

$A \otimes B$ について，性質を簡単に復習する．

命題 19.6. テンソル積の性質

A, B を F 代数とする．

(1) $\{e_1, \ldots, e_m\}$ を A の基底，$\{f_1, \ldots, f_n\}$ を B の基底とすると，

$$\{e_i \otimes f_j \mid i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n\}$$

は $A \otimes B$ の基底である．特に $[A \otimes_F B : F] = [A : F][B : F]$ である．

(2)

$$A \ni a \mapsto a \otimes 1_B \in A \otimes_F B, \quad B \ni b \mapsto 1_A \otimes b \in A \otimes_F B$$

は単射である．これを通じて $A, B \subseteq A \otimes_F B$ とみなす．

(3) 任意の $a \in A, b \in B$ について，$ab = ba$ である．

(4) $A \otimes_F B = \{\sum_{i=1}^n a_i \otimes b_i \mid a_i \in A, b_i \in B\} = AB$

これらの性質を使って逆に代数をテンソル積として実現できる．

命題 19.7. テンソル積への分解

F 代数 C とその部分代数 A, B に対して以下が成立しているとする．

(1) 任意の $a \in A, b \in B$ に対して $ab = ba$.

(2) $C = AB$.

(3) $[C : F] = [A : F][B : F]$.

このとき $C \cong A \otimes_F B$ である．

証明. $A \times B \ni (a, b) \mapsto ab \in C$ は双線型ゆえ線型写像 $\varphi : A \otimes_F B \ni a \otimes b \mapsto ab \in C$ を誘導する．(2) より φ は全射であるので (3) より F ベクトル空間の同型写像である．また (1) より

$$\begin{aligned}\varphi((a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2)) &= \varphi(a_1 a_2 \otimes b_1 b_2) \\ &= a_1 a_2 b_1 b_2 \\ &= a_1 b_1 a_2 b_2 \\ &= \varphi(a_1 \otimes b_1)\varphi(a_2 \otimes b_2)\end{aligned}$$

であり積も保つ．よって $A \otimes_F B \cong C$ である．　□

この命題を使ってテンソル積の具体例を見よう．

例 19.8. $\mathrm{M}_r(A)$ とその部分代数 $\mathrm{M}_r(F), AI_r$ について考えると，命題 19.7 より，$\mathrm{M}_r(A) \cong \mathrm{M}_r(F) \otimes_F A$ である．さらにこれより F 代数 A, B に対して

$$\mathrm{M}_r(A) \otimes_F B \cong \mathrm{M}_r(F) \otimes_F A \otimes_F B \cong \mathrm{M}_r(A \otimes_F B)$$

である．

例 19.9. $\mathrm{M}_{rs}(F)$ の部分代数 A, B を以下で定める．

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x_{11}I_s & \cdots & x_{1r}I_s \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{r1}I_s & \cdots & x_{rr}I_s \end{pmatrix} \middle| \, (x_{ij})_{ij} \in \mathrm{M}_r(F) \right\}, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} Y & \cdots & Y \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Y & \cdots & Y \end{pmatrix} \middle| \, Y \in \mathrm{M}_s(F) \right\}.$$

$A \cong \mathrm{M}_r(F), B \cong \mathrm{M}_s(F)$ である．命題 19.7 より $\mathrm{M}_{rs}(F) \cong \mathrm{M}_r(\mathrm{M}_s(F)) \cong \mathrm{M}_r(F) \otimes_F \mathrm{M}_s(F)$ である．なおこれにより $\mathrm{M}_r(F), \mathrm{M}_s(F) \subseteq \mathrm{M}_{rs}(F)$ とみなしたときの $X = (x_{ij}) \in \mathrm{M}_r(F)$ と $Y \in \mathrm{M}_s(F)$ の積

$$XY = \begin{pmatrix} x_{11}Y & \cdots & x_{1r}Y \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{r1}Y & \cdots & x_{rr}Y \end{pmatrix}$$

はクロネッカー積と呼ばれる．

命題 19.10. 両側代数としてのテンソル積

K, L を体とする．K 代数かつ L 代数であり，K と L の作用が可換であるような代数を (K, L) 両側代数と呼ぶことにする．A を K 代数，B を (K, L) 両側代数，C を L 代数とする．

(1) $A \otimes_K B$ は (K, L) 両側代数である．
(2) $B \otimes_L C$ は (K, L) 両側代数である．
(3) (K, L) 両側代数として（つまり K 代数としても L 代数としても）以下が成り立つ．

$$(A \otimes_K B) \otimes_L C \cong A \otimes_K (B \otimes_L C)$$

証明. (1) $A \otimes_K B$ は K 代数であり，$l \in L$ の作用を $1_A \otimes l$ の積で定めると，これは L 代数となる．また K と L の作用は可換である．

(2) (1) と同様に示される．

(3) $c \in C$ を固定する．

$$A \times B \ni (a, b) \mapsto a \otimes (b \otimes c) \in A \otimes_K (B \otimes_L C)$$

は K 双線型ゆえ，K 線型写像 $\varphi_c : A \otimes_K B \to A \otimes_K (B \otimes_L C)$ を誘導する．これは

$$\varphi : (A \otimes_K B) \times C \ni (x, c) \mapsto \varphi_c(x) \in A \otimes_K (B \otimes_L C)$$

を導くがこれは L 双線型である．したがって L 線型写像 $\Phi : (A \otimes_K B) \otimes_L C \to A \otimes_K (B \otimes_L C)$ を誘導する．これは K 線型でもある．逆写像も同様にして得られるため，これは同型である．

□

テンソル積により代数の係数体を拡大できる．

命題 19.11. 係数拡大

A を F 代数，K を F の拡大体（共に有限次とは限らない）とする．$A \otimes_F K$ は K 代数となる，これを F から K への A の係数拡大と呼び A_K と書く．

テンソル積について性質を見ていこう．

補題 19.12. テンソル積と中心

（有限次元とは限らない）F 代数 A, B, 拡大体 K に対して以下が成立する．

(1) $\mathrm{Z}(A \otimes_F B) = \mathrm{Z}(A) \otimes_F \mathrm{Z}(B)$
(2) $\mathrm{Z}(A_K) = \mathrm{Z}(A)_K$

証明. (1) ($\supseteq$) 明らか．($\subseteq$)$\{x_i\}$ を A の基底とする．$z = \sum_{i=1}^n x_i \otimes b_i \in A \otimes_F B$ をとる．$z \in \mathrm{Z}(A \otimes_F B)$ ならば $1_A \otimes u$ との可換性より $b_i \in \mathrm{Z}(B)$ ゆえ $\mathrm{Z}(A \otimes_F B) \subseteq A \otimes_F \mathrm{Z}(B)$．$\{y_i\}$ を $\mathrm{Z}(B)$ の基底とする．$w = \sum_i^n a_i \otimes y_i \in A \otimes \mathrm{Z}(B)$ をとる．$w \in \mathrm{Z}(A \otimes_F B)$ ならば $v \otimes 1_B$ との可換性より $a_i \in \mathrm{Z}(A)$．したがって $\mathrm{Z}(A \otimes_F B) \subseteq \mathrm{Z}(A) \otimes_F \mathrm{Z}(B)$．

(2) (1) よりしたがう．

□

19.2　中心的単純代数の性質その 1

では中心的単純代数の性質を調べていこう．

補題 19.13.CSA とのテンソル積の両側イデアル

B を中心的単純 F 代数，A を F 代数（共に有限次元とは限らない）とする．このとき

$$(A \otimes_F B \text{ の両側イデアル全体}) = \{I \otimes B \mid I \text{ は } A \text{ の両側イデアル}\}$$

である．

証明. ($\supseteq$) 明らか．
($\subseteq$)$A \otimes_F B$ の両側イデアル $J \neq 0$ をとる．$I = J \cap A$ とおく．I は A の両側イデアルであり $J \supseteq I \otimes B$ である．$I = A$ なら証明は終了している．$I \neq A$ のときに $J \setminus I \otimes B = \varnothing$ を背理法で示す．
I の基底 $\{x_\nu\}_{\nu \in N}$ を延長して A の基底 $\{x_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ をとる．$\Lambda = M \sqcup N$ とおく．$N \neq \varnothing$ である．ある $z \in J \setminus I \otimes B$ を構成し $z \in I$ を示すことで矛盾させる．$I \otimes B$ の元で調整することで，$w \in J \setminus I \otimes B$ を $w = \sum_{\nu \in N} x_\nu b_\nu$ となるようにとれる．$N_w = \{\nu \in N \mid b_\nu \neq 0\}$ は有限集合ゆえ，$\#N_w$ が最小になるように w をとれる．$\kappa \in N$ をとる．

$$B_\kappa = \left\{ c_\kappa \in B \;\middle|\; \sum_{\nu \in N_w} x_\nu c_\nu \in J \right\}$$

とおくと，B_κ は B の両側イデアルであり B が単純ゆえ $B_\kappa = B$．よって

$$z = \sum_{\nu \in N_w} x_\nu c_\nu \quad (c_\kappa = 1)$$

なる $z \in J \setminus I \otimes B$ をとれる．任意の $d \in B$ について

$$dz - zd = \sum_{\nu \in N_w} x_\nu (dc_\nu - c_\nu d)$$

であり x_κ の係数は 0．$\#N_w$ の最小性から $dz - zd = 0$，すなわち任意の $\nu \in N_w$ で $dc_\nu = c_\nu d$．$d \in B$ は任意だったので $c_\nu \in \mathrm{Z}(B) = F$．よって $z \in I$ であるがこれは矛盾である．□

中心的単純代数はテンソル積について良い振る舞いをする．

定理 19.14.CSA とのテンソル積は SA,SSA,CSA を保存

中心的単純 F 代数 B に対して以下が成り立つ．

(1)（有限次元とは限らない）A が単純代数なら $A \otimes_F B$ は単純代数．
(2) A が半単純代数なら $A \otimes_F B$ は半単純代数．
(3)（有限次元とは限らない）A が中心的単純 F 代数なら $A \otimes_F B$ は中心的単純 F 代数．

証明． (1) 補題 19.13 よりしたがう．

(2) 定理**??**より，単純代数 A_i が存在して $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_s$ となる．$A \otimes_F B \cong (A \otimes_F B) \oplus \cdots \oplus (A_s \otimes_F B)$ であることと (1) よりしたがう．

(3) (1) と補題 19.12 よりしたがう．

□

定理 19.15. 係数拡大による CSA 判定

(1) B を F 代数，K を F の拡大体（共に有限次元とは限らない）とする．このとき

$$B \text{ が中心的単純 } F \text{ 代数} \iff B_K \text{が中心的単純 } K \text{ 代数}$$

が成り立つ．

(2) $\overline{F}$ を F の代数閉包とする．このとき

$$A \text{ が中心的単純 } F \text{ 代数である} \iff A \otimes_F \overline{F} \cong \mathrm{M}_n(\overline{F}) \quad (n \in \mathbb{N})$$

が成り立つ．

証明． (1) 補題 19.12(2) より $\mathrm{Z}(B) = F \iff \mathrm{Z}(B_K) = K$ である．よって単純性について示せばよい．

$\underline{\Longrightarrow}$ 定理 19.14(1) よりしたがう．

$\underline{\Longleftarrow}$ I を B の両側イデアルとする．$I \otimes K$ は B_K の両側イデアルゆえ，$I \otimes K = 0, B_K$ である．よって $I = 0, B$ であり，B は単純である．

(2) (1) と定理**??**からしたがう．

□

定理 19.16.CSA の次元は平方数

中心的単純 F 代数 A とその可除部分について $[A : F], [D : F]$ は平方数である．$\sqrt{[A : F]}$ を A の次数，$\sqrt{[D : F]}$ を A の指数という．

証明. 定理 19.15(2) より $[A : F]$ が平方数であることがしたがう．A の容量を r とすると $A \cong \mathrm{M}_r(D)$ より $[A : F] = [D : F]r^2$ であるため $[D : F]$ も平方数である． □

19.3　反転代数

さらに中心的単純代数の性質を調べていくために反転代数を導入しよう．行列の転置や，次章で扱うハミルトンの四元数代数の共役は，加法やスカラー倍は保存するが

$$ {}^{\mathrm{t}}(AB) = {}^{\mathrm{t}}B\,{}^{\mathrm{t}}A, \quad \overline{xy} = \overline{y}\,\overline{x} $$

と積は入れ替えてしまう．反転代数はこのような写像を扱う概念である．今回は加群の右と左を入れ替えるために反転代数を用いる．

定義 19.17. 反転代数

(1) A, B を環とする．$\alpha : A \to B$ が加法と 1 を保ち，任意の $x, y \in A$ に対して

$$ (xy)^\alpha = y^\alpha x^\alpha $$

が成り立つとき，α は反準同型であるという．

(2) 反準同型 $\alpha : A \to B$ が反準同型であるような逆写像 α^{-1} を持つとき，反同型であるという．特に $A = B$ であり $\alpha^2 = 1$ であるような反同型を対合という．

(3) F 代数の間の写像が，環の間の写像として反準同型，反同型であり F 線形であるとき，F 反準同型，F 反同型，または単に反準同型，反同型という．

(4) 環 $(A, 1, +, \cdot)$ に対して，$(A, 1, +, \cdot_{\mathrm{op}})$ を

$$ x \cdot_{\mathrm{op}} y = x \cdot y $$

で定めると環となる．これを A の反転環といい，A^{op} で表す．また反同型 $A \ni x \mapsto x \in A^{\mathrm{op}}$ を op_A，または単に op とかく．

(5) F 代数 A の反転環 A^{op} は F 代数となる．これを反転代数と呼ぶ．op は F 反同型である．

例 19.18. $\mathrm{M}_r(F) \ni x \mapsto {}^{\mathrm{t}}x \in \mathrm{M}_r(F)$ は反同型である．

命題 19.19. 反転代数の普遍性

(1) 反準同型二つの合成は準同型である．

(2) 反同型二つの合成は同型である．

(3) 任意の反準同型 $\varphi : A \to B$ に対して $\psi : A^{\mathrm{op}} \to B$ が一意的に存在し $\psi \circ \mathrm{op} = \varphi$ が成り立つ．

$$ \begin{tikzcd} A \arrow[r, "\forall\varphi"] \arrow[d, "\mathrm{op}"'] & B \\ A^{\mathrm{op}} \arrow[ur, dashed, "\exists!\psi"'] & \end{tikzcd} $$

命題 19.20. 自己準同型の反転

A, B を環または F 代数とし

$$F : \mathrm{Hom}(A, B) \ni \alpha \mapsto \mathrm{op}_B \circ \alpha \circ \mathrm{op}_{A^{\mathrm{op}}} \in \mathrm{Hom}(A^{\mathrm{op}}, B^{\mathrm{op}})$$

とおく．

(1) F は全単射であるである．
(2) $A = B$ のとき，$F : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A^{\mathrm{op}})$ は同型である．

証明. (1) まず well-defined 性を示す．$\alpha \in \mathrm{Hom}(A, B), x, y \in A$ に対して

$$\begin{aligned} F(\alpha)(x^{\mathrm{op}} y^{\mathrm{op}}) &= \mathrm{op}(\alpha(\mathrm{op}((yx)^{\mathrm{op}}))) \\ &= \mathrm{op}(\alpha(yx)) \\ &= \mathrm{op}(\alpha(y)\alpha(x)) \\ &= \alpha(x)^{\mathrm{op}} \alpha(y)^{\mathrm{op}} \\ &= \mathrm{op}(\alpha(\mathrm{op}(x^{\mathrm{op}}))) \, \mathrm{op}(\alpha(\mathrm{op}(y^{\mathrm{op}}))) \\ &= F(\alpha)(x^{\mathrm{op}}) F(\alpha)(y^{\mathrm{op}}) \end{aligned}$$

より $F(\alpha)$ は積を保つ．他の演算についても保たれるため $F(\alpha) \in \mathrm{Hom}(A^{\mathrm{op}}, B^{\mathrm{op}})$ である．

A と A^{op}，B と B^{op} を入れ替えることで F の逆写像を得られる．よって F は全単射である．

(2) $\alpha, \beta \in \mathrm{Hom}(A, B)$ について，

$$F(\alpha) \circ F(\beta) = (\mathrm{op} \circ \alpha \circ \mathrm{op}) \circ (\mathrm{op} \circ \beta \circ \mathrm{op}) = \mathrm{op} \circ (\alpha \circ \beta) \circ \mathrm{op} = F(\alpha \circ \beta)$$

よりしたがう．

□

命題 19.21. 作用の反転

A を環，または F 代数，M を右 A 加群とする．A^{op} の M への作用を

$$a^{\mathrm{op}} m = ma$$

により定めると，M は左 A^{op} 加群となる．これは左右逆でも成り立つ．

証明. A の作用を定める準同型が $\varphi : A \to \mathrm{End}(M)$ であるとき，主張の A^{op} の作用は準同型 $\mathrm{op} \circ \varphi \circ \mathrm{op} : A^{\mathrm{op}} \to \mathrm{End}(M)^{\mathrm{op}}$ によって定められる．よってしたがう． □

作用の反転を使って両側加群を右加群に直すことができる．

定義 19.22. 両側加群

アーベル群 $(M, +)$ が左 A 加群でも右 B 加群でもあり，$a \in A, b \in B, m \in M$ に対して

$$(am)b = a(mb)$$

であるとき，M を両側 (A, B) 加群という．両側 (A, B) 加群 M を ${}_A M_B$ ともかく．

命題 19.23. 両側加群を右加群に

A, B を F 代数，M を (A, B) 両側加群とする．$A^{\mathrm{op}} \otimes_F B$ の M への作用を

$$m\left(\sum_{i=1}^{n} {a_i}^{\mathrm{op}} \otimes b_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i m b_i$$

により定めると，この作用は well-defined であり，M は右 $A \otimes_F B$ 加群となる．

証明. $\varphi : A \to \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(M), \psi : B \to \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(M)$ を A, B の作用を与える準同型とする．双線型写像

$$A^{\mathrm{op}} \times B \ni (a^{\mathrm{op}}, b) \to \varphi(a) \circ \psi(b) (= \psi(b) \circ \varphi(a)) \in \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(M)$$

が誘導する準同型 $A^{\mathrm{op}} \otimes_F B \to \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(M)$ が主張の作用を与える． □

19.4　中心的単純代数の性質その 2

では反転代数を使って中心的単純代数の性質を調べていこう．まず反転とのテンソル積で可除部分を自明にすることができる．

定理 19.24.CSA と反転代数のテンソル積は可除部分が自明

A を中心的単純 F 代数とする．このとき $A^{\mathrm{op}} \otimes_F A \cong \mathrm{M}_r(F)\,(r = [A : F])$ である．

証明. 両側 (A, A) 加群 A を考えることで右 $A^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ 加群 A を得る．定理 19.14 より $A^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ は中心的単純 F 代数である．$A^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ の A への作用は F 準同型 $\varphi : A^{\mathrm{op}} \otimes_F A \to \mathrm{End}_F(A)$ を導く．単純性と $\mathrm{Im}\,\varphi \neq 0$ より $\mathrm{Ker}\,\varphi = 0$ である．これと $[A^{\mathrm{op}} \otimes_F A : F] = r^2 = [\mathrm{End}_F(A) : F]$ より φ は同型である．よって $A^{\mathrm{op}} \otimes_F A \cong \mathrm{End}_F(A) = \mathrm{M}_r(F)$ である． □

次に中心的単純台数の単純な部分代数について見ていく．単純部分代数たちは $A^{\times}$ の共役作用と，中心化 Z を通じて互いに関係しあっている．まず共役作用を通じた関係を見よう．

定理 19.25.CSA の部分 SA は共役

A を中心的単純 F 代数，B を単純 F 代数とする．単射準同型 $\sigma, \tau : B \to A$ に対してある $\gamma \in A^{\times}$ が存在し，任意の $b \in B$ に対して

$$b^{\tau} = \gamma b^{\sigma} \gamma^{-1}$$

が成り立つ．

証明. B からの作用 $ba = b^{\sigma} a$ により A_A を左 B 加群とみなすと，A は両側 (B, A) 加群となる．命題 19.23 より A は右 $B^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ 加群となる．これを A_{σ} とかく．同様に A_{τ} を定める．定理 19.14(1) より $B^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ は単純であるので補題**??**より同型 $f : A_{\sigma} \to A_{\tau}$ が存在する．$\gamma = f(1_A)$ とおくと $f(a) = \gamma a$ であることに注意すれば，任意の $b \in B$ に対して

$$\gamma b^{\sigma} = f(b^{\sigma}) = f(1_A(b^{\sigma} \otimes 1_A)) = f(1_A)(b^{\tau} \otimes 1_A) = b^{\tau} \gamma$$

より $b^\tau = \gamma b^\sigma \gamma^{-1}$ が成り立つ．f が同型であるため $A = f(A) = \gamma A$ であるため $\gamma \in A^\times$ である． □

系 19.26.CSA の自己同型は内部自己同型

A を中心的単純 F 代数，$\sigma : A \to A$ を自己同型とする．このときある $\gamma \in A^\times$ が存在し，任意の $a \in A$ で

$$a^\sigma = \gamma a \gamma^{-1}$$

が成り立つ．

証明． 定理 19.25 よりしたがう． □

続いて中心化 Z を通じた関係を見よう．単純部分代数は双子のように対になっており中心化 Z で写りあう．

補題 19.27.SA 上有限生成加群の自己同型群

A を可除部分が D，容量が r の単純 F 代数とする．有限生成右 A 加群 W について，$\mathrm{End}_A(W)$ は D を可除部分とする単純 F 代数であり，

$$[W : F]^2 = [A : F][\mathrm{End}_A(W) : F]$$

が成り立つ．

証明． $M = D^r$ とおくと，M は例**??**より単純右 A 加群である．命題**??**よりある $s \in \mathbb{N}$ があり $W \cong M^s$ が成り立つ．よって命題**??**, 例**??**より

$$\mathrm{End}_A(W) \cong \mathrm{M}_s(\mathrm{End}_A(V)) \cong \mathrm{M}_s(D),$$

すなわち $\mathrm{End}_A(W)$ は可除部分 D，容量 s の単純代数である．さらに $[D : F] = t$ とおくと

$$[W : F] = trs, \quad [A : F] = tr^2, \quad [\mathrm{End}_A(W) : F] = ts^2$$

ゆえ $[W : F]^2 = [A : F][\mathrm{End}_A(W) : F]$ が成り立つ． □

定理 19.28.CSA の部分 SA の中心化代数

A を中心的単純 F 代数，B をその単純 F 部分代数，$C = \mathrm{Z}_A(B)$ とする．このとき以下が成り立つ．

(1) C は単純 F 代数．
(2) $[A : F] = [B : F][C : F]$
(3) $B^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ と C の可除部分は等しい．
(4) $\mathrm{Z}_A(C) = B$.

証明． A の可除部分を D, 容量を $r \in \mathbb{N}$ とおく．このとき $M = D^r$ とおくと, 例**??**より D の作用と A の作用は可換ゆえ，M は両側 (D, B) 加群である．命題 19.23（の左右逆）を用いて M は左 $D \otimes_F B^{\mathrm{op}}$

加群になる．このとき $C = \mathrm{End}_{D\otimes_F B^{\mathrm{op}}}(M)$ である．なぜなら $\mathrm{End}_{D\otimes_F B^{\mathrm{op}}}(M) \subseteq \mathrm{End}_D(M) = A$ であり右作用 $M \curvearrowleft A$ が忠実ゆえ，$a \in A$ について

$$\begin{aligned} a \in \mathrm{End}_{D\otimes_F B^{\mathrm{op}}}(M) &\iff \forall d \in D, \forall b \in B, \forall m \in M, (dmb)a = d(ma)b \\ &\iff \forall b \in B, ba = ab \end{aligned}$$

であるから．定理 19.14 より $D \otimes_F B^{\mathrm{op}}$ は単純ゆえ，補題 19.27 より $C = \mathrm{End}_{D\otimes_F B^{\mathrm{op}}}(M)$ は単純である．よって (1) がしたがう．また

$$\begin{aligned} [A : F] &= [D : F]r^2 \\ &= [M : F]^2/[D : F] \\ &= [D \otimes_F B^{\mathrm{op}} : F][\mathrm{End}_{D\otimes_F B^{\mathrm{op}}}(M) : F]/[D : F] \\ &= [D : F][B : F][C : F]/[D : F] \\ &= [B : F][C : F] \end{aligned}$$

より (2) が成り立つ．さらに C の可除部分は $D \otimes_F B^{\mathrm{op}}$ の可除部分と一致する．例 19.8 より

$$A \otimes_F B^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{M}_r(F) \otimes_F D \otimes_F B^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{M}_r(D \otimes_F B^{\mathrm{op}})$$

でありこれと例 19.9 より，$D \otimes_F B^{\mathrm{op}}$ と $A \otimes_F B^{\mathrm{op}}$ の可除部分は一致する．よって (3) がしたがう．(2) を C に対して用いると $[A : F] = [C : F][\mathrm{Z}_A(C) : F]$ である．これと (2) より $[B : F] = [\mathrm{Z}_A(C) : F]$ であり，$B \subseteq \mathrm{Z}_A(C)$ ゆえ (4) の $\mathrm{Z}_A(C) = B$ が成り立つ．　□

続いて中心的単純代数の部分体の性質を見よう．

定理 19.29.CSA の部分体の性質

A を中心的単純 F 代数，K をその部分体とする．$\mathrm{Z}_A(K)$ は中心的単純 K 代数であり，A の次数は $\mathrm{Z}_A(K)$ の次数の $[K : F]$ 倍，すなわち

$$\sqrt{[A : F]} = \sqrt{[\mathrm{Z}_A(K) : K]}[K : F]$$

である．また

$$\sqrt{[A : F]} = [K : F](= m \text{ とおく}) \iff \mathrm{Z}_A(K) = K$$

であり，この同値な条件を満たすとき $A \otimes_F K \cong \mathrm{M}_m(K)$ となる．

証明. K は単純 F 代数ゆえ定理 19.28 より $\mathrm{Z}_A(K)$ は単純であり，(4)A でのその中心化代数は K であるため，中心的単純 K 代数である．さらに

$$[A : F] = [\mathrm{Z}_A(K) : F][K : F] = [\mathrm{Z}_A(K) : K][K : F]^2$$

である．よって主張の同値も成り立つ．これが成り立つとき $\mathrm{Z}_A(K) = K$ の可除部分が K であることと再び定理 19.28 より，$A \otimes_F K \cong K^{\mathrm{op}} \otimes_F A$ の可除部分は K である．$[A \otimes_F K : F] = [A : F][K : F] = m^2[K : F]$ より容量は m である．したがって $A \otimes_F K \cong \mathrm{M}_m(K)$ である．　□

中心的単純代数を中心的可除代数に絞ってさらに性質を見ていこう．

補題 19.30.CDA は F の分離拡大を含む

$D \supsetneq F$ が中心的可除 F 代数であるとき，D は F の真の分離拡大体を含む．

証明. 任意に $d \in D \setminus F$ をとる．$F[d]/F$ は有限次拡大である．よってある d で $F[d]/F$ が純非分離拡大でなければ F の $F[d]$ での分離閉包は F の真の拡大体になる．よってある d で $F[d]/F$ が純非分離拡大でないことを示せば良い．任意の $d \in D \setminus F$ に対して $F[d]/F$ が純非分離拡大であると仮定して，ある $c \in D \setminus F$ で $F[c]$ の非自明な F 同型 σ が存在することを示すことで矛盾させる．F の標数は $p > 0$ とおける．$[F[d] : F] = q$ とすると $e \in \mathbb{N}$ が存在し $q = p^e$ となる．$u = d^{p^{e-1}}$ とおくと $u \notin F, u^p = d^q \in F, [F[u] : F] = p$ である．

$$\sigma : D \ni x \mapsto uxu^{-1} \in D$$

とする．$\sigma \in \mathrm{End}_F(D)$ であり，$u^p = 1$ より $\sigma^p = 1$，$u \notin F = \mathrm{Z}(D)$ より $\sigma \neq 1$ である．すなわち $(\sigma - 1)^p = 0, \sigma - 1 \neq 0$ である．$(\sigma - 1)^r \neq 0$ なる最大の $r \in \mathbb{N}$ をとる．$1 < r < p$ である．$(\sigma - 1)^r x \neq 0$ なる $x \in D$ について

$$a = (\sigma - 1)^{r-1} x, \quad b = (\sigma - 1)^r x$$

とおく．$\sigma(a) - a = b, \sigma(b) - b = 0$ である．$c = a/b$ とおくと

$$\sigma(c) = \frac{\sigma(a)}{\sigma(b)} = \frac{a + b}{b} = c + 1$$

である．よって $\sigma|_{F[c]}$ は $F[c]$ の非自明な F 同型である．　□

定理 19.31.CDA は指数次分離拡大を含む

D を中心的可除 F 代数とする．D は $[D : F] = [K : F]^2$，すなわち拡大次数が D の指数となる F の分離拡大体 K を含む．

証明. $[D : F] = m^2$ とおく．$m = 1$ なら明らか．$m > 1$ について考える．補題 19.30 より D は F の真の分離拡大 K を含む．K を $[K : F]$ が最大になるようにとる．$[K : F] \neq m$ と仮定して矛盾を導く．$\mathrm{Z}_D(K)$ は K と異なる中心的可除 K 代数である．なぜなら定理 19.29 より $\mathrm{Z}_D(K)$ は中心的単純 K 代数であり次数を s とおくと $m = s[K : F]$ ゆえ $s \neq 1$，つまり $\mathrm{Z}_D(K) \supsetneq K$ であり．さらに $\mathrm{Z}_D(K) \subseteq D$ であり $d \in D$ について，

$$d \in \mathrm{Z}_D(K) \iff \forall x \in K dx = xd \iff x \in K^\times, x^{-1}d^{-1} = d^{-1}x^{-1} \implies d^{-1} \in \mathrm{Z}_D(K)$$

ゆえ $\mathrm{Z}_D(K)$ は可除代数であるから．補題 19.30 より $\mathrm{Z}_D(K)$ は K の真の分離拡大 L を含む．$[L : F] > [K : F]$ であるので K の取り方に矛盾する．　□

19.5　被約トレース・被約ノルム

F 代数に対してトレースやノルムといった概念を定めよう．まずトレースとノルムを定義する際に用いる表現を導入する．

定義 19.32. 表現

(1) F 代数の A の次数 r の表現とは，F 準同型 $\sigma : A \to \mathrm{M}_r(F)$ のことである．

(2) A の表現 σ が忠実であるとは，σ が単射であることである．

(3) A の表現 σ, τ が同値であるとは，次数が等しく（r とおく），ある $\gamma \in \mathrm{GL}_r(F)$ が存在し，任意の $a \in A$ に対して

$$a^\tau = \gamma a^\sigma \gamma^{-1}$$

が成り立つことであり，$\tau \sim \sigma$ と書く．

(4) A の右正則表現 ρ とは，A から右 A 加群 A_A への作用を与える準同型 $\rho : A \to \mathrm{End}_F(A_A) \cong \mathrm{M}_{[A:F]}(F)$ のことである．これは同値を除いて定まる．

(5) 次数が等しい F 代数 A の表現 σ, τ について，その直和 $\sigma \oplus \tau$ とは

$$a^{\sigma \oplus \tau} = \begin{pmatrix} a^\sigma & O \\ O & a^\tau \end{pmatrix}$$

により定まる表現のことである．

A が F ベクトル空間 V に作用している時，V の基底をとるごとに次数 $\dim V$ の表現が定まる．このときの基底の取り方の違いを無視する同一視を行うのが表現の同値である．逆に表現も F ベクトル空間への作用を誘導するため加群を誘導する．表現の同値性は加群を使うと以下のように言い換えられる．

命題 19.33. 同値な表現の加群は同型

A を F 代数，σ, τ を A の次数 r の表現とする．σ, τ が誘導する作用により $V = F^r$ を A 加群とみなしたものをそれぞれ V_σ, V_τ とおく．このとき

$$\sigma \sim \tau \iff V_\sigma \cong V_\tau$$

である．

証明. $V_\sigma \cong V_\tau$ が同型であるとは $\gamma \in \mathrm{GL}_r(F)$ が存在し，任意の $a \in A, v \in F^r$ に対して

$$(va^\tau)\gamma = (v\gamma)a^\sigma$$

が成り立つことである．$\mathrm{M}_r(F)$ は F^r に忠実に作用するので，これは

$$a^\tau \gamma = \gamma a^\sigma$$

と同値である．　□

有限次拡大体 K/F の場合はトレース，ノルムを右正則表現 ρ を用いて

$$\mathrm{Tr}_{K/F}(a) = \mathrm{Tr}(a^\rho), \quad \mathrm{N}_{K/F}(a) = \det(a^\rho)$$

と定めた．つまり各元をスカラー倍により線型写像とみなし、その線型写像のトレースやノルムをその元のトレース、ノルムにするということである．これと同じように F 代数 A にトレース、ノルムを定めることができる．

定義 19.34. トレース・ノルム

A を F 代数とする．A の右正則表現 ρ を用いて

$$\mathrm{Tr}_{A/F}(a) = \mathrm{Tr}(a^\rho), \quad \mathrm{N}_{A/F}(a) = \det(a^\rho).$$

で定められる写像 $\mathrm{Tr}_{A/F} : A \to F, \mathrm{N}_{A/F} : A \to F$ をそれぞれ A のトレース，ノルムという．

しかし場合によってはこのトレース，ノルムが与える情報はある意味で少なくなっている．例を見てみよう．

例 19.35. $A = \mathrm{M}_n(F)$ のとき，標準的な基底 $\{E_{1,1}, \ldots, E_{1,n}, \ldots, E_{n,1}, \ldots, E_{n,n}\}$（$E_{i,j}$ は (i,j) 成分が 1 で他は 0 の $n \times n$ 行列）に関する $a \in A$ の右正則表現は

$$a^\rho = \begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix}$$

であるので，

$$\mathrm{Tr}_{A/F}(a) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix} = n\,\mathrm{Tr}(a),$$

$$\mathrm{N}_{A/F}(a) = \det\begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix} = \det(a)^n$$

となる．$\det(a) \neq \det(b)$ だが $\mathrm{N}_{A/F}(a) = \mathrm{N}_{A/F}(b)$ なる a, b が（もし F が $a^n - 1 = 0$ の非自明な解を持つなら）存在する．また標数が n を割り切るとき $\mathrm{Tr}_{A/F}$ は常に 0 になる．これらの意味で，$\mathrm{N}_{A/F}, \mathrm{Tr}_{A/F}$ は $\mathrm{M}_r(F)$ の通常の行列式，トレースよりも情報量が少ない．

できればこの例の場合の通常の行列式やトレースのような，$\mathrm{N}_{A/F}, \mathrm{Tr}_{A/F}$ を簡約したものを利用したい．そこでこのようなものを被約ノルム，被約トレースとして定めることを目指す．被約ノルム，被約トレースを定めるために代数に課す性質を表す言葉を用意しておく．

定義 19.36. 分離単純代数

F 代数 A が分離単純 F 代数であるとは，A が単純 F 代数であり，$\mathrm{Z}(A)/F$ が分離拡大であることである．

分離性自体は一般の代数に対して定義されるが，ここでは簡潔さのために単純代数に限定して上記の定義を採用する．いくつか定理，補題を示す．

定理 19.37. SA の表現

単純 F 代数の次数が等しい二つの表現は同値である．

証明． 補題**??**と命題 19.33 よりしたがう．　□

補題 19.38. 分離 SA の係数拡大は SSA

A を分離単純 F 代数とする．F の（有限次元とは限らない）任意の拡大体 L について，$A \otimes_F L$ は半単純 F 代数である．

証明. $Z = \mathrm{Z}(A)$ とおく．Ω を L のガロア拡大体で Z の F 準同型像を含むものとする．

$$S = \mathrm{Hom}_F(Z, \Omega)/\operatorname{Gal}(\Omega/L), \quad U_\sigma = Z^\sigma L$$

とおく．定理**??**より

$$Z \otimes_F L \cong \bigoplus_{\sigma \in S} U_\sigma$$

である．A の Z 基底 $x_1, \ldots, x_t$ をとると，

$$A \otimes_F L = \left(\bigoplus_{i=1}^{t} x_i Z \right) \otimes_F L = \bigoplus_{i=1}^{t} x_i (Z \otimes_F L) = \bigoplus_{\sigma \in S} \bigoplus_{i=1}^{t} x_i U_\sigma = \bigoplus_{\sigma \in S} (A \otimes_Z U_\sigma)$$

□

一般の代数に対する分離性の定義はこの補題 19.38 が成り立つこと，つまり $A \otimes_F L$ が半単純であることと定義される．

例 19.35 では $\rho = \mathrm{id}_A{}^{\oplus n}$ であり，これがトレース，ノルムよりも $\mathrm{M}_n(F)$ の通常のトレース，行列式の方が精密に情報を取り出せる理由だった．一般の分離単純代数でもこのように右正則表現は別のものの直和に分解できる．

定理 19.39. 分離 SA の正則表現の分解

A を分離単純 F 代数とする．$[A : \mathrm{Z}(A)] = n^2, [\mathrm{Z}(A) : F] = m$ とおく．A の右正則表現 $\rho : A \to \mathrm{M}_{n^2 m}(F) (\hookrightarrow \mathrm{M}_{n^2 m}(\overline{F}))$ に対して，ある F 準同型 $\tau : A \to \mathrm{M}_{mn}(\overline{F})$ が存在し，

$$\rho \sim \tau^{\oplus n}$$

が成り立つ．さらに $\chi(P)(x)$ で行列 P の特性多項式を表すと，任意の $a \in A$ に対して

$$\chi(a^\tau)(x) \in F[x], \quad \chi(a^\rho)(x) = \chi(a^\tau)(x)^n$$

が成り立つ．

証明. A の可除部分を D，容量を r，$Z = \mathrm{Z}(D) (= \mathrm{Z}(A))$ とおく．さらに $[D : Z] = s^2$ とおく．定理 19.31 より $[K : Z] = s$ なる D に含まれる Z の分離拡大体 K が存在する．

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, dash, "r^2"] \arrow[rrr, bend right, dash, "n^2"'] & D \arrow[r, dash, "s"] & K \arrow[r, dash, "s"] & Z \arrow[r, dash, "m"] & F
\end{tikzcd}$$

K の F 上のガロア閉包 L をとる．一度 ρ を $A \otimes_F L$ 上に延長してある τ の直和に分解し，それを A に制限することで ρ の直和分解を得よう．そのためにまず $A \otimes_F L$ の構造を見る．

$S = \mathrm{Hom}_F(Z, L) = \mathrm{Gal}(L/L)\backslash \mathrm{Hom}_F(Z, L)$ とおくと，補題 19.38 より

$$A \otimes_F L \cong \bigoplus_{\sigma \in S} (A \otimes_Z U_\sigma)$$

である．ここで $U_\sigma = Z^\sigma L = L$ である．例 19.8 を用いると，各 $A \otimes_Z U_\sigma$ について

$$A \otimes_Z U_\sigma \cong \mathrm{M}_r(D) \otimes_Z U_\sigma \cong \mathrm{M}_r(D \otimes_Z U_\sigma)$$

である．また $D \otimes_Z U_\sigma$ について $\sqrt{[D : Z]} = [K : Z] = s$ ゆえ定理 19.29 と命題 19.10 より

$$D \otimes_Z U_\sigma = D \otimes_Z L = D \otimes_Z K \otimes_K L \cong \mathrm{M}_s(K) \otimes_K L \cong \mathrm{M}_s(L) = \mathrm{M}_s(U_\sigma)$$

である．したがって，

$$A \otimes_F L \cong \bigoplus_{\sigma \in S} \mathrm{M}_n(U_\sigma)$$

である．ここで $rs = n$ を用いた．
次に ρ の $A \otimes_F L$ への延長 $\rho_L : A \otimes_F L \to \mathrm{M}_{n^2 m}(L)$ について調べる．$\rho_\sigma : \mathrm{M}_n(U_\sigma) \to \mathrm{M}_{n^2}(L)$ を L 代数 $\mathrm{M}_n(U_\sigma)$ の正則表現とする．$A \otimes_F L \cong \bigoplus_{\sigma \in S} \mathrm{M}_n(U_\sigma)$ ゆえこの同型を通じて $\rho_L = \bigoplus_{\sigma \in S} \rho_\sigma$ である．各 ρ_σ について，$\mathrm{M}_n(U_\sigma)$ は単純 L 代数ゆえ定理 19.37(1) より $\rho_\sigma \sim {\mathrm{id}_{U_\sigma}}^{\oplus n}$ である．したがって $\tau = \bigoplus_{\sigma \in S} \mathrm{id}_{U_\sigma}$ とおくと

$$\rho_L = \bigoplus_{\sigma \in S} \rho_\sigma \sim \bigoplus_{\sigma \in S} {\mathrm{id}_{U_\sigma}}^{\oplus n} = \left(\bigoplus_{\sigma \in S} \mathrm{id}_{U_\sigma} \right)^{\oplus n} = \tau^{\oplus n}$$

である．$\rho = \rho_L|_A$ であるため，ρ, τ の定義域，余域を適切に読み直して $\rho \sim \tau^{\oplus n}$ が成り立つ．
最後に $\chi(\tau(a))(x)$ について調べる．まず

$$\begin{aligned}
\chi(a^\tau)(x)^n &= \det(xI_{nm} - a^\tau)^n \\
&= \det \begin{pmatrix} xI_{nm} - a^\tau & & \\ & \ddots & \\ & & xI_{nm} - a^\tau \end{pmatrix} \\
&= \det(xI_{n^2 m} - a^\rho) \\
&= \chi(a^\rho)(x)
\end{aligned}$$

より $\chi(a^\tau)(x)^n = \chi(a^\rho)(x)$ が成り立つ．次に $\chi(a^\tau)(x) \in F[x]$ を示す．$\chi(a^\tau)(x) \in L[x]$ であるので $\mathrm{Gal}(L/F)$ の作用で不変であることを示せば良い．$\chi(a^\rho)(x) \in F[x]$ より任意の $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/F)$ について

$$(\chi(a^\tau)(x))^\sigma)^n = (\chi(a^\rho)(x))^\sigma = \chi(a^\rho)(x) = \chi(a^\tau)(x)^n$$

である．よって ζ を 1 の原始 n 乗根として $\chi(a^\tau)(x)^\sigma = \zeta^k \chi(a^\tau)(x)$ が成り立つが，どちらもモニックなので $k = 1$，すなわち $\chi(a^\tau)(x)^\sigma = \chi(a^\tau)(x)$ である．　□

この定理を用いて分離単純 F 代数の被約トレース，被約ノルムを定義しよう．右正則表現を分解して得られた表現を用いて定める．

定義 19.40. 被約ノルム，被約トレース

A を分離単純 F 代数，$[A : \mathrm{Z}(A)] = n^2, [\mathrm{Z}(A) : F] = m$，$\rho$ を A の右正則表現とする．$\tau : A \to \mathrm{M}_{mn}(\overline{F})$ を $\rho \sim \tau^{\oplus n}$ なる表現とする．このとき

$$\mathrm{Trd}_{A/F}(a) = \mathrm{Tr}(a^\tau), \quad \mathrm{Nrd}_{A/F}(a) = \mathrm{N}(a^\tau)$$

で定められる写像 $\mathrm{Trd}_{A/F} : A \to F, \mathrm{Nrd}_{A/F} : A \to F$ をそれぞれ A の被約トレース，被約ノルムという．

定理 19.39 によりこのような τ は存在する．τ の選択での well-defined 性を示す．

証明. $\rho \sim \tau^{\oplus n} \sim \sigma^{\oplus n}$ であるとき，$\gamma\tau^{\oplus n} = \sigma^{\oplus n}\gamma$ なる $\gamma \in \mathrm{GL}_{mn}(\overline{F})$ が存在する．γ を $n \times n$ のブロック行列とみなすと，$\gamma\tau^{\oplus n} = \sigma^{\oplus n}\gamma$ より任意の $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ について $\gamma_{ij}a^\tau = a^\sigma\gamma_{ij}$ が成り立つ．γ が正則ゆえ γ_{ij} に正則なものが存在する．したがって a^τ と a^σ は相似である．よって $\mathrm{Trd}_{A/F}(a)$ と $\mathrm{Nrd}_{A/F}(a)$ は τ の選択によらず well-defined である． □

いくつか簡単な例を見ておこう．

例 19.41. $A = \mathrm{M}_n(F)$ のとき，$[A : \mathrm{Z}(A)] = n^2, [\mathrm{Z}(A) : F] = 1$ である．$a \in A$ について，

$$a^\rho = \begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix} = a^{{\mathrm{id}_A}^{\oplus n}},$$

つまり $\rho \sim {\mathrm{id}_A}^{\oplus n}$ である．したがって

$$\mathrm{Trd}_{A/F}(a) = \mathrm{Tr}(a), \quad \mathrm{Nrd}_{A/F}(a) = \det(a)$$

である．例 19.35 の観察を通じて望んだ通り，トレース，ノルムを簡約したものとして被約トレース，被約ノルムが得られていることがわかる．

例 19.42. K/F を分離拡大体とする．$A = K$ のとき，$[A : \mathrm{Z}(A)] = 1, [\mathrm{Z}(A) : F] = [K : F]$ である．$\rho \sim \rho^{\oplus 1}$ である．したがって

$$\mathrm{Trd}_{A/F}(a) = \mathrm{Tr}_{K/F}(a), \quad \mathrm{Nrd}_{A/F}(a) = \mathrm{N}_{K/F}(a)$$

である．この例では被約トレース，被約ノルムは通常のトレース，ノルムと一致している．

被約トレースの性質を見てみよう．

定理 19.43. 分離 SA の被約トレースは非退化

A を分離単純 F 代数とする．F 双線型形式 $(x, y) \mapsto \mathrm{Trd}_{A/F}(xy)$ は非退化である．

証明. □

今後使う補題を示しておく．これは補題 19.38 の部分的な逆である．

補題 19.44. 中心分離で係数拡大して SSA なら SA