

Nombres premiers

I. Définition d'un nombre premier

Définition.

Un entier naturel n est dit **premier** s'il possède **exactement** deux diviseurs dans \mathbb{N} : 1 et lui-même. Enfin, si cet entier naturel n , distinct de 1, est non premier, on dira qu'il est **composé**.

Exemples, contre-exemples.

- 2 est **premier** car ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 2.
- 0 n'est pas premier car il possède une infinité de diviseurs positifs.
- 1 n'est **pas premier** car il ne possède qu'un seul diviseur, lui-même !



Exercice 1.9. Soit n un entier naturel n supérieur ou égal à 2. Le nombre $n^2 - 1$ peut-il être premier ?

Théorème.

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. Soit p le plus grand d'entre eux.

Soit N le produit de tous ces nombres premiers.

$$N = 2 \times 3 \times \dots \times p.$$

Posons $N' = N + 1$.

Alors, pour tout nombre premier d , la division euclidienne de N' par d a pour reste 1 car $N' = d \times q + 1$.

Donc N' n'est divisible par aucun d'entre eux, donc N' est premier.

Mais $N' > p$, ce qui est impossible car p est le plus grand nombre premier.

Donc il n'existe pas un nombre fini de nombres premiers ■

Théorème.

- Tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 admet **un diviseur premier**.
- Tout entier naturel $n \geq 2$, **non premier**, admet un diviseur premier inférieur ou égal à \sqrt{n} .

Démonstration

Soit n un entier $n \geq 2$.

- Si n est premier, il est un diviseur premier de lui-même.

- Si n n'est pas premier, il admet un diviseur positif autre que 1 et lui-même.

L'ensemble E des diviseurs positifs, autres que 1 et n , est donc un ensemble d'entiers naturels non vide : il a donc un plus petit élément que l'on note p .

Si p n'était pas premier, il existerait un diviseur propre d de p qui serait plus petit que p ; comme d diviserait n avec p qui divise n , d diviserait n donc d serait un élément de E plus petit que p ce qui est impossible.

Ainsi p est premier et divise n ; par suite il existe un entier q tel que $n = pq$ avec $1 < q < n$.

Donc q est un diviseur propre de n et par conséquent $p \leq q$.

On en déduit que $p^2 \leq pq$ soit $p^2 \leq n$ et donc $p \leq \sqrt{n}$ ■

Propriété.

Soit n un entier supérieur à 2.

Si n n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à \sqrt{n} alors n est **un nombre premier**.

Démonstration

Si n n'est pas premier, il admet un diviseur premier inférieur ou égal à \sqrt{n} d'après le premier théorème. Cette propriété est donc la contraposée du second théorème. ■

Exemple. Démontrons que 139 est un nombre premier.

II. Deux théorèmes fondamentaux**1. Décomposition en produit de facteurs premiers****Théorème.**

Tout entier naturel $n \geq 2$ se décompose en un **produit de nombres premiers**.

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

On écrira $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ où $n \geq 2$, p_1, p_2, \dots, p_k sont des nombres premiers deux à deux distincts et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ sont des entiers naturels non nuls.

Exemple. Décomposer 140 en produit de facteurs premiers et en déduire la liste des diviseurs de 140.

Propriété.

Si n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, admettant pour décomposition en produit de facteurs premiers $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ admet alors n possède exactement $(\alpha_1 + 1) \times (\alpha_2 + 1) \times \dots \times (\alpha_k + 1)$ diviseurs positifs.

Exemple. Déterminer le nombre de diviseurs positifs de 72.

2. Petit théorème de Fermat

Théorème.

Soit n un nombre entier.

Si p est un nombre **premier** ne divisant pas n alors $n^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Conséquence : si p est un nombre premier et n un entier, alors $n^p \equiv n [p]$.



Exercice 2.9. Montrer, que pour tout entier naturel n , $n^{13} - n$ est divisible par 26.