

32

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

1. $a = i - (2 - 5i)$
2. $b = 3((1 + 2i) - (4 + i))$
3. $c = 2i^2 + i + 2(1 - 2i)$
4. $d = i^3 - 1$

33Donner la forme algébrique des nombres complexes z_1, z_2, z_3 et z_4 définis dans la console python par les commandes suivantes :

- Pour z_1 :

```
1 z1=complex(2,3)
```

- Pour z_2 :

```
1 z2=complex(5,7)
```

- Pour z_3 :

```
1 z3=z1+z2
```

- Pour z_4 :

```
1 z4=z1*z2
```

34

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants puis vérifier les résultats à la calculatrice :

1. $a = 3 - (2 + 3i)(4 + i)$
2. $b = (2 + i)(3 - 5i)(1 + 2i)$
3. $c = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$
4. $d = (5 - i)^3$

35On considère deux nombres complexes $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$.

1. Démontrer que $\operatorname{Re}(z \times z') = aa' - bb'$.
2. Préciser $\operatorname{Im}(z \times z')$.

36On considère la suite (u_n) à valeurs complexes définies par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = (1 + i)u_n$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer les trois premiers termes de cette suite.
2. À quel type de suite correspond-elle ?
3. Donner son écriture explicite, c'est-à-dire son expression en fonction de n .
4. Calculer u_8 .

37Pour tout nombre complexe $z = x + iy$, on considère $P(z) = z^2 - i$.

1. Exprimer la partie réelle de $P(z)$ en fonction de x et y .
2. Faire de même pour la partie imaginaire.

3. En déduire la forme algébrique de $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

38Simplifier la somme $i^{2018} + i^{2019} + i^{2020} + i^{2021}$.**39**

Écrire le conjugué de chacun des complexes suivants :

1. $3 + 7i$
2. $5 - 2i$
3. $2i - (4 + 5i)$
4. $(3 + 4i)(1 - 7i)$

40

Écrire le conjugué de chacun des nombres suivants :

1. $\frac{1}{3i}$
2. $\frac{2 - 4i}{3 + 2i}$
3. $(4 + 5i)^2$
4. $\frac{(3 - 4i)(4 + i)}{2 + 3i}$

41Écrire le conjugué de \bar{z} le conjugué des nombres complexes suivants :

1. $z^2 - iz + 3i - 4$
2. $3i + (2 + i)z$
3. $\frac{3z + i}{z - i}$

42On considère un polynôme $P(z)$ de degré 2 à coefficients réels.Montrer que si z_0 est une racine de P alors \bar{z}_0 l'est aussi.**43**

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants puis vérifier les résultats à la calculatrice :

1. $a = \frac{4 + i}{2 + i}$
2. $b = \frac{1}{2 - i}$
3. $c = \frac{2i}{i - \sqrt{2}}$
4. $d = \frac{i}{3 - i\sqrt{3}}$

44Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :

1. $7z - 1 = 7i$
2. $5z + 5 = 2z + 3 + 2i$
3. $(4 + z)(5 + 2z) = 4i + 2z^2$

45

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :

1. $iz - 1 = 7i + z$
2. $4iz + 2i = 1 - z + i$
3. $\frac{z}{i+1} + 3 = \frac{z}{i-1} - 3$

46

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :

1. $z + 3 + i = 2\bar{z} + 7 + 3i$
2. $2z - 4 = 5i + 4\bar{z}$
3. $z\bar{z} = z + 2$
4. $\bar{z} - 1 = z\bar{z} - i$

47

Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $z^2 - 2\bar{z} = -1$.

48

Soit a et b deux réels non nuls en même temps. Démontrer que $Z = \frac{a+ib}{a-ib} + \frac{a-ib}{a+ib}$ est réel.

49

On considère le nombre complexe $z = a + 2i$ avec $a \in \mathbb{R}$. Déterminer a pour que z^2 soit imaginaire pur.

50

Soit z un nombre complexe non nul.

1. Écrire le conjugué des nombres suivants en fonction de z et \bar{z} :
 - a. $Z_1 = z + \bar{z}$
 - b. $Z_2 = z^2 + \bar{z}^2$
 - c. $Z_3 = \frac{z - \bar{z}}{z + \bar{z}}$
 - d. $Z_4 = \frac{z^2 - \bar{z}^2}{z\bar{z} + 3}$
2. Déterminer si chacun des nombres précédents est un nombre réel, un nombre imaginaire pur ou ni l'un ni l'autre.

51

Soit $Z = \frac{z+i}{z-i}$ pour tout $z \neq i$.

1. Exprimer \bar{Z} en fonction de \bar{z} .
2. En déduire tous les nombres complexes z tels que Z soit réel.

52

Soit k un nombre réel et on pose :

$$z = k^2 + 2k - 1 - (k^2 - k - 2)i.$$

1. Déterminer la ou les valeur(s) du réel k pour que z soit un nombre réel.
2. Déterminer la ou les valeur(s) du réel k pour que z soit un nombre imaginaire pur.
3. Existe-t-il une valeur ou plusieurs valeurs du réel k pour que z soit nul ?

53

À l'aide du binôme de Newton et du triangle de Pascal, donner la forme algébrique des nombres suivants :

1. $(1+i)^3$
2. $(1+2i)^4$
3. $(2-i)^4$

54

1. Dans la formule du binôme de Newton avec $(x+y)^{10}$, trouve-t-on un terme en x^2y^6 ? Si oui, préciser son coefficient.
2. Même question avec x^3y^7 .

55

On considère la fonction Python suivante :

```
1 def developpe(a,b):
2     S=0
3     L=[1,4,6,4,1]
4     for k in range(5):
5         S=S+L[k]*a**(4-k)*b**k
6     return(S)
```

1. a. Que représente les termes de la liste L ?
b. Déterminer l'expression de S en fonction de a et b .
c. Quelle valeur renvoie la fonction pour $a = 1$ et $b = i$?
2. Louise a testé la fonction et a obtenu le résultat suivant :

```
> developpe(5,complex(0,3))
(-644+960j)
```

Quelle égalité mathématique peut-elle en déduire ?

56

1. Développer $(1+z)^n$ pour tout $(z; n) \in \mathbb{C} \times \mathbb{N}^*$.
2. En remplaçant z successivement par 1, -1 , i , $-i$, évaluer les quantités suivantes :
 - a. $S_1 = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \binom{n}{4} + \dots$
 - b. $S_2 = 1 - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \binom{n}{4} - \dots$
 - c. $S_3 = 1 - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \binom{n}{6} + \dots$
 - d. $S_4 = \binom{n}{1} - \binom{n}{3} + \binom{n}{5} - \dots$

57

1. Écrire une formule inspirée par le binôme de Newton pour $(a-b)^n$ en remarquant que $a-b = a+(-b)$.
2. En déduire que $\sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.
3. Quel est le coefficient du terme en a^3b^7 dans le développement de $(a-b)^{10}$?