

# Fonctions Affines

\*\*\*

## I. Rappels sur les fonctions affines

### 1. Expression

#### Définition.

Les fonctions  $f$ , définies sur  $\mathbb{R}$ , dont l'expression peut se mettre sous la forme \_\_\_\_\_, où  $m$  et  $p$  sont des réels, sont appelées **fonctions affines**.

#### Remarques.

1. Si  $m = 0$  alors  $f(x) = p$  est dite \_\_\_\_\_ ;
2. si  $p = 0$  alors  $f(x) = mx$  est dite \_\_\_\_\_.

### 2. Représentation graphique

Le plan est muni d'un repère.

#### Théorème.


**Toute fonction affine**  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = mx + p$  est représentée par **une droite**  $\mathcal{D}$  non parallèle à l'axe des ordonnées qui aura pour équation  $y = mx + p$ .

Réciproquement, toute expression de la forme  $y = mx + p$  est celle d'une fonction affine. Par ailleurs :

1.  $p$  s'appelle **ordonnée à l'origine** : la droite  $\mathcal{D}$  passe par le point de coordonnées  $(0; p)$ .
2.  $m$  s'appelle **le coefficient directeur ou pente** de la droite  $\mathcal{D}$ , et **le taux d'accroissement de  $f$**  :  
Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  sont deux points de  $\mathcal{D}$  tels que  $x_A \neq x_B$  alors :

$$m = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Illustration.



**Exercice 1.3.** Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -3(x - 1) + 7(x - 3)$ .  
Démontrer que la fonction  $f$  est une fonction affine.


## II. Variations d'une fonction affine

### Théorème.

Soit  $f : x \mapsto mx + p$  une fonction affine.


$$m > 0$$

Pour deux réels  $u$  et  $v$  :  
si  $u < v$  alors  $f(u) < f(v)$ .  
On dit que  $f$  **conserve l'ordre** dans  $\mathbb{R}$  ou  
encore que  $f$  est **strictement croissante** sur  
 $\mathbb{R}$  :



$$m < 0$$

Pour deux réels  $u$  et  $v$  :  
si  $u < v$  alors  $f(u) > f(v)$ .  
On dit que  $f$  **ne conserve pas l'ordre** dans  
 $\mathbb{R}$  ou encore que  $f$  est **strictement décroissante**  
sur  $\mathbb{R}$  :




### Exemples.


1. Pour  $f : x \mapsto 1,5x$  : comme  $m = 1,5 > 0$ , si  $u < v$  alors,  $1,5u < 1,5v$ , c'est-à-dire  $f(u) < f(v)$ .
2. Pour  $g : x \mapsto -0,4x$  : comme  $m = -0,4 < 0$ , si  $u < v$  alors,  $-0,4u > -0,4v$ , c'est-à-dire  $f(u) > f(v)$ .

**Remarque.** À partir des variations d'une fonction, on peut élaborer son **tableau de variations** : c'est un tableau synthétique regroupant les informations concernant les variations de cette fonction.


**À retenir.**1. Cas  $m < 0$ 

$x$	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f$		

2. Cas  $m = 0$ 

$x$	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f$		

3. Cas  $m > 0$ 

$x$	$-\infty$	$+\infty$
Variation de $f$		

**Exercice 2.3.**Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -4x + 2$ .**III. Signe d'une fonction affine****Définition.**Soit  $f$  une fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = mx + p$  avec  $m \neq 0$ .

1. On appelle **racine** de  $f$  le réel  $x_0$  tel que  $f(x_0) = 0$ .
2. Le point de coordonnées  $(x_0; 0)$  est le point d'intersection de la courbe représentative de  $f$  avec l'axe des abscisses.

**Propriété.**Soit  $f : x \mapsto mx + p$  une fonction affine avec  $m \neq 0$  admettant pour racine  $x_0$ . Le signe de  $f(x)$  selon les valeurs de  $x$  est donné par le tableau suivant :□ Si  $m > 0$ 

$x$	$-\infty$	$x_0$	$+\infty$
signe de $f(x)$		0	

□ Si  $m < 0$ 

$x$	$-\infty$	$x_0$	$+\infty$
signe de $f(x)$		0	

**Exercice 3.3.** Faire le tableau de signes des fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  respectivement par  $f(x) = -4x + 2$  et  $g(x) = 7x - 4$ .