

手術のあとの痛みと、痛み止めの使い方

「手術後はどのくらい痛いですか?」と聞かれたときに、お渡しする紙です

「手術後はどのくらい
痛いですか?」

どのくらい痛いかは、お伝えできません。

痛みの感じ方は人によって違うためです。同じ手術でも、感じ方は変わります。
そのかわりこの紙では、痛みを抑えて早く動くために何ができるかをお伝えします。

お伝えしたいのは、この3つです

1

我慢しないで使ってください

我慢しても、回復は早くなりません。

2

痛くなりそうなときに使えます

痛みが強くなるのを待たなくて大丈夫です。

3

動く前に使えます

起き上がる前や歩く前に、先に使えます。

使うタイミングで、つらさが変わります

痛くなってから使う

- 1 痛みが強くなる
- 2 そこで痛み止めを使う
- 3 効いてくるまでの時間がつらい

痛くなりそうなときに使う

- 1 動く前に使う
- 2 痛みが上がりきらない
- 3 起き上がる・歩くがしやすい

どちらが良いかは、担当の看護師・医師と相談して決めてかまいません。

痛みを抑えるのは、早く動くためです

手術のあとは、早めに起きて動くことが何より大事です(早期離床といいます)。
動くことで体の回復が進みます。痛み止めは、そのために使う道具でもあります。

1 起き上がる・座る

痛みが強いと、体を起こすだけで時間がかかります。

2 歩く

手術のあとは、早めに歩くようにお願いすることがあります。

3 咳をする・深く息をする

痛くて浅い息のままだと、痰を出しにくくなります。

4 眠る

夜に痛みで目が覚めると、休めません。

遠慮せずに、こう言ってください

「これくらいの痛みでも、痛み止めを使ってもいいですか?」

「これから歩く練習なので、先に痛み止めをもらえますか?」

痛み止めを使いたいと言うことは、我慢が足りないということではありません。
痛みが強いままだと、動くことも休むこともしにくくなります。

痛み止めの種類・使える回数・使う間隔は、手術の内容や体の状態によって決まります。
実際に使うときは、担当の看護師・医師の指示を確認してください。