

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातले पक्षी

ही पुस्तिका क्रिएटिव कॉमन्स अट्रिब्यूशन-नॉनकमर्शियल-शेअरअलाइक ४.० आंतरराष्ट्रीय परवान्यांतर्गत (CC BY-NC-SA 4.0) उपलब्ध आहे.

आपल्याला खालील गोष्टींची मुभा आहे:

- शेअर करणे -- कोणत्याही माध्यमातून किंवा स्वरूपात सामग्री कॉपी व वितरित करणे
- रूपांतर -- सामग्रीचे मिश्रण, रूपांतर व त्यावर आधारित नवीन सामग्री तयार करणे

खालील अटींच्या अधीन:

- श्रेयनिर्देश -- आपण योग्य श्रेय द्यावे, परवान्याची लिंक द्यावी, आणि बदल केले असल्यास ते नमूद करावे.
- अव्यावसायिक -- आपण या सामग्रीचा व्यावसायिक वापर करू शकत नाही.
- समान शेअरिंग -- आपण सामग्रीत बदल करून नवीन सामग्री तयार केल्यास, ती मूळ सामग्रीच्याच परवान्यांतर्गत वितरित करावी.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

परिचय

परिसराचा आढावा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU) परिसर, शहराच्या मध्यभागी असलेले ४११ एकर (१६६.३३ हेक्टर) क्षेत्रफळ असलेले जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे. 18.5529°N 73.8352°E अक्षांश-रेखांशावर, हा परिसर समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ५६० मीटर उंचीवर आहे.

कॅम्पसचे वातावरण

कॅम्पसमध्ये विविध अधिवास आहेत, जे विविध प्रकारच्या पक्ष्यांसाठी उपयुक्त आहेत. या भूभागात मूळ आणि विदेशी झाडे, गवताळ प्रदेश, लॉन, कृत्रिम जलाशय, बागा आणि इमारती आहेत. अधिवासांचे हे मिश्रण स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी उत्कृष्ट संधी प्रदान करते.

वनस्पती आणि झाडी

विद्यापीठाच्या परिसरात १५० हून अधिक प्रकारची झाडे आहेत, ज्यामुळे हे एक शहरी वन बनले आहे. वड (*Ficus benghalensis*), पिंपळ (*Ficus religiosa*), कडुळिंब (*Azadirachta indica*) आणि काटेसावर (*Bombax ceiba*) यांसारख्या मूळ प्रजाती भूभागावर वर्चस्व गाजवतात, तर शोभेची आणि आयात केलेली झाडे जसे आफ्रिकन ब्लॅकवुड (*Dalbergia melanoxylon*), रेन ट्री (*Samanea saman*), गुलमोहर (*Delonix regia*) आणि कॉपर पॉड (*Peltophorum pterocarpum*) विविधतेत भर घालतात. ही समृद्ध वनस्पती विविध पक्षी प्रजातींसाठी आवश्यक घरटी बांधण्याची जागा, निवारा आणि अन्नाचे स्रोत पुरवते.

मानवी हस्तक्षेप

कॅम्पस परिसंस्थेवर विविध मानवी क्रियाकलापांचा दबाव आहे, ज्यामुळे पक्ष्यांच्या लोकसंख्येवर परिणाम होतो:

- कॅम्पस रस्त्यावर नियमित वाहनांची वर्दळ
- चालू असलेली बांधकाम आणि विकासकामे
- मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती
- नियमित देखभाल क्रिया जसे बागकाम
- शहरी भागातून येणारे आवाज आणि धूळ प्रदूषण
- कॅम्पस इमारती आणि सुविधांमधून होणारे प्रकाश प्रदूषण

कधी पाहावे

दिवसाची वेळ:

- पहाटे (सकाळी ६:००-९:००): पक्षी नाश्त्यासाठी फिरत असल्याने सर्वाधिक क्रियाशील
- दुपारनंतर (दुपारी ४:००-६:३०): दुसरी Feeding ची activity
- मध्यान: Thermal currents वर उडणाऱ्या शिकारी पक्ष्यांना पाहण्यासाठी उत्तम
- संध्याकाळ: घुबडांसारख्या निशाचर प्रजाती सक्रिय होण्याची उत्तम वेळ

हंगामानुसार:

- हिवाळा (नोकेंबर-फेब्रुवारी): अनेक हिवाळी पाहण्यांमुळे सर्वोत्तम
- पावसाळा (जून-सप्टेंबर): Breeding activities पाहण्यासाठी सर्वोत्तम
- उन्हाळा (मार्च-मे): स्थानिक Breeding birds पाहण्यासाठी चांगला
- पावसाळ्यानंतर (ऑक्टोबर): स्थलांतरित पक्षी शोधण्याची संधी

आभार

SPPU कॅम्पसमधील पक्ष्यांची नोंद eBird द्वारे (SPPU eBird Hotspot) करण्यात ज्या पक्षी निरीक्षकांनी योगदान दिले त्यांचे विशेष आभार.

त्यांच्या पद्धतशीर नोंदीमुळे कॅम्पसमधील पक्ष्यांची विविधता आणि हंगामी बदल समजण्यास मदत झाली आहे.

कसे पाहावे

आवश्यक उपकरणे:

- दुर्बीण: नवशिक्यांसाठी 8 X 42 किंवा 10 X 42 उत्तम
- Field guide: Grimmett, Inskip & Inskip यांचे *Birds of the Indian Subcontinent*
- नोंदी घेण्यासाठी वही

उपयुक्त अॅप्स:

- eBird: नोंदी करण्यासाठी आणि हॉटस्पॉट एक्सप्लोर करण्यासाठी
- Merlin Bird ID: फोटो किंवा आवाजावरून पक्षी ओळखण्यास मदत करते
- BirdNet: AI-आधारित पक्ष्यांच्या आवाजाची ओळख

अधिक टिप्स

- आजूबाजूच्या वातावरणाशी जुळण्यासाठी माती रंगाचे कपडे वापरा
- पक्ष्यांना त्रास होऊ नये म्हणून हळू आणि शांतपणे चाला
- फ्लॅश फोटोग्राफी टाळा
- घरटी आणि Breeding areas पासून सुरक्षित अंतर ठेवा
- प्रत्येक Session नंतर eBird मध्ये आपल्या नोंदी रेकॉर्ड करा

या मार्गदर्शिकेबद्दल

या पुस्तिकेत विद्यापीठ परिसरात आढळणाऱ्या विविध पक्षी प्रजातींची माहिती आहे. कॅम्पसमधील नोंदवलेल्या सर्वसामान्य प्रजातींचा समावेश येथे केला आहे.

हा प्रकल्प <https://github.com/yogeshw/sppu-bird-guide> येथे उपलब्ध आहे. कृपया अद्यतनांसाठी इश्यू किंवा पुल विनंत्या पाठवाव्यात.

1. घार (*Milvus migrans*)



Size: घारीएवढा

Status: अतिनेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा शिकारी पक्षी. काटेरी शेपटी आणि लांब पंख हे वैशिष्ट्य. पंख काळसर तपकिरी, तळाशी किंचित फिकट.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र

Habits: उंच आकाशात गरगर फिरताना दिसते. लहान सस्तन प्राणी, पक्षी आणि मृत प्राणी खाते.

Nesting: डिसेंबर ते एप्रिल दरम्यान प्रजनन. उंच झाडांवर काढ्याकच्यापासून घरटे. २-३ पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी. दोन्ही पालक अंडी उबवतात.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML45127481



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML609495675

2. काळा शराटी (*Pseudibis papillosa*)

Size: घारीएवढा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा काळा पक्षी, मानेवर लाल पट्टा. लांब वाकडी चोच आणि डोक्यावरील उघडा लाल भाग ठळक.

Distribution: परिसरातील मोकळ्या जागा, गवताळ प्रदेश आणि पाणवठे

Habits: हळूहळू चालत शिकार करतो. लहान गटात आढळतो. कीटक आणि लहान प्राणी खातो.

Nesting: पावसाळ्यात प्रजनन. मोठ्या झाडांवर मंचासारखे घरटे. २-४ फिकट निळसर-पांढरी अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML303618951

3. बहिरी ससाणा (*Falco peregrinus*)

Size: घारीएवढा

Status: दुर्मिळ हिवाळी पाहुणा

Field characters: मोठा, शक्तिशाली ससाणा. वरचा भाग गडद करडा, खालून पट्टेदार. काळा 'मिशांसारखा' पट्टा विशिष्ट.

Distribution: कधीकधी उंच इमारती आणि मोकळ्या जागांमध्ये

Habits: वेगवान आणि चपळ शिकारी. हवेत भरारी मारून पकडतो.

Nesting: परिसरात प्रजनन करत नाही; फक्त हिवाळी पाहुणा.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126386591

4. शिक्रा (*Accipiter badius*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: छोटा ससाणा, लाल डोळे आणि पट्टेदार छाती विशिष्ट. वरून करडा, खालून पांढरा, तांबूस पट्ट्यांसह.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी आणि बागा

Habits: लहान पक्षी, सस्तन प्राणी आणि कीटक खातो. खूप चपळ शिकारी.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रेजनन काळ. झाडांवर काढ्या-पानांचे घरटे. 3-4 निळसर पांढरी अंडी.

5. पांढऱ्या छातीची पाणकोंबडी (*Amaurornis phoenicurus*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML614444237

Size: बुलबुलापेक्षा मोठी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मध्यम आकाराचा पक्षी. पांढरा चेहरा, गळा, छाती; गडद तपकिरी शरीर. चोचीजवळ लाल पट्टा.

Distribution: परिसरातील पाणवठे आणि दलदलीचे भाग

Habits: पाण्याजवळ राहते. कीटक, छोटे मासे आणि वनस्पती खाते.

Nesting: दाट वनस्पतीत घरटे. ४-६ क्रीमी पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी. दोन्ही पालक काळजी घेतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126568571

6. ढोकरी (*Ardeola grayii*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: अतिनेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मध्यम आकाराचा बगळा. तपकिरी शरीर, पांढरे पंख. पिवळी चोच आणि पाय.

Distribution: परिसरातील पाणवठे आणि दलदलीचे भाग

Habits: मासे, बेढूक आणि कीटक खातो. पाण्याजवळ बसून शिकार करतो.

Nesting: जून ते सप्टेंबर प्रजनन काळ. पाण्याजवळील झाडांवर घरटे. ३-५ फिकट निळी अंडी.

7. रात्र ढोकरी (*Nycticorax nycticorax*)

Size: कावळ्यापेक्षा मोठा

Status: दुर्मिळ स्थानिक

Field characters: मध्यम आकाराचा बगळा. काळी टोपी, पाठ; करडे पंख; पांढरा तळभाग. लाल डोळे, जाड चोच.

Distribution: परिसरातील पाणवठे आणि दलदलीचे भाग

Habits: रात्री सक्रिय. मासे, बेढूक आणि कीटक खातो.

Nesting: जून ते सप्टेंबर प्रजनन काळ. पाण्याजवळील झाडांवर घरटे. 3-5 फिकट निळसर अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML304986701



*Credit: Unknown - Unknown location Macaulay Library © Cornell
Lab of Ornithology ML608663702*

8. गवती बगळा (*Bubulcus ibis*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: अतिनेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मध्यम आकाराचा पांढरा बगळा. प्रजनन काळात डोके, छाती, पाठीवर केशरी पिसारे.

Distribution: परिसरातील गवताळ भाग आणि मोकळ्या जागा

Habits: गुरांच्या जवळपास राहतो. कीटक आणि लहान प्राणी खातो.

Nesting: जून ते सप्टेंबर प्रजनन काळ. वसाहतीत राहतो. 3-4 फिकट निळी अंडी.

9. छोटा बगळा (*Egretta garzetta*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मध्यम आकाराचा शुभ्र पांढरा बगळा. काळी चोच, काळे पाय, पिवळे पंजे.

Distribution: परिसरातील पाणवठे आणि दलदलीचे भाग

Habits: मासे, बेढूक आणि कीटक खातो. पाण्यात उभा राहून शिकार करतो.

Nesting: जून ते सप्टेंबर प्रजनन काळ. वसाहतीत राहतो. ३-५ फिकट निळसर अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML168489091



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML308065631

10. पारवा (*Columba livia*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: अतिनेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: जाडजूड करडा पक्षी. मानेवर इंद्रधनुषी पिसारे. पंखांवर दोन काळे पट्टे, शेपटीवर काळा पट्टा.

Distribution: परिसरातील इमारती आणि मोकळ्या जागा

Habits: कळपाने राहतो. जमिनीवरून धान्य वेचतो. शहरी जीवनाशी जुळवून घेतो.

Nesting: वर्षभर प्रजनन. इमारतींवर काढ्यांचे घरटे. २ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक काळजी घेतात.

11. ठिपकेवाला होला (*Streptopelia chinensis*)

Size: मैनेएवढा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: बारीक, लांब शेपटीचा पारवा. गुलाबी-करडा रंग. मानेवर विशिष्ट काळे-पांढरे ठिपके.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी आणि बागांमध्ये

Habits: नेहमी जोडीने किंवा छोट्या कळपात. जमिनीवर धान्य आणि बिया खातो.

Nesting: झाडे आणि झुडपांमध्ये सैल घरटे बांधतो. २ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १४-१६ दिवस अंडी उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML621165796



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML622010668

12. छोटा तपकिरी होला (*Streptopelia senegalensis*)

Size: मैनेपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान आणि नाजूक पारवा. फिकट तपकिरी रंग, मानेवर जांभळी छटा. मानेच्या बाजूंवर काळे-लाल चौकटी नमुना.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र, विशेषत: मोकळ्या भागात

Habits: नेहमी जोडीने दिसतो. जमिनीवर बिया वेचतो. गोड संगीतमय आवाज करतो.

Nesting: झुडपे आणि लहान झाडांवर साधे घरटे. २ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १३-१५ दिवस अंडी उबवतात.

13. टिटवी (*Vanellus indicus*)



Size: मैनेपेक्षा बरीच मोठी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठी टिटवी. डोऱ्यांसमोर लाल मांसल वाढ विशिष्ट. तपकिरी पंख, काळे डोके व छाती, पांढरा चेहरा व तळभाग.

Distribution: परिसरातील मोकळ्या भागात, विशेषत: पाणवठ्यांजवळ

Habits: "डिड-ही-झू-इट" या धोक्याच्या आवाजासाठी प्रसिद्ध. दिवसा-रात्री सक्रिय. कीटक व लहान प्राणी खाते.

Nesting: जमिनीवर उथळ खड्यात घरटे. खडकाळ भागात. ३-४ जैतूनी-तपकिरी अंडी. दोन्ही पालक २८-३० दिवस उबवतात.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126390831



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126392811

14. कोकीळ (*Eudynamys scolopacea*)

Size: कावळ्यापेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर चमकदार काळा, लाल डोळे. मादी तपकिरी, पांढरे ठिपके, खालून पट्टेदार. लिंगभेद स्पष्ट.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र, विशेषत: वृक्षराजीत

Habits: विशिष्ट "कू-ऊ" आवाजासाठी प्रसिद्ध. कावळ्यांच्या घरट्यात परजीवी. फळे व बेरी खातो.

Nesting: कावळे व इतर पक्ष्यांच्या घरट्यात परजीवी म्हणून अंडी घालतो.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML142648801

15. कारुण्य कोकीळ (*Cacomantis passerinus*)

Size: मैनेपेक्षा लहान

Status: उन्हाळी पाहुणा

Field characters: करडा पक्षी, छातीवर गडद करडा रंग, तळाशी फिकट. पिवळा डोऱ्याभोवतीचा कडा विशिष्ट.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत

Habits: लपून-छपून राहतो. हळुवार शिंटीसारखा आवाज करतो. मुख्यत: कीटक खातो.

Nesting: फुलपाखरे व शिंपी पक्ष्यांच्या घरव्यात परजीवी म्हणून अंडी घालतो.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133733311

16. पावश्या (*Hierococcyx varius*)

Size: मैनेपेक्षा बराच मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: शिक्र्यासारखा दिसणारा. खालून पट्टेदार. पिवळा डोऱ्याभोवतीचा कडा. उडताना शिक्र्यासारखा दिसतो.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत सर्वत्र

Habits: विशिष्ट "ब्रेन-फीवर" आवाजासाठी प्रसिद्ध. कीटक व अऱ्या खातो.

Nesting: सातभाई व इतर पक्ष्यांच्या घरट्यात परजीवी. मार्च ते जुलै दरम्यान सक्रिय.

17. भारद्वाज (*Centropus sinensis*)

Size: कावळ्याएवढा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा काळा पक्षी. केशरी पंख व लांब शेपटी. लाल डोळे व वाकडी काळी चोच विशिष्ट.

Distribution: परिसरातील दाट वनस्पतीत

Habits: लपून-छपून वावरतो. जमिनीवर चालताना दिसतो. खोल गुरुगुरण्याचा आवाज. कीटक व लहान प्राणी खातो.

Nesting: दाट वनस्पतीत जमिनीजवळ छतासारखे घरटे. ३-५ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १५-१६ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126393221



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML622584055

18. राजपोपट (*Psittacula krameri*)

Size: मैनेपेक्षा बराच मोठा

Status: अतिनेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: हिरवा पोपट, लांब शेपटी. नराच्या मानेभोवती गुलाबी व काळा पट्टा, मादीला नसतो.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र, विशेषतः वृक्षराजीत

Habits: आवाजी, कळपवासी. मोठ्या कळपात दिसतो. फळे, बिया व धान्य खातो.

Nesting: डिसेंबर ते मे प्रजनन. झाडांच्या पोकळीत घरटे. ३-४ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक २२-२४ दिवस उबवतात.

19. करण पोपट (*Psittacula eupatria*)

Size: कावळ्याएवढा

Status: दुर्मिळ स्थानिक

Field characters: राजपोपटापेक्षा मोठा. जाड लाल चोच. नराला गुलाबी व काळा गळपट्टा.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत, इतर पोपटांपेक्षा कमी

Habits: राजपोपटासारखीच सवय पण जास्त सावध. फळे व बिया खातो.

Nesting: मोठ्या जुन्या झाडांच्या पोकळीत घरटे. २-४ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक २३-२६ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133717151



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133932211

20. टोई पोपट (*Psittacula cyanocephala*)

Size: मैनेएवढा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नराचे डोके जांभळे-लाल, मादीचे निळसर-करडे. दोघांचेही शरीर हिरवे व पिवळट शेपटीचे टोक.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत नियमित

Habits: नेहमी जोडीने किंवा लहान कळपात. इतर पोपटांपेक्षा जास्त झाडावर राहतो. फळे व बिया खातो.

Nesting: झाडांच्या पोकळीत घरटे. काळ स्थानपरत्वे बदलतो. ३-४ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक २२-२४ दिवस उबवतात.

21. घर पाकोळी (*Apus affinis*)

Size: मैनेपेक्षा लहान

Status: अतिनेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान घारांडी, पांढरी कंबर व काटेरी शेपटी. गडद तपकिरी-काळा रंग.

Distribution: परिसरातील इमारतींच्या परिसरात

Habits: हवेत तरंगत राहणारा. मोठ्या कळपात इमारतींभोवती घिरव्या घालताना दिसतो.

Nesting: वसाहतीत राहणारा. इमारतींच्या छपराखाली मातीचे घरटे. २-३ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १९-२१ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML80511821



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126573081

22. ताड पाकोळी (*Cypsiurus balasiensis*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: घरच्या घारांडीपेक्षा लहान, बारीक शरीर व खोलगट काटेरी शेपटी. एकूण धुरकट तपकिरी.

Distribution: परिसरातील ताडाच्या झाडांभोवती

Habits: अतिशय वेगवान उड्डाणक्षम, क्वचितच बसतो. ताडाभोवती दिसतो. हवेतील कीटक खातो.

Nesting: वर्षभर प्रजनन. ताडाच्या पानाखाली लाळेने घरटे चिकटवतो. २-३ पांढरी अंडी घालतो.

23. पांढऱ्या छातीचा धीवर (*Halcyon smyrnensis*)



Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा खंड्या, चमकदार निळी पाठ, चॉकलेटी डोके व पांढरी छाती. मोठी लाल चोच ठळक.

Distribution: परिसरातील पाणवरे व बागा

Habits: ठळकपणे बसून राहतो, शिकारीसाठी झडप घालतो. मासे, बेढूक, सरडे व मोठे कीटक खातो.

Nesting: मार्च ते जून प्रजनन. जमिनीच्या कडेत भुयार खणून घरटे. ४-७ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक २०-२२ दिवस उबवतात.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126564101



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML168729731

24. सामान्य धीवर (*Alcedo atthis*)

Size: बुलबुलापेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान खंड्या, चमकदार निळी वरची बाजू व केशारी खालची बाजू, लांब चोच व छोटी शेपटी.

Distribution: परिसरातील पाणवठे व तलावांजवळ

Habits: पाण्यावर खाली बसून मासे पकडतो. शिकारीपूर्वी मान हलवतो.

Nesting: फेब्रुवारी ते एप्रिल प्रजनन. जमिनीच्या कडेत भुयार खणून घरटे. ५-७ पांढरी अंडी घालतो.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126561671

25. वेडा राघू (*Merops orientalis*)

Size: चिमणीपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: बारीक हिरवा पक्षी, निळा गळा, काळी डोऱ्यांची पट्टी. लांब मधली शेपटीची पिसे ठळक.

Distribution: परिसरातील विरळ झाडांच्या मोकळ्या भागात

Habits: सुंदर उड्हाणपटू, हवेत कीटक पकडतो. तारा व उघड्या फांद्यांवर बसतो.

Nesting: मार्च ते जून प्रजनन. जमिनीत भुयार खणून घरटे. ४-७ पांढरी अंडी घालतो.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126555661

26. तांबट (*Megalaima haemacephala*)

Size: बुलबुलापेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान, हिरवा पक्षी, किरमिजी कपाळ व गळा. पिवळा डोऱ्याभोवतीचा भाग ठळक.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत सर्वत्र

Habits: धातूसारख्या 'टुक-टुक-टुक' आवाजासाठी प्रसिद्ध. मुख्यत: फळे, विशेषत: उंबर खातो.

Nesting: मेलेल्या झाडांच्या खोडात किंवा फांदीत घरटे खणतो. २-४ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १३-१५ दिवस उबवतात.

27. धूसर कडा पंकोली (*Hirundo concolor*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान, गडद तपकिरी घारुळी, किंचित काटेरी शेपटी. एकसमान धुरकट रंग.

Distribution: परिसरातील इमारती व खडकाळ भागात

Habits: हवेत कीटक पकडणारी. इमारतींजवळ उडताना दिसते.

Nesting: इमारतींवर व खडकांवर मातीचे वाटीसारखे घरटे. २-३ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १४-१६ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133734741



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML312652671

28. माळ भिंगरी (*Hirundo rustica*)

Size: चिमणीएवढी

Status: सामान्य हिवाळी पाहुणा

Field characters: लांब, खोल काटेरी शेपटी. वर निळसर-काळी, कपाळ व गळा तांबूस, खालून फिकी.

Distribution: हिवाळ्यात परिसरातील मोकळ्या भागात

Habits: सुंदर उड्हाणपटू, हवेत कीटक पकडते. तारांवर बसते.

Nesting: परिसरात प्रजनन करत नाही; फक्त हिवाळी पाहुणी.

29. लाल पुढ्याची भिंगरी (*Hirundo daurica*)

Size: चिमणीएवढी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: होलोखेल घारूळीसारखी पण तांबूस कंबर व छोट्या शेपटीची पिसे.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र, विशेषत: इमारतींजवळ

Habits: हवेत कीटक पकडणारी, इतर घारूळींच्या कळपात मिसळते.

Nesting: इमारतींखाली बाटलीसारखे मातीचे घरटे. 3-4 पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १४-१६ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML625261168



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133941481

30. तारबाली भिंगरी (*Hirundo smithii*)

Size: चिमणीएवढी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: ठळक तारेसारखी लांब शेपटीची पिसे. चमकदार निळसर-काळी वर, पांढरी खाली.

Distribution: परिसरातील पाणवठे व मोकळ्या जागा

Habits: सुंदर उड्हाणपटू, तारांवर बसते. हवेतील कीटक खाते.

Nesting: पुलांखाली व इमारतींवर मातीचे वाटीसारखे घरटे. २-३ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १४-१६ दिवस उबवतात.

31. लांब शेपटीचा खाटीक (*Lanius schach*)

Size: बुलबुलापेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: करडा-तपकिरी वरचा भाग, खालून पांढरा. डोऱ्यातून काळी पट्टी. लांब टोकदार शेपटी.

Distribution: परिसरातील विरळ झाडी असलेले मोकळे भाग

Habits: ठळक जागी बसून शिकार करतो. शिकार काढ्यांवर टोचून ठेवतो. कीटक, सरडे व लहान पक्षी खातो.

Nesting: काटेरी झुडपात नीटनेटके घरटे बांधतो. ३-६ पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी. दोन्ही पालक १५-१६ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133755601



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML258102271

32. हळदा (*Oriolus oriolus*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर सोनेरी पिवळा, काळे पंख व शेपटी. मादी फिकट हिरवी.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत

Habits: लाजाळू स्वभाव, वृक्षमुकुटात राहतो. गोड बासरीसारखा आवाज. फळे व कीटक खातो.

Nesting: झाडाच्या फांदीवर झोळीसारखे घरटे. २-४ पांढरी, तांबूस ठिपक्यांची अंडी. दोन्ही पालक १४-१६ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126548371

33. कोतवाल (*Dicrurus macrocercus*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: चमकदार काळा पक्षी, काटेरी शेपटी. जाड वाकडी चोच.

Distribution: परिसरातील मोकळ्या झाडांच्या भागात

Habits: धाडसी व आक्रमक. इतर पक्ष्यांचा पाठलाग करतो. हवेत कीटक पकडण्यात तरबेज.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. बाह्य फांदीवर वाटीसारखे घरटे. 3-5 गुलाबी-पांढरी, तांबूस ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133717951

34. राखी कोतवाल (*Dicrurus leucophaeus*)

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: हिवाळी पाहुणा

Field characters: कृष्ण भारद्वाजासारखा पण एकूण करडा रंग. कमी काटेरी शेपटी.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत हिवाळ्यात

Habits: कृष्ण भारद्वाजापेक्षा कमी आक्रमक. हवेत व पानांमधून कीटक पकडतो.

Nesting: परिसरात प्रजनन करत नाही; फक्त हिवाळी पाहुणा.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML97324171

35. साळुंकी (*Acridotheres tristis*)

Size: मैना

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: तपकिरी शरीर, काळे डोके, पिवळी चोच व पाय. उडताना पंखांवर पांढरे पट्टे दिसतात.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र विपुल

Habits: धीट, जुळवून घेणारा पक्षी. जोडीने किंवा कळपात दिसतो. सर्व प्रकारचे अन्न खातो.

Nesting: झाडांच्या व इमारतींच्या पोकळीत घरटे. ४-६ निळसर-हिरवी अंडी. दोन्ही पालक १३-१५ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126402031

36. जंगली मैना (*Acridotheres fuscus*)

Size: मैना

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: सामान्य मैनेसारखी पण अधिक करडी. चोचीजवळ पिसांची झुपके. नारिंगी-पिवळी चोच व पाय.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागा, शहरी भागात कमी

Habits: नेहमी जोडीने किंवा छोट्या कळपात. सामान्य मैनेपेक्षा जास्त झाडावर राहते. कीटक व फळे खाते.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. झाडांच्या पोकळीत घरटे. ४-५ फिकट निळी अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133728841

37. भांगपाडी मैना (*Sturnia pagodarum*)

Size: मैना

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: विशिष्ट बदामी रंगाची मैना, काळी टोपी, करडे पंख व पांढरा तळभाग.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये

Habits: जोडीने किंवा छोट्या कळपात दिसते. फळे, बेरी व कीटक खाते.

Nesting: एप्रिल ते जुलै प्रजनन. झाडांच्या व इमारतींच्या पोकळीत घरटे. 3-5 फिकट निळी अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126371181

38. दयाळ (*Copsychus saularis*)

Size: बुलबुल

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर काळा-पांढरा ठळक रंगसंगती, मादी अधिक करडी. लांब शेपटी वर धरतो.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये सर्वत्र

Habits: धीट व गोड आवाजी गायक. कीटक व बेरी खातो.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. झाडांच्या व इमारतींच्या पोकळीत घरटे. ४-५ हिरवट-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.

39. पांढऱ्या कंठाची नाचण (*Rhipidura albogularis*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML143852871

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान काळा-पांढरा पक्षी, ठिपकेदार छाती, पांढरी भुवई व पंख्यासारखी शेपटी पसरून ठेवतो.

Distribution: परिसरातील दाट झाडी असलेले भाग

Habits: चपळ व कसरती, कीटक पकडताना शेपटी पसरतो. हवेत छोटी उड्हाणे करून कीटक पकडतो.

Nesting: मुख्यत: मार्च ते सप्टेंबर प्रजनन. झाडाच्या फांदीवर नीटनेटके वाटीसारखे घरटे. २-३ क्रीम रंगाची, तांबूस ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126372681

40. कवड्या गप्पीदास (*Saxicola caprata*)

Size: बुलबुलापेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर काळा, पांढरी कंबर व पंखांवर पट्टे; मादी तपकिरी, खालून फिकी.

Distribution: परिसरातील विरळ झुडपे असलेले मोकळे भाग

Habits: झुडपे व कुंपणांवर ठळकपणे बसतो. छोटी उड्डाणे करून कीटक पकडतो.

Nesting: मार्च ते ऑगस्ट प्रजनन. गवतात व झुडपात वाटीसारखे घरटे. 3-4 फिकट निळसर-हिरवी, तांबूस ठिपक्यांची अंडी.

41. लाल बुड्या बुलबुल (*Pycnonotus cafer*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML300203931

Size: बुलबुल

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: गडद तपकिरी-काळा पक्षी, खवल्यांसारखी रचना, लाल मूळशेपटी व काळी शिखा विशिष्ट.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र

Habits: सक्रिय व आवाजी. जोडीने किंवा लहान कळपात. फळे व कीटक खातो.

Nesting: वर्षभर प्रजनन, फेब्रुवारी ते मे शिखर. झुडपात वाटीसारखे घरटे. २-३ गुलाबी-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी. दोन्ही पालक १४ दिवस उबवतात.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML311377551

42. शिपाई बुलबुल (*Pycnonotus jocosus*)

Size: बुलबुल

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: तपकिरी वरचा भाग, पांढरा खालचा भाग. लाल कानपट्टी व टोकदार काळी शिखा विशिष्ट.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये

Habits: जीवंत पक्षी, गोड आवाजी. नेहमी जोडीने. फळे व कीटक खातो.

Nesting: झुडपात व लहान झाडांवर नीटनेटके वाटीसारखे घरटे. २-३ गुलाबी-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी. दोन्ही पालक १२-१४ दिवस उबवतात.

43. राखी सातभाई (*Turdoides malcolmi*)



Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: करडा-तपकिरी पक्षी, फिकट रेघा. लांब टप्प्याटप्प्यांची शेपटी व वाकडी चोच.

Distribution: परिसरातील मोकळी झुडपे व बागा

Habits: गटाने राहतो, आवाजी. जमिनीवर पाने उलटून कीटक व बेरी खातो.

Nesting: मार्च ते सप्टेंबर प्रजनन. काटेरी झुडपात अस्ताव्यस्त घरटे. 3-4 निळसर अंडी. गटातील सदस्य मदत करतात.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133742581



Credit: Unknown - Unknown location Macaulay Library © Cornell
Lab of Ornithology ML133939821

44. टिकेलची निळी माशीमार (*Muscicapa tickelliae*)

Size: बुलबुलापेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर चमकदार निळा वरून, तांबूस खालून. मादी फिकट.

Distribution: परिसरातील दाट झाडीच्या भागात

Habits: सक्रिय पक्षी, बसल्या जागेवरून छोटी उड्डाणे करून कीटक पकडतो. गोड शिंटीसारखा आवाज.

Nesting: एप्रिल ते जुलै प्रजनन. झाडाच्या पोकळीत किंवा फटीत नीटनेटके वाटीसारखे घरटे. 3-4 फिकट अंडी, तपकिरी ठिपके.

45. राखी वटवट्या (*Prinia socialis*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: राखाडी वरचा भाग, पांढरा खालचा भाग. लांब टप्प्याटप्प्यांची शेपटी वर करून धरतो.

Distribution: परिसरातील बागा व झुडपांच्या भागात

Habits: सक्रिय पक्षी, वनस्पतीतून कर्कश आवाज करत फिरतो.

Nesting: मुख्यत: जून ते सप्टेंबर प्रजनन. गवतात व झुडपात खोल वाटीसारखे घरटे. 3-५ विटकरी अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126403561



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML150322831

46. रान वटवट्या (*Prinia sylvatica*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: करडा-तपकिरी वरचा भाग, फिकट खालचा भाग. राखी वटवट्यापेक्षा गडद.

Distribution: परिसरातील गवताळ व झुडपाळ भाग

Habits: लपून-छपून राहतो, मोठ्या आवाजाने ओळख करून देतो.

Nesting: जून ते सप्टेंबर प्रजनन. गवताच्या झुंबरात चेंडूसारखे घरटे. 3-5 हिरवट-पांढरी अंडी.

47. शिंपी (*Orthotomus sutorius*)

Size: चिमणीपेक्षा बराच लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: छोटा सुतार पक्षी, लांब उभी शेपटी. जैतुनी-हिरवा वरचा भाग, पांढरा खालचा भाग, तांबूस टाळू.

Distribution: परिसरातील बागा व दाट झुडपांच्या भागात

Habits: सक्रिय पक्षी, सतत वनस्पतीतून फिरत राहतो. मोठा 'टू-विट टू-विट' आवाज.

Nesting: मुख्यत: मे ते सप्टेंबर प्रजनन. जिवंत पानांना शिवून अद्भुत घरटे बनवतो. 3-5 तांबूस-पांढरी, ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126406831



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML256739411

48. छोटा शुभ्रकंठी वटवट्या (*Sylvia curruca*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: सामान्य हिवाळी पाहुणा

Field characters: छोटा सुतार पक्षी, करडा-तपकिरी वरचा भाग, पांढरा गळा व खालचा भाग. डोऱ्यातून काळी पट्टी.

Distribution: परिसरातील झुडपे व झाडीत

Habits: सक्रिय पण लपून राहणारा. झुडपात कीटक शोधतो. खडखडणारा विशिष्ट आवाज.

Nesting: परिसरात प्रजनन करत नाही; फक्त हिवाळी पाहुणा.

49. चिमणी (*Passer domesticus*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML305880301

Size: चिमणी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर करडा-तपकिरी, काळा गळपट्टा व तांबूस मान; मादी एकसमान तपकिरी.

Distribution: परिसरातील इमारती व मानवी वस्तीजवळ

Habits: कळपवासी, मुख्यतः धान्य व बिया खाते.

Nesting: जवळपास वर्षभर प्रजनन. इमारतींच्या पोकळीत घरटे. ४-६ पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133720591

50. सुगरण (*Ploceus philippinus*)

Size: चिमणी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: प्रजननकाळात नर चमकदार पिवळा, तपकिरी पाठ; मादी चिमणीसारखी.

Distribution: परिसरातील गवताळ भाग व बोरूची झाडी

Habits: वसाहतीत राहतो. नर कलात्मक लोंबती घरटी बांधतो. गवताचे बी खातो.

Nesting: पावसाळ्यात प्रजनन. नर अनेक टोपीसारखी घरटी बांधतो. २-४ पांढरी अंडी.

51. चरक (*Copsychus fulicatus*)

Size: चिमणी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर चमकदार काळा, पंखांवर पांढरे पट्टे. मादी तपकिरी. शेपटी नेहमी वर धरून असतो.

Distribution: परिसरातील मोकळे भाग व झुडपाळ प्रदेश

Habits: जमिनीवर सक्रिय, वारंवार शेपटी वर करतो. गोड आवाज व शिट्ट्या वाजवतो.

Nesting: मार्च ते सप्टेंबर प्रजनन. भिंतीच्या भेगा व जमिनीत घरटे. २-४ पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126370921



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126366191

52. चमोवाला (*Zosterops palpebrosus*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: छोटा जैतुनी-हिरवा पक्षी, डोळ्याभोवती पांढरा कडा विशिष्ट. पिवळा गळा व शेपटीखालचा भाग.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये

Habits: चपळ व कसरती. छोट्या कळपात पानांमध्ये फिरतो. कीटक व मधुरस खातो.

Nesting: मार्च ते सप्टेंबर प्रजनन. झाडाच्या फांदीवर नीटनेटके वाटीसारखे घरटे. 2-४ फिकट निळी अंडी.

53. ठिपकेवाली मनोली (*Lonchura punctulata*)



Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: लहान तपकिरी फिंच, छातीवर खवल्यांसारखी रचना. जाड छोटी चोच.

Distribution: परिसरातील गवताळ व झुडपाळ भाग

Habits: कळपाने राहते, गवताचे बी खाते. गोड चिवचिव आवाज.

Nesting: जुलै ते ऑक्टोबर प्रजनन. काटेरी झुडपात मोठे चेंडूसारखे घरटे. ४-६ पांढरी अंडी.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML97646291



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126547471

54. टकाचोर (*Dendrocitta vagabunda*)

Size: मैनेपेक्षा बराच मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा तांबूस व काळा पक्षी, लंब टप्प्याटप्प्यांची शेपटी. करडी मान व पांढऱ्या टोकांची शेपटी विशिष्ट.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत

Habits: धीट व कुतूहली. लहान गटात दिसतो. फळे, कीटक व लहान प्राणी खातो.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. झाडाच्या फांदीवर नीटनेटके वाटीसारखे घरटे. ३-५ हिरवट-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126364891

55. कावळा (*Corvus splendens*)

Size: कावळा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: करडा व काळा कावळा, विशिष्ट करड्या मानेचा पट्टा.

Distribution: परिसरातील सर्वत्र, विशेषत: मानवी वस्तीजवळ

Habits: धीट व बुद्धिमान. सर्व प्रकारचे अन्न खातो.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. झाडांवर मंचासारखे घरटे. ४-५ फिकट निळसर-हिरवी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML85864161

56. डोमकावळा (*Corvus macrorhynchos*)

Size: कावळ्यापेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: शहरी कावळ्यापेक्षा मोठा, संपूर्ण काळा, जाड चोच. एकांडा स्वभाव.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत व आजूबाजूच्या भागात

Habits: शहरी कावळ्यापेक्षा सावध. एकटा किंवा जोडीने दिसतो. सर्व प्रकारचे अन्न खातो.

Nesting: मार्च ते जून प्रजनन. उंच झाडांवर मोठे मंचासारखे घरटे. ३-५ फिकट हिरवी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.

57. पिंगळा (*Athene brama*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133939511

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: छोटा, जाडजूळ घुबड, पांढरे ठिपके. मोठे पिवळे डोळे व पांढऱ्या भुवया त्याला गंभीर चेहरा देतात.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये

Habits: पहाटे व संध्याकाळी सक्रिय. जागरूक असताना मान हलवतो. कीटक व लहान प्राणी खातो.

Nesting: फेब्रुवारी ते एप्रिल प्रजनन. झाडांच्या पोकळीत व जुन्या इमारतींमध्ये घरटे. 3-5 पांढरी अंडी. नर अन्न आणतो, मादी 28-30 दिवस अंडी उबवते.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML145988711

58. ठिपकेवाले वन घुबड (Strix ocellata)

Size: कावळ्यापेक्षा मोठा

Status: दुर्मिळ स्थानिक

Field characters: मोठा घुबड, विशिष्ट ठिपकेदार तपकिरी पिसारा. गोल डोके, कान-शिखा नाहीत. काळे डोळे, पिवळट-हिरवी चोच.

Distribution: परिसरातील दाट वृक्षराजीच्या भागात

Habits: पूर्णपणे रात्रीचर. रात्री खोल आवाज करतो. उंदीर, पक्षी व मोठे कीटक खातो.

Nesting: डिसेंबर ते मार्च प्रजनन. झाडांच्या नैसर्गिक पोकळीत घरटे. २-३ पांढरी अंडी. नर अन्न आणतो, मादी अंडी उबवते.

59. भारतीय राखी धनेश (*Ocyceros birostris*)



Size: कावळा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा करडा पक्षी, लांब शेपटी व टोपीसारखी वाढ चोचीवर. मादीची टोपी लहान.

Distribution: परिसरातील मोठी जुनी झाडे असलेल्या भागात

Habits: नेहमी जोडीने झाडावरून झाडावर जातो. मुख्यत: फळे, विशेषत: उंबर खातो.

Nesting: मार्च ते जून प्रजनन. मादी स्वतःला झाडाच्या पोकळीत कोंडून घेते, एक छोटी फट सोडते. नर तिला व पिलांना खाऊ घालतो. २-४ पांढरी अंडी.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133738511



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126556251

60. भारतीय नीलपंख (*Coracias benghalensis*)

Size: मैनेपेक्षा बराच मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: कावळ्याएवढा पक्षी, चमकदार निळे पंख व शेपटी. तपकिरी डोके व पाठ.

Distribution: परिसरातील विरळ झाडी असलेल्या मोकळ्या भागात

Habits: ठळक जागी बसून राहतो, हवेत नाट्यमय लोंबकळत झेप घेतो. मोठे कीटक व लहान सरडे खातो.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. झाडांच्या पोकळीत घरटे. ३-५ पांढरी अंडी. दोन्ही पालक १७-१९ दिवस उबवतात.

61. काळ्या डोक्याचा कोकील-खाटिक (*Coracina melanoptera*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML265163661

Size: मैनेपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर करडा, काळे डोके; मादी करडी, फिकट आडव्या रेघांसह.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये

Habits: पद्धतशीरपणे पानांमध्ये कीटक शोधतो. इतर शिकारी पक्ष्यांच्या कळपात मिसळतो.

Nesting: एप्रिल ते जुलै प्रजनन. फांदीवर छोटे वाटीसारखे घरटे. २-३ करडी-हिरवट, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133939181

62. छोटा गोमेट (*Pericrocotus cinnamomeus*)

Size: चिमणी

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नर काळा व नारिंगी; मादी करडी व पिवळी. दोघांनाही लांब शेपटी.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजीत सर्वत्र

Habits: सक्रिय, छोट्या कळपात वृक्षमुकुटात फिरतो. गोड शिंदीसारखा आवाज.

Nesting: मार्च ते जून प्रजनन. फांदीवर छोटे वाटीसारखे घरटे. 2-4 फिकट हिरवी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.

63. टिकेलचा फुलटोचा (*Dicaeum erythrorhynchos*)



Credit: Unknown - Unknown location Macaulay Library © Cornell
Lab of Ornithology ML126373401

Size: चिमणीपेक्षा बराच लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: अतिलहान पक्षी, करडा-तपकिरी वर, मळकट पांदरा खाली. छोटी शेपटी व वाकडी चोच.

Distribution: परिसरातील फुले व फळे असलेल्या झाडांवर

Habits: अत्यंत सक्रिय, फुलांमध्ये झापाझाप फिरतो. बेरी व मधुरस खातो.

Nesting: वर्षभर प्रजनन, मार्च ते मे शिखर. नाशपातीसारखे लटकते घरटे. २-३ पांदरी अंडी. दोन्ही पालक पिलांची काळजी घेतात.



64. करडा धोबी (*Motacilla cinerea*)

Size: चिमणी

Status: सामान्य हिवाळी पाहुणा

Field characters: बारीक पक्षी, लांब शेपटी, करडा वरचा भाग व पिवळा खालचा भाग. सतत शेपटी हलवत राहतो.

Distribution: परिसरातील पाणवठे व ओलसर भागात

Habits: सक्रिय शिकारी, धावत-चालत शेपटी हलवत राहतो. जमिनीवरून व हवेतून कीटक पकडतो.

Nesting: परिसरात प्रजनन करत नाही; फक्त हिवाळी पाहुणा.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML44950691

65. पांढरा धोबी (*Motacilla alba*)



Size: चिमणी

Status: सामान्य हिवाळी पाहुणा

Field characters: काळा-पांढरा पक्षी, करडी पाठ, पांढरा चेहरा व खालचा भाग. सतत शेपटी हलवतो.

Distribution: परिसरातील मोकळ्या जागा, गवताळ भाग व पाणवठ्यांजवळ

Habits: सुंदर चालत जमिनीवर फिरतो, शेपटी हलवत राहतो. कीटक व लहान जीव खातो.

Nesting: परिसरात प्रजनन करत नाही; फक्त हिवाळी पाहुणा.

Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML4458621



Credit: Unknown Unknown location Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126385911

66. पांढऱ्या भुवईचा धोबी (*Motacilla maderaspatensis*)

Size: चिमणीपेक्षा मोठा

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: मोठा काळा-पांढरा हलवा, ठळक पांढरी भुवई. लांब शेपटी सतत वर-खाली हलवतो.

Distribution: परिसरातील पाणवठे व मोकळ्या जागा

Habits: सक्रिय शिकारी, धावत-चालत शेपटी हलवत राहतो. नेहमी जोडीने दिसतो.

Nesting: मार्च ते सप्टेंबर प्रजनन. भिंतींच्या व कड्यांच्या भेगांमध्ये वाटीसारखे घरटे. ३-४ करडी-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.

67. सुभग (*Aegithina tiphia*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126386161

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: प्रजननकाळात नर चमकदार पिवळा व काळा; इतर वेळी व मादी हिरवट-पिवळी. पांढरे पंखपट्टे विशिष्ट.

Distribution: परिसरातील दाट वृक्षराजी असलेल्या भागात

Habits: सक्रिय पक्षी, सतत पानांमध्ये फिरत राहतो. गोड संगीतमय आवाज. मुख्यत: कीटक खातो.

Nesting: एप्रिल ते सप्टेंबर प्रजनन. फांदीत नीटनेटके वाटीसारखे घरटे. २-३ गुलाबी अंडी, तपकिरी ठिपके.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML133732751

68. कवडी रामगंगा (*Parus cinereus*)

Size: चिमणीपेक्षा लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: छोटा करडा पक्षी, काळी टोपी व गळा, पांढरे गाल व खालचा भाग.

Distribution: परिसरातील वृक्षराजी व बागांमध्ये

Habits: सक्रिय व कसरती, कीटक पकडताना उलटा लटकतो. कीटक व बिया खातो.

Nesting: मार्च ते जुलै प्रजनन. झाडांच्या पोकळीत घरटे. ४-६ पांढरी, लाल-तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.

69. जांभळा शिंजीर (*Cinnyris asiaticus*)



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126385421

Size: चिमणीपेक्षा बराच लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: प्रजननकाळात नर चमकदार जांभळा-काळा; इतर वेळी व मादी जैतुनी-तपकिरी वर, पिवळी खाली.

Distribution: परिसरातील फुलझाडे असलेल्या भागात

Habits: अत्यंत सक्रिय, फुलांसमोर तरंगतो. लांब वाकडी चोच मधुरसासाठी. लहान कीटकही पकडतो.

Nesting: मुख्यत: फेब्रुवारी ते मे प्रजनन. झोळीसारखे लटकते घरटे. २-३ हिरवट-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.



Credit: Macaulay Library © Cornell Lab of Ornithology ML126401131

70. जांभळ्या पुढ्याचा शिंजीर (*Leptocoma zeylonica*)

Size: चिमणीपेक्षा बराच लहान

Status: नेहमी आढळणारा स्थानिक

Field characters: नराचा वरचा भाग चमकदार जांभळा-निळा, पोट पिवळे. मादी जैतुनी वर, पिवळी खाली.

Distribution: परिसरातील बागा व फुलझाडे असलेल्या भागात

Habits: जांभळ्या सूर्यपक्ष्यासारखाच सक्रिय, फुलांसमोर तरंगतो. मधुरस व लहान कीटक खातो.

Nesting: वर्षभर प्रजनन. प्रवेशद्वारासह झोळीसारखे घरटे. २ हिरवट-पांढरी, तपकिरी ठिपक्यांची अंडी.

सूची

प्राणी

<i>Accipiter badius</i>	12
<i>Acridotheres fuscus</i>	44
<i>Acridotheres tristis</i>	43
<i>Aegithina tiphia</i>	75
<i>Alcedo atthis</i>	32
<i>Amaurornis phoenicurus</i>	13
<i>Apus affinis</i>	29
<i>Ardeola grayii</i>	14
<i>Athene brama</i>	65
<i>Bubulcus ibis</i>	16
<i>Cacomantis passerinus</i>	23
<i>Centropus sinensis</i>	25
<i>Cinnyris asiaticus</i>	77
<i>Columba livia</i>	18
<i>Copsychus fulicatus</i>	59
<i>Copsychus saularis</i>	46
<i>Coracias benghalensis</i>	68
<i>Coracina melanoptera</i>	69
<i>Corvus macrorhynchos</i>	64
<i>Corvus splendens</i>	63
<i>Cypsiurus balasiensis</i>	30

<i>Dendrocitta vagabunda</i>	62
<i>Dicaeum erythrorhynchos</i>	71
<i>Dicrurus leucophaeus</i>	42
<i>Dicrurus macrocercus</i>	41
<i>Egretta garzetta</i>	17
<i>Eudynamys scolopacea</i>	22
<i>Falco peregrinus</i>	11
<i>Halcyon smyrnensis</i>	31
<i>Hierococcyx varius</i>	24
<i>Hirundo concolor</i>	35
<i>Hirundo daurica</i>	37
<i>Hirundo rustica</i>	36
<i>Hirundo smithii</i>	38
<i>Lanius schach</i>	39
<i>Leptocoma zeylonica</i>	78
<i>Lonchura punctulata</i>	61
<i>Megalaima haemacephala</i>	34
<i>Merops orientalis</i>	33
<i>Milvus migrans</i>	9
<i>Motacilla alba</i>	73
<i>Motacilla cinerea</i>	72
<i>Motacilla maderaspatensis</i>	74
<i>Muscicapa tickelliae</i>	52
<i>Nycticorax nycticorax</i>	15
<i>Ocyceros birostris</i>	67
<i>Oriolus oriolus</i>	40
<i>Orthotomus sutorius</i>	55
<i>Parus cinereus</i>	76
<i>Passer domesticus</i>	57
<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	70
<i>Ploceus philippinus</i>	58
<i>Prinia socialis</i>	53
<i>Prinia sylvatica</i>	54

<i>Pseudibis papillosa</i>	10
<i>Psittacula cyanocephala</i>	28
<i>Psittacula eupatria</i>	27
<i>Psittacula krameri</i>	26
<i>Pycnonotus cafer</i>	49
<i>Pycnonotus jocosus</i>	50
<i>Rhipidura albogularis</i>	47
<i>Saxicola caprata</i>	48
<i>Streptopelia chinensis</i>	19
<i>Streptopelia senegalensis</i>	20
<i>Strix ocellata</i>	66
<i>Sturnia pagodarum</i>	45
<i>Sylvia curruca</i>	56
<i>Turdoides malcolmi</i>	51
<i>Vanellus indicus</i>	21
<i>Zosterops palpebrosus</i>	60

□

करडा धोबी	72
करण पोपट	27
कवडी रामगंगा	76
कवड्या गण्डीदास	48
कारुण्य कोकीळ	23
काळा शराटी	10
काळ्या डोक्याचा कोकीळ-खाटिक	69
कावळा	63
कोकीळ	22
कोतवाल	41
गवती बगळा	16
घर पाकोळी	29
घार	9
चरक	59
चष्मेवाला	60

चिमणी	57
छोटा गोमेट	70
छोटा तपकिरी होला	20
छोटा बगळा	17
छोटा शुभ्रकंठी वटवट्या	56
जंगली मैना	44
जांभळा शिंजीर	77
जांभळ्या पुढूयाचा शिंजीर	78
टकाचोर	62
टिकेलचा फुलटोचा	71
टिकेलची निळी माशीमार	52
टिटवी	21
टोई पोपट	28
ठिपकेवाला होला	19
ठिपकेवाली मनोली	61
ठिपकेवाले वन घुबड	66
डोमकावळा	64
ढोकरी	14
तांबट	34
ताड पाकोळी	30
तारखाली भिंगरी	38
दयाळ	46
धूसर कडा पंकोळी	35
पांढरा धोबी	73
पांढऱ्या कंठाची नाचण	47
पांढऱ्या छातीचा धीवर	31
पांढऱ्या छातीची पाणकोंबडी	13
पांढऱ्या भुबईचा धोबी	74
पारवा	18
पावश्या	24
पिंगळा	65

बहिरी ससाणा	11
भांगपाडी मैना	45
भारतीय नीलपंख	68
भारतीय राखी धनेश	67
भारद्वाज	25
माळ भिंगरी	36
राखी कोतवाल	42
राखी वटवट्या	53
राखी सातभाई	51
राजपोपट	26
रात्र ढोकरी	15
रान वटवट्या	54
लांब शेपटीचा खाटीक	39
लाल पुढ्याची भिंगरी	37
लाल बुऱ्या बुलबुल	49
वेडा राघू	33
शिंपी	55
शिक्रा	12
शिपाई बुलबुल	50
सामान्य धीवर	32
साळुंकी	43
सुगरण	58
सुभग	75
हळ्या	40