


משקולות - פ"ק


3: איפה



left - data = 0

right - data = 0

1: כן פ"ק



1: לא


$A = 25$, $B = 6$, $C = 19$, $E = 11$: לא, tree נכון, right something נ"ע

2: כן פ"ק

ls = 6

rs = 0

1: לא



$A = 72$, $B = 6$, $C = 30$, $E = 11$: לא, tree נכון, right secret נ"ע


כֹּחַ

לֹא יָדָע

כֹּחַ

1 1 2 3 5 6 16 34 $\Leftarrow$

אכן מסתבר עליו!



לֹא יָדָע

something - כוונתך על ביטויי השיטה something מתירה לך אמר true טוטר

כל ערך של צומת בך שווה לסכום של שני הילדים שלו.

במקרה שיש רק אחד אחד והילדים ערך האם יהיה זהה לערך הילד וכן"ס.

טוטר קל וכן השיטה נכונה true במקרה שיש רופה יותר false

secret - כוונתך על ביטויי השיטה secret מתירה לך אמר true טוטר כל צומת שני

ילדים הם עלים או אחד מהם עלה והשני אלה שווה לסכום הילדים, אך טוטר הילדים אלים

אלה הערך הצומת שווה לסכום הילדים ככל 2.

במקרה בו קל וכן יותר true במקרה של ישרו מאחז והילדים יותר false

:4 פיו

:K P.O

 $list1 = -6 \leftrightarrow -5 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 9 \leftrightarrow 10 \leftrightarrow 14 \leftrightarrow 15$
↑
first
 $list2 = 20 \leftrightarrow 15 \leftrightarrow 12 \leftrightarrow 11 \leftrightarrow 10 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow -5$
↑
second

: list1, what on (list2)

הוולנו שולח!

newlist = -5 ↔ 1 ↔ 7 ↔ 10 ↔ 15

temp = 5 7 10 15

:5 P.O

: list2, what on (list1)

 $list2 = 15 \leftrightarrow 10 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow -5$

:E P.O

ושינוי מה what מקבל (ברמת) ושינוי בסדר יורד ממש ופילגל על (שינוי) בסדר

עליו ממש, ושינוי מחזירה (שינוי) שיוט מחזירה בסדר עליו ממש ומסרה

נא (איברים) ומשומם בין (השינוי).

במקרה בו אין איברים משומם (לעזר) ושינוי (קרי).

מא (שינוי) גזל נקרי יונת (שינוי) נקרי.

פג 3.

תנאי:

list1 = 1 ⇄ 2 ⇄ 5 ⇄ 7 ⇄ 8 ⇄ 9 ⇄ 11 ⇄ 12 ⇄ 14 ⇄ 19

list2 = 19 ⇄ 18 ⇄ 12 ⇄ 11 ⇄ 10 ⇄ 9 ⇄ 7 ⇄ 5 ⇄ 2 ⇄ 0

secret91 - הסודיות

temp = list1, while (list2):

19 ⇄ 12 ⇄ 11 ⇄ 9 ⇄ 7 ⇄ 5 ⇄ 2

אם (הערך 7) אינו נמצא ברשימה list3, נוסף אליו את הערך.

ולחץ קיבוצי list3 נוסף (אם צריך):

list3 = 19 ⇄ 12 ⇄ 11 ⇄ 9 ⇄ 7 ⇄ 5 ⇄ 2

פג 4:

השיטה secret91 מקבלת כפרמטר 2 רשימות ופועלת על רשימה אחת ומחזירה רשימה בלתי נגזרת.

המטרה היא למצוא את כל המספרים הנמצאים בין שתי רשימות.

בהתבוננות בן אופן אחר מראה / שמונה מחרש-מחרש ויקח יותר רשימה ויקח.

$\therefore$ office

$$A_{an} = \text{new } A() \quad .1c$$

$((B) \alpha_n)_{\text{fow}}$

A

שג'אד - ר'צ"ה, מנחם קוממליצ'י, ויקוממלי קשר ירושה בין A ו-B א) קצמן ר'צ"ה ד' (מח) ו' צ"ו (אומח)

12f 2P3NE 1710 010'CN

B $b_1 = \text{new } B()$.2

(1A) b_n . three()

A

B

three times in A. $\frac{1}{2}$ of A.

```
A a2 = new A();
```

d2. one ():

((A) a2) . tow()!

A

one of A

to w of A

one of A

A $a_3 = \text{new } B();$

```
a3. fowl);
```

$$((B) \alpha_3) + ow();$$

((B) a3). three1;

A

B

two of B

two of B

three of B

few of A

one of B

B b2 = new B(); 1)

b2. two();

((A) b2). two();

A

B

two of B

two of B

B b3 = new C(); 1)

b3. four();

((B) new C()). four();

A

B

four of C

A

B

four of c

Don't you know where you are?