

統計学B

第2週 確率分布

離散確率分布と二項分布



Roulette



Adobe Stock | #330512072

Try it!

<https://playpager.com/roulette/>

Why does the house always win?

$$\text{House Edge} = \frac{\text{Losing Bet Amount}}{\text{Total Pockets}} - \frac{\text{Winning Bet Amount}}{\text{Total Pockets}}$$

$$\text{House Edge} = \frac{20}{38} - \frac{18}{38} = 0.526 - 0.474$$

$$\text{House Edge} = \frac{2}{38} \approx \mathbf{0.0526} \text{ (or } 5.26\%)$$

5.26%? What does that mean?

5.26% は「1回あたり」の平均損失

100円を1回賭けると、期待損失は 5.26円。

100円を100回賭けると、合計1万円に対する期待損失は 526円。

米国式ルーレットの赤・黒への等額の賭けを想定。

確率変数 X

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

X = 出た目 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を x と書きます。

確率変数の期待値

The expected value of a random variable


期待値？ Expected value? Huh?

What is the average outcome (expected value) when you roll a die?





$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$



100円のくじ、買う？

賞金は 0円 (70%) ・ 100円 (25%) ・ 1,000円 (5%)。

$$E(X) = 0 \times 0.70 + 100 \times 0.25 + 1000 \times 0.05 = 75 \text{ 円}$$

$$75 \text{ 円} - 100 \text{ 円} = -25 \text{ 円}$$

平均すると、1枚につき25円の損。毎回25円失うわけではありません。

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

ロボット工場の検品

5台のロボットを検品。 X = 不良品の台数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

「2台が不良」のように、数えられる値を取るので離散確率分布。

問い：5台のうち、2台が不良になる確率をどう数える？

台数か、動いた時間か

離散：5台のうち壊れたロボットは何台？ 0, 1, 2, 3, 4, 5

連続：1台のバッテリーは何時間動く？ 2.1, 2.13, 2.137, ...

台数は数える。時間は測る。

今日は「何回起きた？」という離散の問いに進みます。

同じロボットでも、問いが違う

ベルヌーイ：この1台は動く？ 成功か失敗か。

二項：同じ条件で5台試すと、何台動く？

ポアソン：修理センターに1時間で何件の依頼が来る？

どの分布を使うかは「何を数えるか」で決まります。

最初の成功まで待つと？

幾何：動くロボットが初めて出るのは何台目？

負の二項：3台の動くロボットがそろうまで、不良品は何台？

成功の数？ 成功までの待ち？

今日は問いの違いだけ。計算の中心は二項分布です。

ロボットとヤギを5つ並べる

1回ごとに、ロボット  かヤギ  が独立に出る。



X = 5回中に出たロボットの数。これは二項分布？

5回と決まっている／結果は2種類／独立／毎回同じ確率なら、Yes。

2体のロボットは何通り？ 講義ページの「やってみる」で探そう。

二項分布

binomial distribution

二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$



二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

- $P(X = x)$ x 個の成功が n 回の試行でちょうど得られる確率
- x は求めたい成功の回数です
- n は試行の総数
- ${}_n C_x$ 組み合わせ、 n 回の試行から x 回の成功のパターンの数
- π は単一の試行での成功確率

組み合わせ

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{\text{(全部の回)}}{\text{(x回)} \times \text{(x以外の回)}}$$

階乗 : nから1までを全部かける

$$n! = (n) \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (3) \times (2) \times (1)$$

例 : $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

ゼロの階乗は1と定義されている
 $0! = 1$

- 階乗 : factorial
- 組み合わせ : the number of ways to choose "x" elements from a set of "n" elements

問題

- クラス内で **2 人** の生徒のグループを作成する方法は何通りありますか?
なお、クラスの人数を **22 人** とする

$${}_{22}C_2$$

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- ${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!}$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{(3 \times 2 \times 1)}{(2 \times 1) \times (1)} = 3$$

– 考えられるパターンとして

- 表、表、裏
- 表、裏、表
- 裏、表、表

の3パターンなので、計算結果と合致

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率
 - 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$
 - 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = 2) = {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2}$$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\Pr(X = 2) &= {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} = 0.375\end{aligned}$$