
日テレ
PARIS 2024
OFFICIAL BROADCASTER
USA
▶ 動画を見る / Watch the race



Photo © Dan Vernon / World Athletics




Photo courtesy OMEGA · judging-area crop




ぴったり1秒で、止められる？

1.000000 秒

やってみよう！

授業用の再現 / Classroom recreation
OMEGA公式の計測器ではありません。

身長、何cmまで測る？



$$160 \quad 160.0 \quad 160.000\ldots$$

どこまで正確に測りますか？

$$\Pr(X = 160) = 0$$

「160cmと記録」は、区間の話

$$\Pr(159.5 \leq X < 160.5) > 0$$


1点の幅は0。丸めた記録には、幅がある。

教科書 · 第2章 第2節


5　連続確率分布

p.121–122

確率密度 $f(x)$




区間に入る確率は、この面積




$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

大きな長方形で近似する



さらに、細かく



小さな面積を、全部足す


$$\sum_{i} f(x_i)\Delta x \;\longrightarrow\; \int_{a}^{b} f(x)\,dx$$

小片は「高さ × 幅」。全体の面積は $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$。

ラーメン、あと何分？

授業用モデル：待ち時間は0〜20分で一様。

$$f(x) = \frac{1}{20} \quad (0 \le x \le 20)$$



チャレンジ①　ラーメンの待ち時間

自分で解く　5分

待ち時間 X は、0〜20分の一様分布。

5分以上10分以下、待つ確率は？


答え合わせ① · 面積の計算

$$\Pr(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\Pr(5 \le X \le 10) = \int_5^{10} \frac{1}{20}\,dx$$

$$= (10 - 5) \times \frac{1}{20} = 0.25 = 25\%$$


この面積が、25%




やってみよう！

$$F(c) = \Pr(X \leq c) = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx$$

$f(x)$：cまでの面積



$F(c)$：その面積を、高さにする



別の店では、20〜60分なら？

$$F(20) = 0.10, \qquad F(60) = 0.90$$


20分以内は10%、60分以内は90%。

20分より長く、60分以内に呼ばれる確率は？

累積確率の差で、80%

$$\Pr(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$\Pr(20 < X \leq 60) = 0.90 - 0.10 = 80\%$$



やってみよう！

教科書 · 第2章 第2節

6　確率分布の平均値と分散


p.129

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

配達ロボットの期待時間は、6分

$$E(X) = \int_0^{12} x \frac{1}{12}\, dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{24}\right]_0^{12} = 6 \text{ 分}$$



授業用モデル：0〜12分の一様分布、密度1/12。

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)\, dx$$


分散から、標準偏差へ

$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^{12} (x-6)^2 \frac{1}{12}\, dx$$

$$= \left[\frac{(x-6)^3}{36} \right]_0^{12} = 12 \text{ 分}^2$$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{12} \approx 3.46 \text{ 分}$$

中心と、ばらつきを見る



やってみよう！


教科書 · 第2章 第2節

5　① 正規分布


p.122–123

正規分布：中心と、ばらつき


$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \qquad E(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$



標準偏差が小さいと、狭い山



標準偏差が大きいと、広い山




$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

60点は、標準偏差1個ぶん上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$



仮定：平均50点、標準偏差10点の正規分布。

やってみよう！


教科書・第2章 第2節

5　② 標準正規分布表の読み方

p.124–125

この表は、右側の面積

$$Q(z) = \Pr(Z > z)$$



標準正規分布表を開く

まず、1.9の行

z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	0.02500
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

次に、0.06の列


z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	0.02500
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

交点は、0.02500

z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	**0.02500**
2.0	0.02068	0.02018	0.01970


1.96より右は、2.5%

$$\Pr(Z > 1.96) = 0.02500 = 2.5\%$$



−1.96より左も、2.5%

$$\Pr(Z < -1.96) = \Pr(Z > 1.96) = 2.5\%$$




左右対称なので、同じ距離の尾は同じ面積。

+1.96より左は、97.5%

$$\Pr(Z < z) = 1 - Q(z)$$


$$\Pr(Z < 1.96) = 1 - 0.02500 = 97.5\%$$



真ん中は、両方の尾を引く

$$\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - Q(1) - Q(1)$$

$$1 - 2(0.15866) = 0.68268 \approx 68.27\%$$



教科書の丸め値では68.28%。

やってみよう！

チャレンジ②　70点以上は、何%？

自分で解く　5分

得点 $X \sim N(50, 100)$。


70点以上の確率を、上側確率の表で求めよう。

答え合わせ② · 70点以上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{70 - 50}{\sqrt{100}} = 2$$

$$Q(2) = 0.02275$$

$$\Pr(X \geq 70) = \Pr(Z \geq 2) = 2.275\%$$



表：2.0の行、0.00の列。

チャレンジ③　30点から70点なら？

自分で解く　5分

同じく、得点 $X \sim N(50, 100)$。


30点以上70点以下の確率を求めよう。

答え合わせ③ · 30〜70点

$$30 \le X \le 70 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 \le Z \le 2$$

$$\Pr(-z < Z < z) = 1 - 2Q(z)$$

$$\Pr(-2 \le Z \le 2) = 1 - 2(0.02275) = 95.45\%$$



確率は、面積。

ここからは、ALワークシートに自分で取り組もう。

補足：1人の点数と、n人の平均

教科書 p.123

$$1\text{人}：\quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\text{平均}：\quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

標準化だけでは、形は変わらない。

平均0・標準偏差1にそろえても、
もとの分布が正規とは限らない。