

統計学 #07

[AL] 確率分布：連続確率分布

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 積分の概念を学ぶ
 - 積分：①横軸と②横軸上の点，③グラフで囲まれた部分の面積
- ✓ 標準正規分布とその特徴について理解する
 - 中心極限定理
 - 標準正規分布
- ✓ t分布とその特徴について理解する
 - 自由度が大きくなると，標準正規分布に近似する
- ✓ カイ二乗分布とその特徴について理解する
 - 左右非対称，自由度が大きくなると左右対称に近づく
- ✓ 確率分布の期待値と分散について学ぶ
 - 期待値 = 母平均 μ = 取りうる値 x と確率の積和
 - 分散 = 母平均からの偏差の二乗と確率の積和

5：連続確率分布

■ 標準正規分布 standard normal distribution

✓ 正規分布に標準化を適用した分布

- 母平均： $\mu = 0$
- 母分散： $\sigma^2 = 1$

✓
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

- 一度計算してしまえば，母平均や母分散が変わっても再計算の必要がない

■ 標準化した確率変数

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

✓ 標準化した確率変数 Z は，標準正規分布に従う $Z \sim N(0,1)$

■ 標準正規分布に従う確率変数Z

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

- ✓ 母平均 μ と母分散 σ^2 が既知

■ 母分散 σ^2 が未知の場合

- ✓ 母分散 σ^2 の代わりに、標本不偏分散 $\widehat{\sigma}^2$ を使って標準化する

$$T = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma}^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}}}$$

- ✓ 確率変数 T は標準正規分布ではなく、 t 分布に従う $T \sim t(\nu)$

■ 標本不偏分散 unbiased variance

- ✓ 標本平均 $\bar{X}$ からの偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ を、自由度 $(n - 1)$ で割ったもの

$$\begin{aligned}\widehat{\sigma^2} &= \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \sum (\text{元のデータ} - \text{標本平均})^2 \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \times (\text{標本平均からの偏差二乗和})\end{aligned}$$

①標本不偏分散を計算してみよう

7

■ 千葉県の2024年の

月別月平均気温（平均気温）の標本不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ を求めよ。

- ✓ 手順① 標本平均を求める
- ✓ 手順② 標本平均からの偏差を求める
- ✓ 手順③ 偏差二乗を求める
- ✓ 手順④ 偏差二乗和を求める
- ✓ 手順⑤ 標本不偏分散を求める

year	month	平均気温
2024	Jan	7.9
2024	Feb	8.3
2024	Mar	10.1
2024	Apr	17
2024	May	20.1
2024	Jun	23.2
2024	Jul	28.8
2024	Aug	29.2
2024	Sep	27
2024	Oct	21.2
2024	Nov	14.6
2024	Dec	9

■ 標本不偏分散： $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$

✓ 手順① 標本平均を求める

➤ $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i = \frac{1}{12} \times 216.4 = 18.033$

✓ 手順② 標本平均からの偏差を求める

➤ $(X_1 - \bar{X}) = 7.9 - 18.033 = -10.133$

✓ 手順③ 偏差二乗を求める

➤ $(X_1 - \bar{X})^2 = (-10.133)^2 = 102.6844$

✓ 手順④ 偏差二乗和を求める

➤ $\sum (X_i - \bar{X})^2 = 716.8267$

✓ 手順⑤ 標本不偏分散を求める

➤ $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{12-1} \times 716.8267 = 65.16606$

■ 標本分散も計算して比べてみよう

✓ 標本不偏分散 : $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$

✓ 標本分散 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$

■ Excel関数で計算してみよう

✓ 標本不偏分散 : `=var.s()`

✓ 標本分散 : `=var.p()`

②標本不偏分散を計算してみよう

10

- 千葉県の 1975 年の月別月平均気温の
標本平均，標本分散から，標本不偏分散を求めよ．
- 標本平均は 14.96，標本分散は 60.50 である．

■ 千葉県の1975年の月別月平均気温の
標本平均，標本分散から，標本不偏分散を求めよ.

■ 標本平均は14.96，標本分散は60.50である.

✓ 標本不偏分散 : $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$

✓ 手順① 問題文から分かっている変数をまとめる

✓ 手順② 標本平均からの偏差二乗和を求める

➤ 標本分散 : $S^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = 60.5$

➤ 標本不偏分散 : $\sum (X_i - \bar{X})^2 = S^2 \times n = 60.5 \times 12 = 726$

✓ 手順③ 偏差二乗和を自由度($n - 1$)で割る

➤ 標本不偏分散 : $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{11} \times 726 = 66$

■ 以下に対応する確率を求めよ

- ✓ ① $\Pr(Z \geq 0.25)$
- ✓ ② $\Pr(Z \geq 1.00)$
- ✓ ③ $\Pr(Z \geq 0.03)$
- ✓ ④ $\Pr(Z \geq 2.01)$
- ✓ ⑤ $\Pr(Z \leq 2.96)$
- ✓ ⑥ $\Pr(Z \geq -0.25)$
- ✓ ⑦ $\Pr(-0.25 \leq Z \leq 0.25)$
- ✓ ⑧ $\Pr(-0.05 \leq Z \leq 2.13)$

■ 以下に対応する確率を求めよ

✓ ① $\Pr(Z \geq 0.25) = 0.40129$

✓ ② $\Pr(Z \geq 1.00) = 0.15866$

✓ ③ $\Pr(Z \geq 0.03) = 0.48803$

✓ ④ $\Pr(Z \geq 2.01) = 0.02222$

➤ 上側確率の場合は，標準正規分布表から数値を読むだけ！

■ 以下に対応する確率を求めよ

✓ ⑤ $\Pr(Z \leq 2.96) = 0.99846$

➤ $\Pr(Z \leq 2.96) = 1 - \Pr(Z \geq 2.96)$

➤ 下側確率の場合は、
全体(1)から上側確率を引く

✓ ⑥ $\Pr(Z \geq -0.25) = 0.59871$





➤ $\Pr(Z \geq -0.25) = 1 - \Pr(Z \leq -0.25)$

➤ マイナスの値の上側確率の場合は、
全体(1)から引く

✓ ⑦ $\Pr(-0.25 \leq Z \leq 0.25) = 0.19741$

✓ ⑧ $\Pr(-0.05 \leq Z \leq 2.13) = 0.50335$

➤ いずれも、両端を全体(1)から引く



◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 積分の概念を学ぶ
 - 積分：①横軸と②横軸上の点，③グラフで囲まれた部分の面積
- ✓ 標準正規分布とその特徴について理解する
 - 中心極限定理
 - 標準正規分布
- ✓ t分布とその特徴について理解する
 - 自由度が大きくなると，標準正規分布に近似する
- ✓ カイ二乗分布とその特徴について理解する
 - 左右非対称，自由度が大きくなると左右対称に近づく
- ✓ 確率分布の期待値と分散について学ぶ
 - 期待値 = 母平均 μ = 取りうる値 x と確率の積和
 - 分散 = 母平均からの偏差の二乗と確率の積和