

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В РЕЖИМЕ «КОСТНОГО ОКНА», БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТОВЕРНОЙ ОЦЕНКИ МЯГКОТКАНОГО И ЖИДКОСТНОГО КОМПОНЕНТА.

ФИО пациента	Тухбиев Рустем Русланович
Пол	муж
Дата рождения	21.07.2004г
Дата и время исследования	18.03.2024 18:41
Дата выполнения описания	22.03.2024 г
Вид исследования	КЛКТ 13х15
ЭЭД	0,094 мЗв
№ амбулаторной карты	
Направительный диагноз (МКБ)	Диагноз
Цель исследования	Обследование
Первичное/повторное	Первичное
Ограничения к Ro-исследованию	Нет ограничений
Ограничения визуализации	Нет ограничений

Исследование проведено на КЛКТ-ортопантомографе «KaVo-OP300»


На серии КЛКТ придаточных пазух носа лобные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, клиновидные пазухи развиты, пневматизация клиновидного синуса справа отсутствует. Стенки пазух имеют ровные и четкие контуры, без признаков деструктивных изменений. Слизистая оболочка фронтальных синусов не изменена. В ячейках решетчатого лабиринта определяется пристеночное утолщение слизистой оболочки. Клиновидных синусов асимметричны D<S. Клиновидный синус справа тотально затенен. Слизистая оболочка клиновидного синуса слева не изменена. В заднем отделе решетчатого лабиринта справа определяется овальной формы с четкими контурами с костным ободком неомогенное образование размером 21,6x22,7x14,0мм (плотность HU 448-548), прилежащее к передней стенке клиновидного синуса справа и перекрывающее его соустье.


Верхнечелюстные пазухи развиты и пневматизированы. Стенки пазух имеют ровные и четкие контуры, без признаков деструктивных изменений, накопления жидкости не определяется. Справа развита клетка Галера. В обеих верхнечелюстных пазухах визуализируется пристеночное неравномерное утолщение слизистой оболочки до 1,7 мм справа и до 1,2 мм слева.


Носовая перегородка искривлена на 5,3 мм вправо с формированием костного шипа. Сфеноэтроидальные соустья не проходима, фронтоэтроидальные соустья проходима. Проходимость отверстий остиомеатального комплекса и носовых ходов прослеживается с обеих сторон.



Видимые ячейки пирамид височных костей пневматизированы, без видимых изменений. Височно-нижнечелюстные суставы не изменены.

Верхушки корней моляров и вторых премоляров прилежат к нижним стенкам обеих верхнечелюстных пазух. Периапикальных изменений не выявлено.









РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- КЛКТ картина образования решетчатого лабиринта справа (фиброма?), правостороннего сфеноидита, этмоидита, минимального утолщения слизистой оболочки обеих верхнечелюстных пазух. Искривление носовой перегородки вправо.

РЕКОМЕНДОВАНО:

- консультация отоларинголога,
- дообследование в рамках МРТ ,
- КТ/КЛКТ контроль по показаниям.

Врач-рентгенолог



А.Ф. Сонич

