

UCCM3473 CREDIBILITY THEORY

$$1. X \sim POI(\lambda)$$

- $f(x|\lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, x = 0, 1, \dots$
  - $E(X) = V(X) = \lambda$
- 

$$2. X \sim Bin(m, q)$$

- $f(x|q) = \binom{m}{x} q^x (1-q)^{m-x}, x = 0, 1, \dots, m$
  - $E(X) = mq; V(X) = mq(1 - q)$
- 

$$3. X \sim NB(r, \beta)$$

- $f(x|\beta) = \frac{r(r+1)\dots(r+x-1)\beta^x}{x!(1+\beta)^{r+x}}$   
 $= \binom{r+x-1}{x} \frac{\beta^x}{(1+\beta)^{r+x}}, x = 0, 1, \dots$
  - $E(X) = r\beta; V(X) = r\beta(1 + \beta)$
- 

$$4. X \sim N(\mu, \sigma)$$

- $f(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in R$
  - $E(X) = \mu; V(X) = \sigma^2$
- 

$$5. X \sim Gamma(\alpha, \theta)$$

- $f(x|\alpha, \theta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}, x > 0$
  - $F(x|\alpha, \theta) = 1 - \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{(\frac{x}{\theta})^j e^{-\frac{x}{\theta}}}{j!}$
-

UCCM3473 CREDIBILITY THEORY

- $E(X) = \alpha\theta; V(X) = \alpha\theta^2$
  - $E(X^k) = \theta^k \alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + k - 1)$
- 

6.  $X \sim \text{InvGamma}(\alpha, \theta)$

- $f(x|\alpha, \theta) = \frac{\theta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-(\alpha+1)} e^{-\frac{\theta}{x}}, x > 0$
  - $E(X^k) = \frac{\theta^k}{(\alpha-1)\cdots(\alpha-k)}$ , if  $k$  is a positive integer
- 

7.  $X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$

- $f(x|\alpha, \theta) = \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}, x > 0$
  - $F(x|\alpha, \theta) = 1 - \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^\alpha$
  - $E(X^k) = \frac{\theta^k k!}{(\alpha-1)\cdots(\alpha-k)}$
- 

8.  $X \sim \text{SingleParameterPareto}(\alpha, \theta)$

- $f(x|\alpha, \theta) = \frac{\alpha\theta^\alpha}{x^{\alpha+1}}, x > \theta$
  - $F(x|\alpha, \theta) = 1 - \left(\frac{\theta}{x}\right)^\alpha$
  - $E(X^k) = \frac{\alpha\theta^k}{\alpha-k}, k < \alpha$
-

9.  $X \sim \text{Beta}(a, b, \theta)$

- $f(x|a, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)\theta^{a+b-1}} x^{a-1} (\theta-x)^{b-1}, 0 < x < \theta$
  - $E(X^k) = \frac{\theta^k a(a+1)\cdots(a+k-1)}{(a+b)(a+b+1)\cdots(a+b+k-1)}$  if  $k$  is positive integer.
- 

10.  $X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma)$

- $f(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, x > 0$
  - $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$
  - $E(X^k) = e^{k\mu + \frac{1}{2}k^2\sigma^2}$
- 

11.  $X \sim \text{Weibull}(\tau, \theta)$

- $f(x|\tau, \theta) = \frac{\tau}{\theta^\tau} x^{\tau-1} e^{-(x/\theta)^\tau}, x > 0$
  - $F(x) = 1 - e^{-(x/\theta)^\tau}$
  - $E(X^k) = \theta^k \Gamma(1 + k/\tau), k > -\tau$
- 

12.  $X \sim \text{InvGaussian}(\mu, \theta)$

- $E(X) = \mu; V(X) = \frac{\mu^3}{\theta}$
-