BABYBOOK · 냉장고에 붙여 두세요

지금 병원 가야 하나

2026년 10월 조사 기준 · 여러 신호가 겹치면 더 긴급한 행동부터 따르세요.

① 119

숨을 쉬기 힘들어 하거나, 입술·혀가 파래지거나, 깨우기 어렵거나 평소처럼 반응하지 않거나, 경련하면 즉시 119에 연락하세요.[N001][N085][N090]

나 자신이나 아기를 해칠 것 같으면 혼자 버티지 말고 즉시 다른 어른과 119·112에 도움을 요청하세요.[N052][N054]

② 즉시 진료

생후 3개월 미만 아기가 38.0°C 이상이면, 상태가 좋아 보여도 즉시 응급실에서 진료받으세요.[N001]

측정 부위에 따라 값과 정확도가 달라요. 겨드랑이에서 38°C가 될 때까지 기다리는 뜻은 아니에요. 아기가 뜨겁거나 평소와 다르면 잰 부위·값을 알려 바로 의료진에게 문의하세요.[N001]

평소와 달리 잘 먹지 못하거나, 소변이 뚜렷하게 줄거나, 평소보다 처지면 지체하지 말고 진료받으세요.[N001][N090]

생후 첫날부터 노랗거나, 황달이 심해지거나 오래 지속되거나, 흰색·회백색 변을 보면 바로 의료진에게 알리고 진료받으세요. 잘 먹지 못하거나 처지면 지체하지 마세요.[N003][N031]

초록색·노란색이나 피가 섞인 구토, 분수처럼 힘차게 뿜는 구토, 먹지 못하거나 처지는 구토는 즉시 진료받으세요.[N060]

배꼽 주변이 붉어지거나, 만질 때 아파하거나, 고름·악취가 나면 진료받으세요. 피가 계속 나면 즉시 진료받으세요.[N007]

영국 NHS는 체온이 36°C 미만으로 낮은 경우도 응급 신호로 안내합니다. 5세 미만은 전자체온계로 겨드랑이에서 재도록 안내합니다. 36°C 미만이거나 몸이 차고 평소와 다르면 즉시 응급의료 도움을 받으세요.[N090][N130]

울음이 매우 약하거나 날카롭게 달라지면 즉시 응급의료 도움을 받으세요.[N026]

눌러도 옅어지지 않는 발진이 있으면 즉시 응급의료 도움을 받으세요.[N001]

③ 오늘 소아과에 묻기

목록이 모든 응급 상황을 담지는 않아요. 심하게 아파 보이거나 급격히 달라지면 즉시 도움을 요청하세요. 그 밖의 걱정되는 변화는 오늘 소아과에 연락하세요. 증상이 겹치면 위의 긴급한 행동부터 따르세요.[N001][N090]

안전 여부를 판정하는 표가 아닙니다. 숨·반응 이상은 119에 연락하세요.

연락처 · 평소에 채워 두세요

응급 연락

119

담당 소아과 · 이름 / 전화

_____

가까운 응급실 · 전화 / 소아 진료 여부

_____

야간·휴일 진료기관 · 이름 / 전화

_____

출발 전 운영시간·영아 진료 가능 여부를 전화로 확인하세요.[N001][N069]

의료진에게: 출생일·체중 / 체온·측정 시간·부위 / 숨·반응 / 수유·소변 변화[N001][N073]

부모 위기: 109 자살예방 · 1577-0199 정신건강위기 · 긴급 119·112 · 아이사랑 1644-7373(평일 09~18시)[N054][N055][N073]

근거: 질병관리청·아이사랑·보건복지상담센터·영국 NHS. 각주 원문은 BabyBook 출처 페이지에서 확인하세요.