

⁺3 Notas de Topologia

March 6, 2026

"Alguma frase"

Dono da frase

Nestor Heli Aponte Avila¹

n267452@dac.unicamp.br

** Abstracst muito abstract . **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$ Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$ Fechado

⊠ Corolário

§ 1 Preliminares

Teoria de conjuntos

Propriedades de conjuntos e funções que a gente vai usar o tempo todo. Dados X, Y conjuntos e $f : X \rightarrow Y$ função:

1.A. (*Leis de De Morgan*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$, então,

$$(a) X \setminus \bigcup A_i = \bigcap (X \setminus A_i) \quad \text{e} \quad (b) X \setminus \bigcap A_i = \bigcup (X \setminus A_i).$$

1.B. (*Pre-imagem*) Sejam $(B_i)_{i \in I} : B_i \subset Y$. Então,

$$(a) f^{-1}\left(\bigcup B_i\right) = \bigcup f^{-1}(B_i); \quad (b) f^{-1}\left(\bigcap B_i\right) = \bigcap f^{-1}(B_i)$$

$$(c) f^{-1}(Y \setminus B_j) = X \setminus f^{-1}(B_j).$$

1.C. (*Imagem*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$. Então,

$$(a) f\left(\bigcup A_i\right) = \bigcup f(A_i) \quad \text{e} \quad (b) f\left(\bigcap A_i\right) \subset \bigcap f(A_i),$$

com igualdade em (b) se f for injetora.

1.E. Dados $A \subset X$ e $B \subset Y$ temos:

(a) $A \subset f^{-1}(f(A))$, igualdade se f injetora ($\hookrightarrow$).

(b) $f(f^{-1}(B)) \subset B$, igualdade se f sobrejetora ($\twoheadrightarrow$).

1.G. Se $\exists g : Y \rightarrow X \mid g \circ f = \mathbb{1}_X$, então f é injetora e g sobrejetora.

Espaços métricos

◇ Dados (X, d) espaço métrico, $a \in X$ e $r > 0$, denotamos as *bolas aberta e fechada* com centro em a e raio r como sendo:

$$B(a; r) := \{x \in X : d(x, a) < r\} \quad \text{e} \quad B[a; r] := \{x \in X : d(x, a) \leq r\}.$$

◇ $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \forall a \in U, \exists r > 0 : B(a; r) \subset U$ e $F^\blacklozenge \subset X \Leftrightarrow (X \setminus F)^\diamond \subset X$.

□ **2.6.** (a) $\emptyset$ e X são abertos; (b) União arbitrária de abertos é aberto; (c) Interseção finita de abertos é aberto.

▣ **2.7.** (a) $\emptyset$ e X são fechados; (b) Interseção arbitrária de fechados é fechado; (c) União finita de fechados é fechado. $\rightarrow$ Ex. 1.A.

◇ Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é *contínua* em $a \in X$ se dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0 : f(B_X(a; \delta)) \subset B_Y(f(a); \epsilon)$.

Nota. f é contínua em geral se for contínua em cada ponto. Denotamos $C(X, Y)$ o conjunto de todas as funções contínuas e $C(X)$ se $Y = \mathbb{R}$.

□ **2.10.** As seguintes condições são equivalentes:

- (a) $f \in C(X, Y)$. (b) $\forall V^\diamond \subset Y, \exists U^\diamond \subset X : f(U) \subset V$.
(c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. (d) $f^{-1}(B)^\blacklozenge \subset X, \forall B^\blacklozenge \subset Y$.

Exemplo As métricas estándar em $\mathbb{R}^n$, d_1 , d_2 e d_∞ .

§ 2 Espaços topológicos

◇ Chamamos de *topologia* em X uma família $\tau \subset \wp(X) : (T1) \emptyset, X \in \tau; (T2) \forall \mathcal{C} \subset \tau, \bigcup \{U : U \in \mathcal{C}\} \in \tau$ e $(T3) \forall U, V \in \tau, U \cap V \in \tau$.

Nota. Um subconjunto $F^\blacklozenge \subset X \Leftrightarrow (X \setminus F)^\diamond \subset X$, como no ▣ 2.7., existe uma versão equivalente da definição topologia em termos de fechados.

◇ Dadas duas topologias τ_1, τ_2 em X tais que $\tau_1 \subset \tau_2$. Então, dizemos que τ_1 é mais *fraca* ou τ_2 mais *forte* que a outra.

Exemplos importantes

(X, d) com $\tau = \tau_d$ | $\tau = \{\emptyset, X\}$ (top. trivial) | $\tau = \wp(X)$ (top. discreta)
 $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$ (top. Sierpinski) | $\bar{\tau} = \{F \subset X : F \text{ finito}\}$ (top. cofinita)

Aderência e interior

◇ Dados (X, τ) e $A \subset X$, definimos *aderência* e *interior* de A , respectivamente,

$$\overline{A} := \bigcap \{F^\star \subset X : A \subset F\} \quad \text{e} \quad A^\circ := \bigcup \{U^\diamond \subset X : U \subset A\}.$$

□ **4.*.** As aplicações $f : A \mapsto \overline{A}$ e $i : A \mapsto A^\circ$ verificam:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| (f1) $A \subset \overline{A}$. | (f2) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. | (f3) $A^\star \subset X \Leftrightarrow A = \overline{A}$. |
| (i1) $A^\circ \subset A$. | (i2) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$. | (i3) $A^\diamond \subset X \Leftrightarrow A = A^\circ$. |

Nota. Tem versões mais completas da □ 4.*, até da pra definir topologia a partir de aplicações verificando aquelas propriedades, olha se quiser [1, Pág. 9].

□ **4.5.** $X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$ e $X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$. → Mais uma vez Ex. 1.A.

Sistemas de vizinhanças

◇ $U \subset X$ é *vizinhança* de $x \in X$ se $x \in U^\circ$, cujo caso $U \in \mathcal{U}_x$.

□ **5.2.** As vizinhanças $U \in \mathcal{U}_x$ verificam as seguintes propriedades:

- | | | |
|--|---|---|
| (a) $x \in U$. | (b) $V \in \mathcal{U}_x \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{U}_x$. | (d) $U \subset V \subset X \Rightarrow V \in \mathcal{U}_x$. |
| (c) $\exists V \in \mathcal{U}_x : V \subset U$ e $\forall y \in V, U \in \mathcal{U}_y$. | (e) $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \forall x \in U, U \in \mathcal{U}_x$. | |

Nota. Mais uma vez, é possível definir a topologia $\tau = \{U \subset X : U \in \mathcal{U}_x, \forall x \in U\}$ a partir de uma família verificando tais propriedades, [1, Pág. 12].

◇ Uma família $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{U}_x$ é *base de vizinhanças* se $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset U$.

□ **5.7.** Pra cada $x \in X$ seja $\mathcal{B}_x$ família verificando:

- | | |
|---|--|
| (a) $\forall U \in \mathcal{B}_x, x \in U$. | (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}_x, \exists W \in \mathcal{B}_x : W \subset U \cap V$. |
| (c) Dada $U \in \mathcal{B}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x, V \subset U : \forall y \in V, \exists W \in \mathcal{B}_y$ tal que $W \subset U$. | |

Então, $\tau := \{U \subset X : \forall x \in U, \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$ é uma topologia em X e $\mathcal{B}_x$ uma base de vizinhanças pra τ . → Considere $\mathcal{U}_x := \{U \subset X : \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$, a afirmação segue da recíproca da □ 5.2. no texto guia.

□ **5.8.** Sejam $A \subset X$ e $\mathcal{B}_x$ base de vizinhanças. Então, $\overline{A} = \{x \in X : \forall V \in \mathcal{B}_x, V \cap A \neq \emptyset\}$ e $A^\circ = \{x \in X : \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset A\}$.

Exemplo Em (X, d) , as bolas (abertas u fechadas) são base de vizinhanças.

◇ (X, τ) satisfaz o *primeiro axioma de enumerabilidade* se cada $x \in X$ admite base de vizinhanças $\mathcal{B}_x$ enumerável.

Bases para os abertos

◇ Diz-se que $\mathcal{B} \subset \tau$ é *base* de τ se $\forall U^\diamond \subset X, \exists \mathcal{C} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}$.

□ **6.3.** $\mathcal{B} \subset \tau$ é base $\Leftrightarrow \forall x \in U^\diamond \subset X, \exists V \in \mathcal{B} : x \in V \subset U$, pra cada $U \in \tau$.

□ **6.6.** Seja $\mathcal{B} \subset \wp(X)$ verificando: (a) $X = \bigcup \{V : V \in \mathcal{B}\}$ e (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}$ e $x \in U \cap V$, $\exists W \in \mathcal{B} : x \in W \subset U \cap V$. Então, os conjuntos da forma:

$$U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\} \quad \text{com } \mathcal{C} \subset \mathcal{B},$$

definem uma topologia τ em X , pra a qual $\mathcal{B}$ é base.

◇ (X, τ) satisfaz o *segundo axioma de enumerabilidade* se $\exists \mathcal{B} \subset \tau$ base enumerável.

Exemplo Em $(\mathbb{R}, \tau_2)$, a família $\mathcal{B} := \{(a, b) : a < b\}$ é base de τ_2 , enumerável se tomarmos só $a, b \in \mathbb{Q}$.

+ Exemplos importantes (em $X = \mathbb{R}$)

$$\mathcal{B} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\} \quad | \quad \mathcal{B} := \{[a, b) : a < b\} \text{ (top. Sorgenfrey)}$$

Subespaços

References

[1] Mujica, Jorge (2005). *Notas de Topologia Geral*, IMECC-UNICAMP.