

⁺²Notas de Álgebra Linear II

November 10, 2025

"No princípio Deus criou os céus, a terra e...
a Álgebra Linear" - Gênesis 1:1

Nestor Heli Aponte Avila¹
n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM719 (Álgebra Linear) ministrada pelo professor Adriano Moura e [1], de sua autoria também, no período 2025-II. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

(−)[◇] Aberto



Teorema

(−)[◆] Fechado



Corolário

§ Preliminares

É preciso lembrar alguns resultados do curso de Álgebra Linear I, podem ser aprofundados se quiser nos capítulos 5 e 6 de [1]. Também, algumas propriedades e detalhes do anel de polinômios.

Espaços Vetoriais



Sejam $\mathbb{F}$ um corpo e $V \neq \emptyset$. Um $\mathbb{F}$ -*espaço vetorial* é uma tripla $(V, +, \cdot)$ onde, $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ são operações tais que, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall v, w \in V$,

(V1) $(V, +)$ é grupo abeliano.

(V2) $(V, \cdot)$ associa, $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$.

(V3) Distributividade I, $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$.

(V4) Distributividade II, $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$.

(V5) Neutro da multiplicação (por escalar), $1 \cdot v = v$.



Um subconjunto $W \subseteq V$ **não vazio** é dito de *subespaço*, denotamos $W \leq V$, se $\forall w_1, w_2 \in W, \forall \lambda \in \mathbb{F}, w_1 + \lambda w_2 \in W$.

◊ Sejam $\alpha = (v_i)$ família de vetores em V e $m \in \mathbb{N}$. Uma *combinação linear* de α , é um vetor em V da forma $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$, onde $x_{i_j} \in \mathbb{F}$.

Nota. Denotamos por $[\alpha]$, ao conjunto de todas as combinações lineares de α , repare que $[\alpha] \leq V$. Se $\alpha = \{v\}$, então $[\alpha] = [v] = \mathbb{F}v$.

◊ Uma família $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ é l.i. sse $\forall j \in I, v_j \notin [\alpha \setminus \{v_j\}]$. Se além de l.i., $[\alpha] = V$, então α é chamada de *base* de V .

■ **5.5.1.** Todo espaço vetorial têm base e quaisquer duas bases têm mesma cardinalidade. $\rightarrow$ [1, Pág. 185]

◊ Seja α uma base de V . Então, $\dim V := \#\alpha$ é a *dimensão* de V .

◊ Seja $(V_i)_{i \in I}$ família de subespaços em V , definimos a soma deles como sendo $\sum V_i := [\bigcup V_i]$. A soma é direta se $\forall j \in I, V_j \cap \sum_{i \neq j} V_i = \{0\}$.¹

□ **5.3.7.** A soma $\sum V_i$ é direta $\Leftrightarrow \forall v \in \sum V_i, \exists m \in \mathbb{N}$ e $\exists! v_{i_j} \in V_{i_j}$ tais que $v = \sum_{j \leq m} v_{i_j}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 174]

□ **5.4.6.** Sejam $\alpha = (v_i)$ e $V_i = \mathbb{F}v_i$. Então, α é l.i. $\Leftrightarrow \sum \mathbb{F}v_i$ é direta.

⊠ **5.4.10.** α é base $\Leftrightarrow \forall i \in I, v_i \neq 0$ e $V = \bigoplus \mathbb{F}v_i$. Segue da □ 5.3.7. que $\forall v \in V, \exists m \in \mathbb{N}$ e $\exists! x_{i_j} \in \mathbb{F}$ tais que $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 178]

Nota. No contexto do ⊠ 5.4.10. os x_{i_j} são as *coordenadas* de v na base α , as quais identificamos comumente, $(x_{i_j}) =: [v]_\alpha \sim [x_{i_1}, \dots, x_{i_m}]^t \in M_{m \times 1}(\mathbb{F})$.

Transformações Lineares

◊ Sejam V e W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Uma função $T : V \rightarrow W$ é dita *linear* se $\forall v_1, v_2 \in V$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ têm-se que $T(v_1 + \lambda v_2) = T(v_1) + \lambda T(v_2)$.

◊ Sejam $T : V \rightarrow W$ linear, $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_i)$ bases de V e W respetivamente. Então, se $[T(v_j)]_\beta = (a_{i_j})$, a *matriz associada* $[T]_\beta^\alpha := (a_{i_j})_{i,j}$ determina T no sentido que, $\forall v \in V, [T(v)]_\beta = [T]_\beta^\alpha [v]_\alpha$.

Nota. Se $W = V$ e $T = \mathbb{1}_V$, então $[\mathbb{1}_V]_\beta^\alpha$ é a matriz cambio de base.

■ **6.1.6.** Sejam $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ base de V e $\beta = (w_i)$ família em W , então $\exists! T : V \rightarrow W$ linear tal que $\forall i \in I, T(v_i) = w_i$. $\rightarrow$ [1, Pág. 189]

¹ Acostuma-se denotar uma soma direta como $\bigoplus V_i$.

Nota. O espaço vetorial das funções $f : V \rightarrow W$, com a soma e o produto usuais é denotado no texto como $\mathcal{F}(V, W)$.

◇ $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) := \{T \in \mathcal{F}(V, W) : T \text{ é linear}\}$. Se $V = W$, então denotamos $\text{End}_{\mathbb{F}}(V) := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$.²

□ **0.1.** Algumas propriedades coletadas de [1, Seç. 6.1].

- (a) $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \leq \mathcal{F}(V, W)$.
- (b) Sejam $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_i)$ bases de V e W fixas. A função $\Phi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \ni T \mapsto [T]_{\beta}^{\alpha} \in M_{\#I \times \#J}(\mathbb{F})$ é linear e injetora.
- (c) Sejam γ, α e β bases de U, V e $W, S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V)$ e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. Então, $T \circ S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$ e $[T \circ S]_{\beta}^{\gamma} = [T]_{\beta}^{\alpha} [S]_{\alpha}^{\gamma}$.
- (d) Se α e β bases de V e W , e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ invertível. Então, $T^{-1} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V)$ e $[T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^{-1}$.

◇ $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ é *isomorfismo* se for bijetivo. Dois espaços são *isomorfos*, $V \cong W$, se $\exists T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ isomorfismo.

Nota. A transformação Φ da □ 0.1. (b) é sobrejetiva se $\#J < \infty$.

■ **6.1.9.** $V \cong W \Leftrightarrow \dim V = \dim W$. → [1, Pág. 191]

□ **6.3.1.** Imagem e pre-imagem de subespaços é subespaço. → [1, Pág. 199]

◇ $V_T := T^{-1}(\{0\}) = \ker T$ e $\text{Im } T := T(V)$.

Nota. Chamamos estes espaços especiais de *núcleo* e *imagem* de T e suas dimensões de *nulidade* e *posto*.³

■ **6.3.6.** $\dim V = \dim V_T + \text{pt } T$. → [1, Pág. 201]

□ **6.3.9.** T é injetora $\Leftrightarrow V_T = \{0\}$. → [1, Pág. 202]

◇ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$ e $V_{\lambda} = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}$. Se $\exists v \in V_{\lambda} \setminus \{0\}$, então V_{λ} é *autoespaço* e v um *autovetor*, ambos associados ao *autovalor* λ .

◇ T é *diagonalizável* se $\exists \beta$ base de V formada por autovetores.

²"Hom" vêm de homomorfismo e "End" de endomorfismo.

³No texto o professor denota por $\mathcal{N}(T)$ o núcleo de T , só que eu não gosto dessa.

Nota. No caso diagonalizável e tudo perfeito de mais, pois se λ_j são os autovalores dos $v_j \in \beta$, então $[T]_\beta^\beta = \text{diag}(\lambda_j)$. Em versão matricial temos,

$$[T]_\beta^\beta = [\mathbf{1}_v]_\beta^\alpha [T]_\alpha^\alpha [\mathbf{1}_v]_\alpha^\beta \sim B = P^{-1}AP.$$

É sabido que não todos os operadores são diagonalizáveis. O objetivo do [1, Cap. 8] é ver que, mesmo assim, sempre é possível levar T a uma matriz quasi-diagonal B (Formas Canônicas).

O Anel de Polinômios $\mathcal{P}(\mathbb{F})$

Não vou aprofundar nos detalhes relacionados com anéis, fica muito longe. Por tanto, recomendo rever os conceitos de anel, ideal, domínio de integridade, ideal principal, PID e UFD-Algoritmo de Euclides.

◊ Sejam $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ um corpo e $\{t^k : k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ conjunto respeitando as leis usuais de potências.⁴ Defina, $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, o espaço vetorial $V_k = \{a_k t^k : a_k \in \mathbb{F}\}$, com as operações,

- $+: V_k \times V_k \ni (a_k t^k, b_k t^k) \mapsto (a_k + b_k) t^k \in V_k$.
- $\cdot: \mathbb{F} \times V_k \ni (\lambda, a_k t^k) \mapsto (\lambda \cdot a_k) t^k \in V_k$.

Assim, o anel de polinômios com coeficientes em $\mathbb{F}$ é $\mathcal{P}(\mathbb{F}) := \prod V_i = \bigoplus V_i$, sequências-somas de **soporte finito**.

Nota. $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ é uma estrutura maravilhosa pois, só por mencionar algumas de suas características que seram de nosso interesse aqui,

- É espaço vetorial de dimensão infinita e $\alpha = \{1, t, t^2, \dots\}$ é uma base, seguindo o [5.4.10.](#), $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni p(t) = \sum_{j \leq m} a_{k_j} t^{k_j}$.
- Temos um produto bem definido e comutativo que distribui a soma, o que faz dele um anel e mais geralmente uma álgebra comutativa.
- É PID, ou seja que todo ideal é gerado.
- PID $\Rightarrow$ UFD, ou seja que temos fatorização única em primos, propriedades de divisibilidade e algoritmo da divisão.

◊ Seja $g(t) = \sum^m a_k t^k \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $a_m \neq 0$. Então, o grau de g é $\text{gr}(g) := m$ e no caso de $a_m = 1$ dizemos que g é *mônico*.

⁴Quer dizer que $t^0 = 1$ e $t^m \cdot t^n = t^{m+n}$.

◇ $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni g$ divide $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $g \mid f$, sse $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $f = gq$. Também, o conjunto dos divisores é $\text{Div}(f) := \{g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : g \mid f\}$.

◇ Diz-se que $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \mathbb{F}^\times$ é *primo* sse $\text{Div}(p) = \{1, p\}$.

■ (*Fatoração em primos*) Seja $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{1\}$ mônico. Então, $\{p_j \in \text{Div}(f) : p_j \text{ é primo}\}$ é finito e $\exists! n_j \in \mathbb{N}$ tais que $f = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_m^{n_m}$.

□ **0.2.** Algumas propiedades da divisibilidade,

- (a) $g \mid f$ e $f \mid h \Rightarrow g \mid h$. (b) $g \mid f \Leftrightarrow \text{gr}(g) \leq \text{gr}(f)$.
(c) $g \mid f$ e $g \mid h \Rightarrow g \mid (f + h)$. (d) Se $g \mid f \Rightarrow \forall r \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), g \mid fr$.
(e) $g \mid f$ e $f \mid g \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{F}^\times : f = \lambda g$.

■ (*Algoritmo da Divisão*) Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ com $g \neq 0$. Então, $\exists! q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $f = gq + r$ e $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$.

■ Sejam $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e $f_1, f_2, \dots, f_n$ não todos nulos, então $\exists! d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico ao que chamamos de $\text{mdc}(f_j)$ que verifica,

- i. $d \in \bigcap^n \text{Div}(f_j)$ ii. Se $e \in \bigcap^n \text{Div}(f_j) \Rightarrow e \mid d$.

■ (*Bézout*) Se $d = \text{mdc}(f_j)$, então $\exists a_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $\sum^n a_j f_j = d$.

Nota. Caso particular $\text{mdc}(f_1, f_2) = 1$, tá dizendo que $\exists a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $a(t)f_1(t) + b(t)f_2(t) = 1$, isso vai ser importante mais pra frente.⁵

§ 8. Teoria Geral de Operadores Lineares

Se $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ e $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $T^m := \overbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}^{m \text{ vezes}} \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, por convenção $T^0 = 1_V$. Seguindo a □ 0.1. (a), $\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ temos,

$$p(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k \rightsquigarrow P(T) = \sum_{k=0}^m a_k T^k \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V).$$

Também, na notação dos preliminares $V_p = V_{p(T)} = \{v \in V : p(T)(v) = 0\}$. De aqui pra frente (nesse capítulo) sejam V e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ fixos.

Nota. Nesses termos um autoespaço é $V_{t-\lambda} \neq \{0\}$.

⁵Não falei, mais quando isso acontece diz-se que f_1 e f_2 são coprimos

8.1. Polinômio Mínimo e Descomposição Primária

◊ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$, $m \in \mathbb{N}$ e $p(t) = (t - \lambda)^m$. Se $\exists v \in V_p \setminus \{0\}$ é chamado de *autovetor generalizado* associado ao autovalor λ .

◊ $W \leq V$ é *T-invariante* se $T(W) \subseteq W$, e a restrição de $T|_W$ é chamada de o *operador inducido* em W .

□ **8.1.1.** Se $S, T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ são tais que $S \circ T = T \circ S$, então V_S é *T-inv.* $\rightarrow$ Se $w \in V_S \Rightarrow S(T(w)) = T(S(w)) = 0 \Rightarrow T(w) \in V_S$

Nota. Dado que $p(T) \circ T = T \circ p(T)$ os subespaços V_p são *T-inv.*, e também, $\forall p, f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $V_p \subseteq V_{fp}$. Em particular, $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $V_{p^k} \subseteq V_{p^{k+1}}$.

◊ Sejam $\lambda \in F$ e $V_p^\infty := \bigcup_{k \geq 0} V_{p^k}$. No caso de $p = (t - \lambda)$ o subespaço V_p^∞ é chamado de *autoespaço generalizado* associado ao λ .

Nota. V_p^∞ é *T-inv* e se $\dim V = n < \infty$, então $V_p^\infty = V_{p^n}$.

$$\diamond \mathcal{A}_T := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T) = 0\}.$$

□ **8.1.3.** Se $\dim V = n < \infty$, então $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$.

Lembre-se que $\dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)) = n^2$, logo, $\exists m \leq n^2$ tal que $\{T^j\}_{j=0}^m$ é l.d. Tome m mínimo e faça $f(T) := T^m - \sum_{k=0}^{m-1} a_k T^k \in \mathcal{A}_T$.

□ **8.1.4.** Se $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$, então $\exists! m_T \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico tal que $\forall f \in \mathcal{A}_T$, $m_T \mid f$.

$\mathcal{A}_T$ é ideal, então $\exists! m_T$ tal que $\mathcal{A}_T = \langle m_T \rangle$. Se preferir pegue m_T de menor grau possível, suponha $f = m_T q + r$ e conclua que $r = 0$. Para unicidade suponha outro e usei □ 0.2. (e).

Nota. Se $\mathcal{A}_T = \{0\}$ fazemos $m_T := 0$, é assim que $V = V_{m_T}$. Se $S = T|_{V_p}$, então $p \in \mathcal{A}_S$. Também, pode-se verificar que o polinômio da □ 8.1.3. é de fato m_T .

□ **8.1.6.** Se $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ co-primos, então a restrição de $f|_{V_g}$ é injetora. $\rightarrow$ Faz usando o ■ (Bézout), lembre-se que $1 \rightsquigarrow 1_V$

□ **8.1.7.** Seja $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow p \mid m_T$.

($\Rightarrow$) Supõe que $p \nmid m_T$, então eles são co-primos, aplique □ 8.1.6. e conclua $V_p = \{0\}$. ($\Leftarrow$) Suponha $p \mid m_T$ e $V_p = \{0\}$ e contradiga.

⊠ **8.1.8.** Seja $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists f \in \text{Div}(m_T)$ e $\exists g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $p = gf$. Se $\nexists q \in \text{Div}(m_T)$ tal que $q \mid g$, então $V_p = V_f$.

É coisa de fatorar em primos, ter presentes as propriedades □ 0.2. (a), $V_p \subseteq V_{fp}$ e conseguir as hipótese da □ 8.1.7..

◇ Sejam $v \in V$, $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $v_k = T^k(v)$. A família $\mathcal{C}_T^\infty(v) := (v_k)$ é o T -ciclo gerado por v , enquanto $C_T(v) := [\mathcal{C}_T^\infty(v)]$ é o *subespaço T -cíclico* gerado por v .

Nota. É fácil ver que $C_T(v)$ é T -inv. Alternativamente, pode-se definir $C_T(v) = \mathcal{C}_T^m(v)$, onde $m = \dim C_T(v) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$.

◇ Para $\alpha = (v_i)$ família de vetores em V definimos $C_T(\alpha) := \sum C_T(v_i)$.

Nota. Se $\dim V = n < \infty$, então num análise analogo da □ 8.1.3. pode-se construir $m_{T,v} = m_v$ com $m := \min\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : C_T^k(v) \text{ é l.d.}\}$. Também, note que $C_T(v) \subseteq V_{m_v}$ que é T -inv, logo, sendo $S = T|_{V_{m_v}}$ temos $m_v = m_S$.

⊠ **8.1.9.** $\forall v \in V$ temos $m_v \mid m_T$. $\rightarrow$ Segue da observação acima e □ 8.1.7.

□ **8.1.11.** Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $p_1, p_2, \dots, p_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ co-primos dois a dois. Então, a soma $\sum^m V_{p_j}^\infty$ é direta.

Seguendo □ 5.4.6., pega $v_j \in V_{p_j}^\infty \setminus \{0\}$ e mostra que $\alpha = (v_j)$ é l.i.. Faz por indução, no passo indutivo suponha $\sum^m a_j v_j = 0$ e $g = \prod_{j < m} p_j$. Usa o □ 8.1.6. com cada $g_j = p_j$ e $f = p_m$ pra concluir $a_m = 0$.

□ **8.1.12.** Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $f_1, f_2, \dots, f_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ co-primos dois a dois e $f = \prod^m f_j$. Então, $V_f = \bigoplus V_{f_j}$. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha [1, Pág. 261]

■ **8.1.13.** (*Decomposição Primária*) Sejam $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $\prod^m p_j^{k_j}$ a fatoração em primos de m_T . Então, $V = \bigoplus_{p_j} V_{p_j^{k_j}}$.

Faça $p_j^{k_j} = f_j$ na □ 8.1.12., o resultado segue do fato de $V = V_{m_T}$.

Nota. Os termos da soma em ■ 8.1.13. são chamados de *subespaços T -primarios*.

□ **8.1.16.** Sejam $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo e $u, v \in V$ tais que $m_u = m_v = p$. Então, ocorre exatamente uma das duas opções a seguir,

- i. $C_T(u) = C_T(v)$.
- ii. $C_T(u) \cap C_T(v) = \{0\}$.

Exercise $C_T(v) = \{q(T)(v) : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$. $\rightarrow$ Prova conjuntista

O resultado segue de mostrar $\forall w \in C_T(v), C_T(v) = C_T(w)$. Prova as duas contenções usando o exercício acima e ■ (Bézout).

□ **8.1.17.** Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo : $\dim V_p < \infty$. Então, $\exists l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $v_1, v_2, \dots, v_l \in V_p$ tais que $V_p = \bigoplus^l C_T(v_k)$.

Basta ver que $\forall v \in V_p \setminus \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$ temos $C_T(v) \cap \bigoplus^{l-1} C_T(v_k) = \{0\}$. Suponha $w \neq 0$ naquela interseção e usa os varios fatos em □ 8.1.16. pra contradizer, conseguindo ver que $v \in \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$.

□ **8.1.18.** Seja $p_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo tal que $\dim V_{p_j}^\infty < \infty$. Então,

$$\text{gr}(p_j) \mid \dim V_{p_j}^\infty \text{ e } n_j := \frac{\dim V_{p_j}^\infty}{\text{gr}(p_j)} \geq \min\{k : V_{p_j}^\infty = V_{p_j^k}\}.$$

$\rightarrow$ A demonstração não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 263].

Nota. Pode e deve-se verificar que $\min\{k : V_p^\infty = V_{p^k}\} = k_j$ do ■ 8.1.13., é assim que conseguimos definir o *polinômio carateristico* como sendo $c_T := \prod^m p_j^{n_j} \in \mathcal{A}_T$, exatamente o mesmo do ■ (Caley-Hamilton).

Encontrando a Descomposição Primária

Passo 1. Escolha uma base α pra seu espaço V e determine $[T]_\alpha^\alpha = A$.

Sejam V $\mathbb{R}$ -espaço e $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Passo 2. Encontre $c_T = \det(t\mathbb{1}_V - A)$ e sua fatoração em primos $c_T = \prod^m p_j^{n_j}$.

$\rightarrow$ Precisa habilidade na hora das contas do $\det$

$$\begin{array}{ccc} F_1 \rightarrow F_1 - F_4 & & \\ & \downarrow & \\ & F_2 \rightarrow F_2 + F_3 & \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{vmatrix} t & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & t-3 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & t & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t-2 \end{vmatrix} = c_T$$

$$\begin{vmatrix} (t-1) & 0 & 0 & -(t-1) & 0 \\ 0 & (t-1) & (t-1) & 0 & 0 \\ 2 & 2 & t & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}^{(*)} = (t-2)(t-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & t & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t \end{vmatrix}$$

$$(t-2)(t-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & t \end{vmatrix} \begin{vmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{vmatrix} = (t-2)(t-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & t \\ 0 & 0 & 0 & t & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t \end{vmatrix} \xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 - F_2 - F_1}$$

$$c_T = (t-2)^2(t-1)^2(t^2+1)$$

Passo 3. Estude subespaços e encontre o min $k : \dim V_{p_j^k} = \text{gr}(p_j)n_j$.

$$V_{t-1} = \ker \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{(*)} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$F_4 \xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 + F_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ -a \\ c \\ -c \\ -c \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \dim V_{t-1} = 2$$

$$V_{t-2} = \ker \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{(*)} \xrightarrow[F_4 \rightarrow F_4 - F_2 - F_1]{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} F_4 \rightarrow F_4 + F_3 \\ F_3 \rightarrow 2F_3 + F_5 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ -a \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \dim V_{t-2} = 1$$

$$m_T = (t-2)^2(t-1)(t^2+1) \text{ e } V_T = V_{(t-2)^2} \oplus V_{t-1} \oplus V_{t^2+1}$$

8.2. Complementos Invariantes e Bases Cíclicas

8.3. Formas Canônicas

§ 9. Multilinearidade

Em diante entendemos $\Pi V_j = V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k$ como o espaço vetorial dado pelo produto cartesiano dos $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais V_j com $j \leq k \in \mathbb{N}$.

◇ Sejam ΠV_j e W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Denotamos por $\mathcal{F}(\Pi V_j, W)$ o conjunto de todas as funções $f : \Pi V_j \rightarrow W$.

◇ Uma função $\phi \in \mathcal{F}(\Pi^k V_j, W)$ é *k-linear* se é linear em cada entrada. Ou seja, $\forall j_0 \leq k$ fixo, $\forall (v_{1,j})_{j_0}, (v_{2,j})_{j_0} \in \Pi V_j$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ temos,

$$\phi_{j_0}(\cdots, v_{1,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \cdots) = \phi((v_{1,j})_{j_0}) + \lambda \phi((v_{2,j})_{j_0}).^1$$

◇ $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) := \{\phi \in \mathcal{F}(\Pi V_j, W) : \phi \text{ é } k\text{-linear}\}.$

Nota. Se $\forall j \leq k, V_j = V$, então $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. Se $W = \mathbb{F}$, chamamos seus elementos de *formas k-lineares* em V .

$$U \leq \Pi V_j \not\Rightarrow \phi(U) \leq W$$

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2$, $W = \mathbb{F}^4$ e $\phi : \mathbb{F}^2 \times \mathbb{F}^2 \ni ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \mapsto (x_1 x_2, x_1 y_2, y_1 x_2, y_1 y_2) \in \mathbb{F}^4$. $\rightarrow$ Veja que é bilinear, logo que $\text{Im } \phi = \{(a_j) : a_1 a_4 = a_2 a_3\}$, pegue dois caras $u, v \in \text{Im } \phi : u + v \notin \text{Im } \phi$

■ **9.1.3.** $\forall j \leq k$ seja $\alpha_j = (v_{i,j})_{i \in I_j}$ base de V_j , $I = \Pi^k I_j$ e $(w_i)_{i \in I}$ família de vetores em W . Então, $\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) : \forall i \in I$ temos $\phi((v_i)_{i,j}) = w_i$.

Pra $(v_{1,j}) \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ e $\forall j \leq k$ sejam $(a_{i,j,j}) = [v_{1,j}]_{\alpha_j}$ com $i_j \leq m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, supondo ϕ seja *k-linear* e $I_m := \prod I_{m_j}$ mostre,

$$\phi((v_{1,j})) = \sum_{i \in I_m} \left(\prod a_{i,j,j} \right) \cdot \phi((v_i)_{i,j}).$$

Use aquela expressão pra replicar a demonstração do ■ 6.1.6..

¹Entendase $(v_{i,j})_{j_0} \in \Pi V_j : \forall j \neq j_0, v_{i,j} \in V_j$ ta fixo.

□ **9.1.4.** Sejam V_j e α_j como no ■ 9.1.3., $\beta = (w_s)_{s \in S}$ uma base de W e $\forall(\mathbf{i}, s) \in I \times S$, $\phi_{\mathbf{i},s} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ o único tal que $\forall \tilde{\mathbf{i}} \in I$, $\phi_{\mathbf{i},s}((v_{\tilde{\mathbf{i}},j})) = \delta_{\mathbf{i},\tilde{\mathbf{i}}} w_s$. Então, $(\phi_{\mathbf{i},s})$ é l.i., mas ainda, se $\forall j \leq k$, $\dim V_j < \infty$, a família é base do $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$.

→ A demonstração não suporta resumo, mais segue sendo o mesmo negócio de sempre, pega $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \subseteq I \times S$ finita e mostra que $\sum^m a_l \phi_{\gamma_l} = 0 \Leftrightarrow \forall l \leq m, a_l = 0$, olha se quiser [1, Pág. 299]

⊠ Se $\forall j \leq k$, $\dim V_j < \infty$, então $\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) = \dim W \cdot \prod \dim V_j$.²

9.2. Dualidade

◇ Seja V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Denotamos por $V' := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F})$, o *espaço dual* de V , $f \in V'$ é chamado de *funcional linear* em V .

◇ Sejam W e V $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Chamamos de *pareamento bilinear* os elementos $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(W \times V, \mathbb{F})$.

Exemplo $\text{av} : V' \times V \ni (f, v) \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$. → Função avaliação, mostre que ta bém definida, ou seja, $\text{av} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V' \times V, \mathbb{F})$

Nota. Segue da □ 9.1.4. que se $\alpha = (v_i)$ é base de V , então $\alpha' = (f_i)$, onde $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ é l.i. em V' , base no caso $\dim V < \infty$.³

⊠ **9.2.1.** Seja $v \in V$ tal que $\forall f \in V'$, $f(v) = 0$, então $v = 0$. → Se $v \neq 0$, então $\exists \alpha$ base de V tal que $v = v_{i_0} \in \alpha$, assim $f_{i_0}(v_{i_0}) = 1 \neq 0$

□ **9.2.2.** Seja I tal que $\#I = \dim V$, então $V' \cong \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$.

Sejam $\alpha = (v_i)$ base de V e $\mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \sim a : i \mapsto a_i \in \mathbb{F}$. Trabalha com $T : V' \ni f \mapsto (f(v_i)) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$ e $S : \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \mapsto (f : v_j \mapsto a_j)$, mostra que são lineares e inversas a uma da outra.

⊠ Segue de □ 9.2.2. que se $\dim V = \infty$, então $[\alpha'] \subset V'$. → Na demonstração $T([\alpha']) = \{(a_i) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) : a_i \neq 0 \text{ em finitos } i\} \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \cong V'$

Nota. Isso só mostra que α' não é base de V' , afirmar $\dim V' > \dim V$ mesmo sendo certa, precisa mais coisa (analisé de cardinais).

□ Sendo V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função $J_V : V \ni v \mapsto J_V(v) : f \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$ é bém

²Se $\exists j_0 \leq k : \dim V_{j_0} = \infty$, então $\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) > \dim W \cdot \prod \dim V_j$. → Não é trivial

³Aquí pensamos em $W = \mathbb{F} = [1]$, espaço vetorial de dimensão um sobre se mesmo.

definida, linear e injetora.

Bém definida é ver que $J_V(v) \in V''$, olha pra $J_V(v)(f + \lambda g)$. Linearidade é quase-imediata e a última afirmação segue do [9.2.1.](#)

☒ Se $\dim V < \infty$, então $\dim V = \dim V' = \dim V''$ e $J_V : V \cong V''$.

□ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. O *operador adjunto*, $T' : W' \ni f \mapsto f \circ T \in V' \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W', V')$. → Propriedades da composição

□ **9.2.3.** Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais de dimensão finita, α, β bases pra eles respectivamente e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. Então, $[T']_{\alpha'}^{\beta'} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^t$.

Sejam $\alpha = (v_j), \beta = (w_i)$ e $[T]_{\beta}^{\alpha} = (a_{ij})$. Escreva $T(v_j) = \sum^m a_{ij} w_i$, logo note que a entrada b_{ji} da $[T']_{\alpha'}^{\beta'}$ é precisamente $T'(g_i)(v_j)$.

9.3. Pareamentos Bilineares

Agora queremos um análogo geral do produto interno visto no [1, Cáp. 7], que aqui é apenas um exemplo de forma bilinear com $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$.

$$\diamond B(V, W) := \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V \times W, \mathbb{F}) \text{ e } B(V) = B(V, V).$$

◊ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços de dimensão finita, α, β bases e $\phi \in B(V, W)$. A *matriz associada* $_{\alpha}[\phi]_{\beta} := (\phi(v_i, w_j))_{i,j}$ determina ϕ no sentido, $[v]_{\alpha}^t \cdot _{\alpha}[\phi]_{\beta} \cdot [w]_{\beta} = \phi(v, w)$.⁴

Nota. É importante entender essa continha $\phi(\sum^m a_i v_i, \sum^n b_j w_j)$.

□ **9.3.1.** Sejam $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \dim V = n$ e $\dim W = m$. Então, $\Phi : B(V, W) \ni \phi \mapsto _{\alpha}[\phi]_{\beta} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ é isomorfismo. Em particular, $\dim B(V, W) = nm$.

Segue de propriedades das matrices, pra a sobrejetividade pega $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ e mostra que $\phi(v, w) := [v]_{\alpha}^t \cdot A \cdot [w]_{\beta} \in B(V, W)$.

Exemplo Se $f \in V'$ e $g \in W'$, então $\phi(v, w) := f(v)g(w) \in B(V, W)$.

◊ Considere as transformações (lineares) $_{\phi}D : V \rightarrow W'$ e $D_{\phi} : W \rightarrow V'$ tais que $_{\phi}D(w)(v) = D_{\phi}(v)(w) = \phi(v, w)$. Definimos:

★ *Radical a esquerda* $\rightarrow \ker _{\phi}D \ni v \leftarrow$ *Vetor degenerado a esquerda.*

⁴Em geral, $_{\alpha}[\phi]_{\beta}$ pode-se definir pra famílias de vetores.

★ ϕ é não degenerada a esquerda sse $\ker \phi D = \{0\}$.

Com definições análogas pra o caso de D_ϕ (direita).

□ **9.3.3.** Se α e β são bases finitas de V e W respetivamente, então $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta = {}_\alpha[\phi]_\beta$ e $[\phi D]_{\beta'}^\alpha = ([D_\phi]_{\alpha'}^\beta)^t$. Em particular, $\text{pt } \phi := \text{pt } D_\phi = \text{pt } {}_\phi D$.

Como na □ 9.2.3. a gente ganha, de trabalhar com α' mesma que a entrada (i, j) de $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta$ é justamente $D_\phi(w_j, v_i) = \phi(v_i, w_j)$, a outra igualdade consegue-se num análise semelhante.

☒ **9.3.4.** Se $\dim V$ (ou W) é finita e $\ker \phi D = \{0\}$, são equivalentes:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| i. $\{0\} = \ker D_\phi$. | ii. $\dim V = \dim W$. |
| iii. ${}_\phi D$ é isomorfismo. | iv. D_ϕ é isomorfismo. |

Prova i, iii, iv $\Leftrightarrow$ ii. Não é difícil, pra as voltas usa □ 9.3.3.. O resultado também vale trocando $\ker \phi D$ por $\ker D_\phi$

Nota. Se $\phi \in B(V)$ e $\dim V < \infty$ temos $\ker \phi D = \{0\} \Leftrightarrow \ker D_\phi = \{0\}$, então dizemos simplesmente ϕ não degenerada.

◊ Uma forma bilinear $\phi \in B(V)$ é —★— se $\forall v, w \in V$,

- ★ *Simétrica* $\rightarrow \phi(v, w) = \phi(w, v)$. ★ *Alternada* $\rightarrow \phi(v, v) = 0$.
- ★ *Antisimétrica* $\rightarrow \phi(v, w) = -\phi(w, v)$.

Exercise Seja $\phi \in B(V)$. Se $\text{car } \mathbb{F} = 2$, então ϕ simétrica $\Leftrightarrow \phi$ antisimétrica. Caso contrario, ϕ antisimétrica $\Leftrightarrow \phi$ alternada.

□ **9.3.5.** Sejam $\phi \in B(V)$ e $\alpha = (v_i)$ uma base de V . Então,

- (a) ϕ é (anti)simétrica $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$ é (anti)simétrica.
- (b) ϕ é alternada $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$ é antisimétrica e $\text{diag}({}_\alpha[\phi]_\alpha) = (0, 0, \dots)$.

◊ Sendo $\phi \in B(V)$ defina a relação binária $\perp_\phi$ em V dada por $v \perp_\phi w \Leftrightarrow \phi(v, w) = 0$. Um vetor vai ser *isotrópico* se $v \perp_\phi v$.

◊ $\alpha^{\perp_\phi} := \{w \in V : \alpha \perp_\phi w\}$ e ${}^{\perp_\phi}\alpha := \{v \in V : v \perp_\phi \alpha\}$. ⁵

⁵Sendo $\alpha = (v_i)$ entendase $\alpha \perp_\phi w$ como os $w \in V : \forall i \in I, v_i \perp_\phi w$.

Nota. Ambos $\alpha^{\perp\phi}$ e ${}^{\perp\phi}\alpha$ são os *subespaços ortogonais* a direita e esquerda, respectivamente. Em particular, $\ker D_\phi = V^{\perp\phi}$ e $\ker {}_\phi D = {}^{\perp\phi}V$.

□ **9.3.6.** Se $\dim V < \infty$, são equivalentes:

- i. ϕ degenerada. ii. $V^{\perp\phi} \neq \{0\}$. iii. ${}^{\perp\phi}V \neq \{0\}$.

Além disso, $\text{pt } \phi = \dim V - \dim V^{\perp\phi} = \dim V - \dim {}^{\perp\phi}V$.

□ **9.3.7.** A relação $(V, \perp_\phi)$ é simétrica $\Leftrightarrow \phi$ é simétrica ou alternada. $\rightarrow$ Não admite resumo, olha se quiser [1, Pág. 309]

Nota. Se $W \leq V$ e $\phi \in B(V)$, então $\phi|_W \in B(W)$.

As restrições não respeitam degeneração

Exemplo Se ϕ é degenerada basta pegar $W = [w]$, com $w \in V$ não isotrópico pra ter $\phi|_W$ não degenerada em $B(W)$.

Exemplo O espaço de Minkowski, $V = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ equipado com ${}_\alpha[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 1, 1, -1)$ é não degenerado mais qualquer $w = (\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\|) \in V$ é isotrópico e portanto $\phi|_W$ com $W = [w]$ é degenerada em $B(W)$.

9.4. Bases Hiperbólicas e Ortogonais

O objetivo nesta seção é estabelecer versões simplificadas pra ${}_\alpha[\phi]_\alpha$ no caso das formas bilineares simétricas e alternadas.

◇ $B_a(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é alternada}\}$ e $B_s(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é simétrica}\}$.
 $\rightarrow$ É obvio quem va ser $B_{as}(V)$

Nota. Se $\phi \in B_{as}(V)$ segue da □ 9.3.7. que ${}^{\perp\phi}\alpha = \alpha^{\perp\phi}$. De aquí pra frente sejam $\dim V < \infty$ e ϕ fixos, escrevemos simplesmente $\alpha^\perp$.

◇ $W \leq V$ é degenerado se $\phi|_W$ é denegerada em $B_{as}(W)$.

$$\diamond \text{ rad } W := W \cap W^\perp.$$

□ i. W é degenerado $\Leftrightarrow \text{rad } W \neq \{0\}$. $\rightarrow \text{pt } \phi|_W = \dim W - \dim(\text{rad } W)$

ii. Se $V = V^\perp \oplus W$, então $\text{rad } W = \{0\}$. $\rightarrow \text{rad } W \subseteq V^\perp$

□ **9.4.1.** Sejam $W \leq V$ e ϕ não degenerada. Então,

- (a) $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$. (b) $V = W + W^\perp \Leftrightarrow W \cap W^\perp = \{0\}$.

$$(c) (W^\perp)^\perp = W.$$

$$(d) \operatorname{rad} W = \operatorname{rad} W^\perp.$$

Exercise Seja $W \leq V$, então $\forall f \in W', \exists \tilde{f} \in V'$ tal que $\tilde{f}|_W = f$.

(a) Mostra que $T : V \ni v \mapsto \phi D(v)|_W \in W'$ e $\ker T = W^\perp$; (b) é óbvia; (c) $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ sempre, a outra continuação segue de fazer $W = W^\perp$ em (a); (d) é consequência de (c).

ϕ degenerada não conclui nada em $\square$ 9.4.1.

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2$, $[\phi]_\alpha = \operatorname{diag}(1, 0)$ na base canônica e $W = [e_2]$. Falham todas as conclusões da $\square$ 9.4.1..

$\square$ 9.4.3. Sejam $W \leq V$. Então, $V = W \oplus W^\perp \Leftrightarrow W$ é não degenerado.

($\Rightarrow$) Imediata. ($\Leftarrow$) Cola o argumento usado pra $\square$ 9.4.1. (a) e (b) notando que $\phi D|_W = \psi D : W \rightarrow W'$ é isomorfismo.

$\diamond$ Sejam $\phi \in B_a(V)$ e $(v, w) \in V \times V$, definimos:

- ★ *Par hiperbólico (ordenado)* $\rightarrow (v, w) : \phi(v, w) = -1$ e seu respectivo *plano hiperbólico* $\rightarrow [v, w] \leq V$.
- ★ *$\mathbb{F}$ -espaço hiperbólico* $\rightarrow V = \bigoplus^m V_j : \forall j \leq m, V_j$ é plano hiperbólico e $\forall i \neq j, V_i \perp V_j$.

Nota. Se V for hiperbólico, então na base (ordenada) $\alpha = (v_j, w_j)$ temos $[\phi]_\alpha = H_m = \operatorname{diag}(H_j), j \leq m$. Em particular, $H_j = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ϕ é não degenerada.

■ 9.4.4. Se $\phi \in B_a(V)$, então $\forall W \leq V$ complementar de $V^\perp, \exists \alpha$ base de V tal que $[\phi]_\alpha = \operatorname{diag}(H_m, 0)$, onde $m = \operatorname{pt} \phi/2$.⁶

Da $\square$ 9.4.3., podemos supor ϕ é não degenerada (vía restrição). Faz por indução em $\dim V$. Note que $\exists v, u \in V : \phi(v, u) = a \in \mathbb{F}^\times \Rightarrow \exists (v, w)$ hiperbólico $\Rightarrow [v, w]$ é não degenerado. Segue de $\square$ 9.4.3. que $V = [v, w] \oplus [v, w]^\perp$ e de $\square$ 9.4.1. (d) que $[v, w]^\perp$ é não degenerado.

Nota. As bases hiperbólicas são pra as alternadas o que são (seram) as ortogonais pra o produto interno (simétricas).

⁶O posto de uma matriz antisimétrica sempre é par :o.

■ **9.4.6.** Se $\phi \in B_s(V)$ e $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$, $\exists \alpha$ base de V ortogonal respeito de ϕ .

$B_a(V) \cap B_s(B) = \{0\} \Rightarrow \exists v_1 \in V : \phi(v_1, v_1) \neq 0$. Segue da □ 9.4.3. que $V = [v_1] \oplus [v_1]^\perp$, $\phi|_{[v_1]^\perp}$ é simétrica. O resultado segue por indução.

⊠ No contexto do ■ 9.4.6. se $\alpha = (w_j)$ e $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, então $\exists \alpha_o$ base de Sylvester (subtraída da α) fazendo $\alpha_o = (a_j w_j)$, onde $a_j : a_j^2 = \frac{\pm 1}{\phi(w_j, w_j)}$. Se β é uma completação da base, $[\phi]_\beta = \text{diag}([-1_i], [1_{p-i}], [0])$.

◇ Sejam $\phi \in B_s(V)$ e $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$, dizemos que ϕ é (semi-)definida positiva se $\forall v \in V \setminus \{0\}$, $\phi(v, v) \geq 0$. Análogo pra o caso negativo.

◇ $i(\phi) := \max\{\dim W : W \leq V \text{ e } \phi|_W < 0\}$ e $\text{sign}(\phi) := \text{pt } \phi - 2i(\phi)$.

Nota. $i(\phi) \leq \text{pt } \phi, \phi \geq 0 \Leftrightarrow i(\phi) = 0$ e $\phi < 0 \Leftrightarrow i(\phi) = \dim V$. Note que a base de Sylvester fornece toda a informação, posto, índice de negatividade e assinatura.

■ **9.4.7.** (Lei de Inercia de Sylvester) Sejam $\phi \in B_s(V)$, $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$ e $\alpha = (v_j)$ base ortogonal pra V respeito da ϕ . Então, $i(\phi) = \#\{j : \phi(v_j, v_j) < 0\}$.

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 316]

9.5. Transformações Ortogonais e Simpléticas

9.6. Adjunção

§ 10. Álgebra Tensorial


10.1. Propiedades Universais

◇ Sejam P_1, P_2 propiedades de funções. Dados X, U conjuntos e $\phi \in \mathcal{F}(X, U)$, diz-se que (ϕ, U) é *universal* em X respeito de P_1 e P_2 se:

$$\forall \psi \in \mathcal{F}(X, A) \mid P_1, \exists ! \tilde{\psi} \in \mathcal{F}(U, A) \mid P_2 \text{ e } \tilde{\psi} \circ \phi = \psi.$$

Exemplo

- $U = V$ $\mathbb{F}$ -espaço vetorial.
- $X = I$ e $\phi = \alpha : I \rightarrow V$.
- $P_1 = "A = W \text{ é } \mathbb{F}\text{-espaço vetorial}"$.
- $P_2 = "ser linear"$.



(α, V) é universal em $I \iff \alpha$ é base de V . $\rightarrow$ Olha [1, Pág. 337]


□ **10.1.2.** Sejam (ϕ, U) universal em X respeito de P_1 e P_2 , $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}(U, A) \mid P_2$. Se $\psi_1 \circ \phi = \psi_2 \circ \phi \mid P_1$, então $\psi_1 = \psi_2$.

Segue da universalidade de (U, ϕ) em X tomando $\psi = \psi_1 \circ \phi$.



Uma propriedade funcional P é *compatível com composições* se $f \circ g \mid P$ toda vez que $\exists f \circ g$ e ambas f e g verifiquem P .

□ **10.1.3.** Sejam (ϕ_a, U) e (ϕ_b, V) universais em X respeito de P_1 e P_2 . Se $\phi_a, \phi_b \mid P_1$; $\mathbb{1}_U, \mathbb{1}_V \mid P_2$ e P_2 compatível com composições, então $\exists! f : U \rightarrow V \mid P_2$ tal que $\phi_b = f \circ \phi_a$. Além disso, aquela f é bijeção.



Da universalidade $\exists! \tilde{\psi}_a, \tilde{\psi}_b$ como no diagrama. Veja que $\tilde{\psi}_a$ e $\tilde{\psi}_b$ são inversas a uma da outra. Comece por mostrar primeiro que $(\tilde{\psi}_a \circ \tilde{\psi}_b) \circ \phi_a = \mathbb{1}_U \circ \phi_a$ e $(\tilde{\psi}_b \circ \tilde{\psi}_a) \circ \phi_b = \mathbb{1}_V \circ \phi_b$, conclua usando o □ 10.1.2..

Nota. Pares universais são únicos a menos de um único isomorfismo.

10.2. Produto Tensorial



Seja (V_j) família de $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais, $j \leq k \in \mathbb{N}$. Um $\mathbb{F}$ -produto tensorial pra (V_j) é um par universal (ϕ, V) sobre $X = \Pi V_j$ onde,

- V é $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, V)$.
- $P_1 = "ser k\text{-linear}"$ e $P_2 = "ser linear"$.

■ **10.2.1.** $\forall (V_j), \exists (\phi, V)$ produto tensorial. Além disso, se $\forall j \leq k, \alpha_j$ for base de V_j , então $\phi \circ (\Pi \alpha_j)$ é base de V .

Sejam $\alpha := \Pi\alpha_j$, $V : \dim V = \#\alpha$ e $\iota : \alpha \rightarrow V$ base pra V indexada por α . Segue do ■ 9.1.3. que $\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, V) : \phi|_{\alpha} = \iota$. Conclui mostrando que o par (ϕ, V) é universal.

■ **10.2.2.** Seja (ϕ, V) produto tensorial pra (V_j) . Então, $\forall W$ $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função $\Gamma : \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ é isomorfismo.

Injetora por consequência do □ 10.1.2. e sobrejetiva pois se $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$, então $\psi = T \circ \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$. Pra ver a linearidade mostra que $\forall \psi, \xi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$, $(\tilde{\psi} + \lambda \tilde{\xi}) \circ \phi = \psi + \lambda \xi$.

Nota. Notação padrão pra producto tensorial, $(\phi, V) = (\otimes, \otimes V_j)$. A k -linearidade fica, $\cdots \otimes v_{1,j_0} + \lambda v_{2,j_0} \otimes \cdots = \otimes((v_{1,j})_{j_0}) + \lambda \otimes((v_{2,j})_{j_0})$.

□ **10.2.3.** Dado $1 \leq l < k$, $\exists! \Gamma : \otimes V_j \rightarrow (\otimes^l V_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k V_j)$ isomorfismo tal que, $\forall j \leq k$, $\forall v_j \in V_j$, $\Gamma : \otimes v_j \mapsto (\otimes^l v_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k v_j)$.

Defina $\phi_b : \Pi V_j \rightarrow W = (\otimes^l V_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k V_j)$ e tente mostrar que o par (ϕ_b, W) também é universal em ΠV_j . O resultado segue do □ 10.1.3..

□ **10.2.4.** $\forall j \leq k$ sejam $W_j \leq V_j$. Então, $\exists! \tilde{\Gamma} : \otimes W_j \hookrightarrow \otimes V_j$ linear injetora tal que $\forall j \leq k$, $\forall w_j \in W_j$, $\tilde{\Gamma} : \otimes w_j \mapsto \otimes w_j$.

No contexto da □ 10.2.3. $\exists! \Gamma_v : \otimes V_j \rightarrow \otimes(V_j)$ e $\exists! \Gamma_w : \otimes W_j \rightarrow \otimes(W_j)$ isomorfismos. Faça $\tilde{\Gamma} = \Gamma_v^{-1} \circ \Gamma_w$.

$$\boxtimes \otimes v_j = 0 \Leftrightarrow \exists j \leq k : v_j = 0.$$

Nota. Do ■ 10.2.1. sabemos que $[\otimes v_j] = \otimes V_j$, então $\forall \mathbf{v} \in \otimes V_j$, $\exists m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $\exists v_{i,j} \in V_j \setminus \{0\} : \mathbf{v} = \sum_{i \leq m} \otimes v_{i,j}$, ou seja, $\mathbf{v}$ é soma de *tensores puros*.

$$\diamond \text{ pt}(\mathbf{v}) := \min\{m \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \mathbf{v} = \sum_{i \leq m} \otimes v_{i,j}\}.$$

$\exists \mathbf{v} \in \otimes V_j$ não puro

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2$ e $\mathbf{v} = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 \in \otimes^3 V_j$. $\rightarrow$ Suponha que $\exists v_i = a_{i,1}e_1 + a_{i,2}e_2 : \mathbf{v} = v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ e contradiga

Nota. Passamos a ver o caso $k = 2$, o único que da pra fazer conta e deduzir alguns fatos respeito do posto de um tensor e como calculá-lo.

□ **10.2.6.** Seja $\mathbf{u} \in V \otimes W$: $\text{pt } \mathbf{u} = m$. Se $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_j)$, $j \leq m$, são famílias de vetores em V e W tais que $\mathbf{u} = \sum^m v_j \otimes w_j$, então α e β são l.i..

Faz por contrapositiva, suponha que $w_m = \sum^{m-1} a_j w_j$ e usa a k -linearidade pra ver que $\mathbf{u} = \sum^{m-1} (v_j + a_j v_m) \otimes w_j$.

□ $\forall \mathbf{u} \in V \otimes W$, $\text{pt } \mathbf{u} \leq \min\{\dim V, \dim W\}$.

□ **10.2.7.** Sejam $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\alpha_1 = (v_{1,j})_{j \leq m}$, $\alpha_2 = (v_{2,j})_{j \leq p}$, famílias em V e $\beta_1 = (w_{1,j})_{j \leq m}$, $\beta_2 = (w_{2,j})_{j \leq p}$ famílias em W tais que $\sum^m v_{1,j} \otimes w_{1,j} = \sum^p v_{2,j} \otimes w_{2,j}$. Se α_1, α_2 e β_2 foram l.i., então $[\beta_1] \subseteq [\beta_2]$. Em particular, se $p = 0$, $\forall j \leq m$, $w_j = 0$.

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 344]

□ **10.2.8.** Seja $\mathbf{u} = \sum^m v_j \otimes w_j \in V \otimes W$. Então, $\text{pt } \mathbf{u} = m \iff (v_j)$ e (w_j) são l.i. em V e W , respetivamente. → Segue dos □ 10.2.6. e □ 10.2.7.

Na pratica agrupamos usando k -linearidade até conseguir famílias l.i..

Exemplo Em $V = \mathbb{Q}^2$, $\mathbf{u}_1 = 5e_1 \otimes e_1 - 3e_2 \otimes e_2 \in V \otimes V \Rightarrow \text{pt } \mathbf{u}_1 = 2$, mientras,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_2 &= (e_1 + e_2) \otimes (e_1 - e_2) + (e_1 + 2e_2) \otimes e_2 + (e_1 - e_2) \otimes (e_1 + e_2) \\ &= (e_1 + e_2) \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + (e_1 - e_2) \otimes (e_1 + e_2) \\ &= (e_1 + e_2) \otimes e_1 + e_1 \otimes e_2 + (e_1 - e_2) \otimes e_1 \\ &= 2e_1 \otimes e_1 + e_1 \otimes e_2 = e_1 \otimes (2e_1 + e_2) \Rightarrow \text{pt } \mathbf{u}_2 = 1 \end{aligned}$$

□ **10.2.10.** $\exists! \Gamma : V' \otimes W \ni f \otimes w \mapsto \Gamma(f \otimes w) : \bigcup_{\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V,W)} V \ni v \mapsto f(v)w \in W$.¹ Além disso,

Exercise 9.2.5. Sejam $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ e $(f_j)_{j \leq m}$ familia l.i. em V' . Então, $\forall j \leq m, \exists v \in V : \forall i \leq m, f_i(v) = \delta_{ij}$. → $T : V \ni v \mapsto (f_j(v)) \in \mathbb{F}^m \iff T' : (\mathbb{F}^m)' \hookrightarrow V'$

(a) Γ é injetora

Sejam $\mathbf{u} \in \ker \Gamma$, (f_j) e (w_j) l.i. em V' e W tais que $\mathbf{u} = \sum^m f_j \otimes w_j$, se $m > 0$, então do exercício acima $\exists v : 0 = \Gamma(\mathbf{u})(v) = \sum^m f_j(v)w_j \rightarrow \leftarrow$.

(b) $\forall \mathbf{u} \in V' \otimes W$, $\text{pt}(\Gamma(\mathbf{u})) = \text{pt } \mathbf{u}$

De novo sejam $\mathbf{u} = \sum^m f_j \otimes w_j$, sendo $\beta = (w_j)$ mostra que $\text{Im}(\Gamma(\mathbf{u})) = [\beta]$, usa de novo o mesmo exercício.

¹Propriedade universal no pareamento bilinear $\psi : V' \times W \ni (f, w) \mapsto f(v)w$.

$$(c) \ T \in \text{Im } \Gamma \Leftrightarrow \text{pt } T < \infty$$

($\Rightarrow$) Segue de (b) lembrando que $\forall \mathbf{u} \in V \otimes W$, $\text{pt } \mathbf{u} < \infty$. ($\Leftarrow$) Seja $(w_j)_{j \leq m}$ base pra $\text{Im } T$ e (v_i) base de V , então $T(v_i) = \sum^m a_{ij} w_j$, $\forall j \leq m$, $\exists! f_j : f_j(v_i) = a_{ij}$, calcula $\Gamma(\sum^m f_j \otimes w_j)$ e conclui.

$$(d) \ \Gamma \text{ sobrejetora} \Leftrightarrow \dim V < \infty \text{ ou } \dim W < \infty$$

($\Leftarrow$) Direta de (c). ($\Rightarrow$) Faz por contrapositiva, se $\dim V$ e $\dim W$ foram ambas infinitas, $\exists T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) : \text{pt } T = \infty$, logo usa (c) de novo.

Nota. $\Gamma : V' \otimes W \cong F := \{T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) : \text{pt } T < \infty\}$. Se $\alpha = (v_j)_{j \leq n}$, $\alpha' = (f_j)$ e $\beta = (w_i)_{i \leq m}$, então $[\Gamma(f_j \otimes w_i)]_{\beta}^{\alpha} = E_{ij}$. Assim,

$$[T]_{\beta}^{\alpha} = (a_{ij}) \Rightarrow T = \Gamma\left(\sum_{i,j} a_{ij} f_j \otimes w_i\right).$$

$\square$ **10.2.11.** $\exists! \tau \in (V' \otimes V)'$ tal que $\tau : V' \otimes V \ni f \otimes v \mapsto f(v)$. Além disso, se $\dim V < \infty$ e Γ fora como na $\square$ 10.2.10., então $\forall T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, $\tau(\Gamma^{-1}(T)) = \text{tr } T$.

$\exists! \tau$ segue da propriedade universal em $\psi = \text{av}$. Seja $\alpha = (v_j)$ base pra V , da nota previa $[T]_{\alpha}^{\alpha} \Rightarrow \Gamma^{-1}(T) = \sum_{i,j} a_{ij} f_j \otimes v_i$, faça a continha $\tau(\Gamma^{-1}(T))$.

References

- [1] Moura, Adriano (2025). *Álgebra Linear com Geometria Analítica*. UNICAMP, Campinas, SP.