

Recommandations terreaux et fertigation des transplants

Ferme : Décembre Inc

Date : 24 avril 2026

Séquences recommandées 2026

Laitue (3 semaines pépinières + 1 semaine endurcissement)

- Terreau OM2 Berger + engrais Selectus au taux de 3 kg/m³ de terreau de semis décompressé
- Conditionnement du terreau minimalement 48h et jusqu'à 1 semaine
- Semaine 1 : semis sans fertigation supplémentaire
- Semaine 2 : 1 à 2 fertigation à 50 ppm (tableau ci-dessous)
- Semaine 3 : 1 à 2 fertigation à 50 ppm
- Semaine 4 : 1 à 2 fertigation à 75 ppm + ajout d'algue brune + biofongicide préventif homologué à base de *trichoderma sp.* (votre bassinage prévu au début de la phase d'endurcissement)

Épinard (3 semaines pépinières + 1 semaine endurcissement)

- Terreau OM2 Berger + engrais Selectus au taux de 5 kg/m³ de terreau de semis décompressé
- Conditionnement du terreau minimalement 48h et jusqu'à 1 semaine
- Semaine 1 : semis sans fertigation supplémentaire
- Semaine 2 : 1 à 2 fertigation à 50 ppm (tableau ci-dessous)
- Semaine 3 : 1 à 2 fertigation à 75 ppm
- Semaine 4 : 1 à 2 fertigation à 100 ppm + ajout d'algue brune + biofongicide préventif homologué à base de *trichoderma sp.* (votre bassinage prévu au début de la phase d'endurcissement)

Composition et concentration de la solution fertilisante recommandée :

	Concentration de la solution fertilisante			
	50 ppm	75 ppm	100 ppm	150 ppm
	g/L (ou mL/L)			
Émulsion de poisson (2-3-0 ou 2-4-0,5)	0,22	0,30	0,44	0,60
Sulfate de potassium (0-0-50)	0,12	0,18	0,24	0,36
Protéine de poisson (Ez-Gro océan 15-1-1)	0,25	0,38	0,50	0,76
Sulfate de magnésium (10% mg)	0,10	0,15	0,20	0,30

Le produit [Ez-Gro océan 15-1-1](#) est le meilleur fertigant azoté que nous avons trouvé au CETAB+ en 2026 pour l'agriculture bio. (prix par unité d'azote apporté). Disponible notamment chez Eco+, plant products et potentiellement autres fournisseurs. En attendant la livraison du produit, vous pouvez à court terme doubler la dose d'émulsion de poisson prévue dans la recette de solution fertilisante.

Eau d'irrigation : idéalement obtenir l'analyse d'eau d'aqueduc utilisé pour l'irrigation pour un meilleur ajustement de la salinité et des éléments fertilisants de la solution.


Ajustement des fertigations selon la salinité de l'eau de drainage (test PourThru). À faire idéalement 1 fois par semaine, surtout lors d'essai d'une nouvelle séquence de fertigation.

Étapes du test PourThru (en bref) :

- 1^{er} arrosage avec eau d'irrigation habituelle et laisser reposer pour sortir l'eau de drainage.
- 2^e arrosage avec eau distillée sur cellules au centre d'un plateau pour recueillir 50 ml. Si plus de 60ml, recommencer (trop dilué).
- Mesure de la salinité avec un conductivimètre bien calibré.

Valeurs de références à suivre (test PourThru) :

- Épinard : 0,7 à 0,9 mS/cm (cotylédon) jusqu'à 1,4 à 1,8 mS/cm (avant transplantation)
- Laitue : 0,4 à 0,6 mS/cm (cotylédon) jusqu'à 1,0 à 1,2 mS/cm (avant transplantation)



Xavier Villeneuve-Desjardins, agr.
514-616-9575