

関数  $y = e^x$  で表される曲線  $C_1$  上を動く点  $P(t, e^t)$  に対し、点  $P$  で曲線  $C_1$  の上側で接する半径 1 の円  $C$  を考え、その中心を点  $O'$  とする。線分  $PQ$  が円  $C$  の直径になるような点  $Q$  とする。以下の問いに答えよ。

(1) 点  $O'$  の座標を  $t$  を用いて表せ。

(2) 点  $P$  を  $0 \leq t \leq \frac{\log 3}{2}$  の範囲で動かしたとき、点  $O'$  が通る軌跡の曲線の長さを求めよ。

(3)  $t$  が実数全体を動くときの点  $Q$  が描く曲線を曲線  $C_2$  とする。また、 $t = 0$  での点  $Q$  の  $x$  座標の値を  $a$ 、 $t = \frac{\log 3}{2}$  での点  $Q$  の  $x$  座標の値を  $b$  とするとき、曲線  $C_1$  と  $x$  軸、 $x = a$ 、 $x = b$  で囲まれた部分の面積を求めよ。

(4) 点  $P$  を  $0 \leq t \leq \frac{\log 3}{2}$  の範囲で動かしたとき、円  $C$  が通過する領域の面積を求めよ。

(1)  $y = e^x$  のとき,  $y' = e^x$  より, 点 P における法線の傾きは  $-\frac{1}{e^t}$ .  
 これは直線 PO' の傾きでもあるので,  $PO' = 1$  と, 円  $C$  は  $C_1$  の上側で接することより,  
 $\overrightarrow{PO'} = \left( -\frac{e^t}{\sqrt{e^{2t}+1}}, \frac{1}{\sqrt{e^{2t}+1}} \right)$ .  
 P( $t, e^t$ ) より, 答  $O' \left( t - \frac{e^t}{\sqrt{e^{2t}+1}}, e^t + \frac{1}{\sqrt{e^{2t}+1}} \right)$

(2)

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{e^t}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}} \quad \frac{dy}{dt} = e^t - \frac{e^{2t}}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}}$$

求める曲線の長さを  $\ell$  として,

$$\begin{aligned} \ell &= \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \left(1 - \frac{e^t}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}}\right) \sqrt{1+e^{2t}} dt \\ &= \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \left(\sqrt{1+e^{2t}} - \frac{e^t}{e^{2t}+1}\right) dt \end{aligned}$$

$e^t = \tan \theta$  と置換すると,  $0 \leq t \leq \frac{\log 3}{2}$  より,  $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$

$$\begin{aligned} e^t &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \frac{d\theta}{dt} \\ \Leftrightarrow dt &= \frac{d\theta}{e^t \cos^2 \theta} = \frac{d\theta}{\tan \theta \cos^2 \theta} = \frac{d\theta}{\sin \theta \cos \theta} \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \sqrt{1+e^{2t}} dt &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin \theta \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left( \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\sin \theta} \right) d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} -\frac{(\cos \theta)'}{\cos^2 \theta} d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{\sin \theta} \\ &= \left[ \frac{1}{\cos \theta} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{\sin \theta} \\ &= 2 - \sqrt{2} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{\sin \theta} \\ \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin \theta} d\theta &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta}{1 - \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left( \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[ \log \left( \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} \right) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= -\frac{1}{2} \log (9 - 6\sqrt{2}) \\ &= -\log (\sqrt{6} - \sqrt{3}) \\ \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \frac{e^t}{e^{2t}+1} dt &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta = [\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

以上より,  $\ell =$  答  $2 - \sqrt{2} - \log (\sqrt{6} - \sqrt{3}) - \frac{\pi}{12}$

(3) (1) の結果より,

$$Q\left(t - \frac{2e^t}{\sqrt{e^{2t}+1}}, e^t + \frac{2}{\sqrt{e^{2t}+1}}\right). \quad f(t) = t - \frac{2e^t}{\sqrt{e^{2t}+1}}$$

とおくと,

$$a = f(0) = -\sqrt{2} \quad b = f\left(\frac{\log 3}{2}\right) = \frac{\log 3}{2} - \sqrt{3}$$

また,

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2 \frac{e^t \sqrt{e^{2t}+1} - e^t \frac{e^{2t}}{\sqrt{e^{2t}+1}}}{e^{2t}+1} = 1 - \frac{2e^t}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}}$$

よって,

$$\begin{aligned} \int_b^a y dx &= \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \left(e^t + \frac{2}{\sqrt{e^{2t}+1}}\right) \left(1 - \frac{2e^t}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \left\{e^t + \frac{2}{\sqrt{e^{2t}+1}} - \frac{2e^{2t}}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}} - \frac{4e^t}{(e^{2t}+1)^2}\right\} dt \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\log 3}{2}} e^t dt &= \left[e^t\right]_0^{\frac{\log 3}{2}} = \sqrt{3} - 1 \\ \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \frac{2e^{2t}}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}} dt &= \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \frac{(e^{2t}+1)'}{(e^{2t}+1)^{\frac{3}{2}}} dt \\ &= \left[-\frac{2}{\sqrt{e^{2t}+1}}\right]_0^{\frac{\log 3}{2}} = \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$


(2) と同様に置換すると,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \frac{2}{\sqrt{e^{2t}+1}} dt &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2}{\sin \theta} d\theta \\ &= 2 \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) \\ \int_0^{\frac{\log 3}{2}} \frac{4e^t}{(e^{2t}+1)^2} dt &= 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 \theta d\theta \\ &= 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[2\theta + \sin 2\theta\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \end{aligned}$$

以上より, 求める面積を  $S$  として,

$$\begin{aligned} S &= (\sqrt{3} - 1) + 2 \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) - (\sqrt{2} - 1) - \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right) \\ &= \underline{\underline{\text{答} \quad 1 - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) - \frac{\pi}{6}}} \end{aligned}$$

(4) 求める領域は以下の通り.



点 P における法線の傾きは  $-\frac{1}{e^t}$  なので,

$t = 0$  のとき, 傾きは  $-1$  で,  $t = \frac{\log 3}{2}$  のとき, 傾きは  $-\frac{1}{\sqrt{3}}$  である.

以上より, 求める面積を  $S'$  として,

$$\begin{aligned} S' &= 1 - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) - \frac{\pi}{6} - \frac{1}{2} (1 + 1 + \\ &\quad - \int_0^{\frac{\log 3}{2}} e^x dx + \pi \\ &= \underline{\underline{\text{答} \quad 4 - 2\sqrt{2} - 2 \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) + \frac{5}{6}\pi}} \end{aligned}$$

**別解**

(2) の結果より,

$$\begin{aligned} S' &= 2 \left(2 - \sqrt{2} - \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) - \frac{\pi}{12}\right) + \pi \\ &= \underline{\underline{\text{答} \quad 4 - 2\sqrt{2} - 2 \log(\sqrt{6} - \sqrt{3}) + \frac{5}{6}\pi}} \end{aligned}$$