

確率と統計(○)

「確率変数と確率分布(第5章)」

- 担当教員: 杉山 将(計算工学専攻)
- 居室: W8E-406
- 電子メール: sugi@cs.titech.ac.jp
- 授業のウェブサイト:
<http://sugiyama-www.cs.titech.ac.jp/~sugi/>

講義計画(シラバス)

20

- 確率と統計の基礎
- 確率変数, 確率分布
- 積率, 積率母関数
- 離散型の確率分布の例
- 連続型の確率分布の例
- 確率不等式, 擬似乱数
- 多次元の確率分布
- 大数の法則, 中心極限定理
- 統計的推定, 仮説検定

- 確率(probability): 事象の起こりやすさを定量的に示すもの
- 事象Aの起こる確率を次式で表す

$$P(A)$$

- 高校で習う確率は、例えばさいころの出た目を数え上げるなど、計算するものであった.
- 大学以降で習う確率は、数学的に定義するもの.

確率の公理

22

■ コルモゴロフ(Kolmogorov) の公理

1. 任意の事象 A_i に対して

$$0 \leq P(A_i) \leq 1$$

2. 全確率は1:

$$P(\Omega) = 1$$

Ω は全事象

3. 互いに排反な事象 $\{A_i\}$ に対して

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i)$$

■ 以後, 全ての確率計算は上記の3つの公理のみに基づいて行なわれる.

確率変数と確率分布

23

- 確率変数(random variable): とる値に対して確率が与えられている変数
- 実現値: 確率変数が実際にとる値
- 確率分布(probability distribution): 確率変数の実現値と確率との関係を関数として表現したもの
- 確率変数は大文字で, 実現値は小文字で表わすことが多い

離散型の確率変数と確率関数

24

- 離散型(discrete type)確率変数: 可算集合の中の値をとる確率変数
- 離散型の確率変数の確率分布: 確率変数がそれぞれの値をとる確率

$$P(X = x) = f(x)$$


$f(x)$: 確率関数(probability function)

$$f(x) \geq 0, \quad \sum_x f(x) = 1$$


- 確率関数は, 確率質量関数(probability mass function)とも呼ばれる

離散型の確率分布の例

25



さいころの出る目



二つのさいころの
出る目の和

主な離散型の確率分布


26

- 一様分布
- 二項分布
- 超幾何分布
- ポアソン分布
- 負の二項分布
- 幾何分布

連続型の確率変数と確率密度関数²⁷

- 連続型(continuous type)確率変数: 連続値をとる確率変数
- 連続型の確率変数の確率分布: 確率変数が a 以上 b 以下の値をとる確率

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$



$f(x)$: 確率密度関数(probability density function)

$$f(x) \geq 0, \int f(x)dx = 1$$

- 注意: 連続型の確率変数がある値 a をとる確率はゼロ!

$$P(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$

累積分布関数

28

- 連続型の確率変数が x 以下の値をとる確率

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

$F(x)$: 累積分布関数(cumulative distribution function)

$$F'(x) = f(x)$$

- 広義単調増加:

$$x_1 < x_2 \implies F(x_1) \leq F(x_2)$$


- 範囲: $x \rightarrow -\infty \implies F(x) \rightarrow 0$

$$x \rightarrow \infty \implies F(x) \rightarrow 1$$

- 右連続:


$$\epsilon \rightarrow +0 \implies F(x + \epsilon) \rightarrow F(x) \text{ for any } x$$

確率密度関数と累積分布関数の例²⁹



x

確率密度関数



x

累積分布関数

主な連続型の確率分布

30

- 一様分布
- 正規分布
- 指数分布
- カイ二乗分布
- ガンマ分布
- ベータ分布
- コーシー分布
- t分布

確率変数の性質を表わす指標

31

- 期待値(expectation): 確率変数の値の平均
(正確には確率による重み付きの平均)

- 確率変数 X の期待値を $E(X)$ で表す

- 離散型:
$$E(X) = \sum x f(x)$$

- 連続型:
$$E(X) = \int x f(x) dx$$


期待値作用素の表記について 32

- $E(\cdot)$ は確率変数 X に関する期待値を表す. 即ち

$$E(\cdot) = \int \cdot f(x) dx$$

- 正確には, $E(\cdot)$ を $E_X(\cdot)$ と表記すべきであるが, 簡単のため省略している.
- 以後, 説明を簡単にするため, 連続型の確率変数を主に扱うことにする. 離散型を考える場合は, 積分を和に変更すればよい.

- 二つのさいころの目の和の期待値を求めよ



$$E(X) = \sum_{x=2}^{12} x f(x) = 7$$

二つのさいころの
出る目の和

期待値演算の性質

34

- 定数は期待値をとっても値は変わらない:


$$E(c) = c$$

- 定数を足した期待値は, 期待値に定数を足したものと等しい:

$$E(X + c) = E(X) + c$$

- 定数倍の期待値は, 期待値の定数倍と等しい:

$$E(cX) = cE(X)$$



期待値演算は線形


- **演習**: 上記の性質を証明せよ

期待値の問題点


35

- 期待値は、**外れ値 (outlier)** があるときに直感と合わない値になることがある.

$$E(X) = \int x f(x) dx$$



- **例**: 収入分布. 一人大金持ち (外れ値) がいると, その人以外全員が期待値以下になってしまう.




その他のよく用いる指標

36



■ 中央値(median):

$$P(X \leq x) = \frac{1}{2} \text{ となる } x$$



■ 最頻値(mode):

$f(x)$ を最大にする x



- 確率変数と確率分布
- 離散型の確率変数
 - 確率関数
- 連続型の確率変数
 - 確率密度関数
 - 累積分布関数
- 確率変数の性質を表わす指標
 - 期待値
 - 中央値
 - 最頻値

宿題

38

$$-\infty < a < b < \infty$$

1. $[a, b]$ 上に定義された確率密度関数 $f(x)$ を考える.

A) 次の二乗誤差 $J_1(y)$ を最小にする y を y_1 で表す:

$$y_1 = \operatorname{argmin}_y J_1(y)$$

$$J_1(y) = \int_a^b (x - y)^2 f(x) dx$$

このとき, y_1 は X の期待値 (つまり, $y_1 = E[X]$) であることを示せ.

B) 次の絶対誤差 $J_2(y)$ を最小にする y を y_2 で表す:

$$y_2 = \operatorname{argmin}_y J_2(y)$$

$$J_2(y) = \int_a^b |x - y| f(x) dx$$

このとき, y_2 は X の中央値 (つまり, $F(y_2) = 1/2$) であることを示せ.

$$\operatorname{argmin}_y J(y) : J(y) \text{ を最小にする } y$$