REG-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

להרחיב את אפשרויות התגובה

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לזהות יותר מאפשרות תגובה אחת ולבחור כלי לפי המצב, הצורך והבטיחות. להעריך תועלת לפי מה שהתגובה מאפשרת, בלי לקבוע שהיעלמות הרגש היא תנאי להצלחה.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

אין להנחות להישאר במצב מסוכן כדי להירגע, לכפות נשימה, מגע או יציאה מהחדר, או להפוך הפסקה לעונש. פגיעה מיידית מחייבת מענה בטיחותי נפרד ולא מילוי דף.

שימוש חוזר בחומר הקיים

REG-01 מזהה תגובה ראשונית ו־REG-02 מברר צורך והקשר. כאן משווים חלופות ותוצאה צפויה; אפשר להשתמש במפת אירוע קיימת ולא לחזור עליה.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: גיא מתקשה להמשיך שיחה בזמן עומס. הוא בוחר לבקש הפסקה מתואמת ולכתוב מה חשוב לו לומר; מטרתו לחזור לבחירה, לא למחוק את הכעס.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

REG-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

באיזה מצב אני נוטה להגיב בדרך אחת בלבד?

2 | שאלה לשיחה

מה המטרה ומהם גבולות הבטיחות שלי?

3 | שאלה לשיחה

אילו חלופות יש לי, כולל בקשת עזרה או הפסקה?

4 | שאלה לשיחה

איזו חלופה מתאימה כעת ומה מחיריה האפשריים?

5 | שאלה לשיחה

איך אעריך אם היא סייעה לצורך או למטרה?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

אם כלי לא עוזר, בררו התאמה ותנאים במקום לדרוש יותר מאמץ. אם הפסקה אינה בטוחה או אפשרית, חפשו תמיכה אחרת; אין כלל אחד לכל מצב.

Mindful Path

REG-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

הציעו שתי אפשרויות מוחשיות, למשל לומר שצריך עזרה או לעבור עם מבוגר למקום נוח. אין לשלוח ילד לבדו להירגע כתנאי לקבלת סיוע.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

סכמו אפשרות להפסקה במסגרת והדרך לחזור לשיחה אם מתאים. אין לדרוש שליטה מלאה ברגש כדי להקשיב לתוכן.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

הבחינו בין פעולה אישית לבין מגבלות בעבודה או ביחסים. אפשר שהכלי המתאים הוא תיאום תמיכה ולא הרגעה עצמית.

OA | מבוגרים יותר

אין להניח התאמה לתרגיל תנועתי או נשימתי. שאלו מה נוח ונגיש לאדם, ואפשרו בחירה בשיחה או במנוחה.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

REG-03 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

בחרו הזדמנות בטוחה ומתאימה עם האדם, או תרגלו רק בשיחה בדויה בפגישה. אין צורך לעורר כעס או ליצור קונפליקט לשם מילוי הדף. אפשר לדלג, לעצור או להיעזר. פגיעה ואיום דורשים מענה מתאים לפני תרגול תקשורת.

במפגש הבא

בדקו מה השתנה בבחירה, בתקשורת או בהגנה על צורך. אפשר להרגיש רגש חזק ובכל זאת לבחור תגובה מועילה; אין לדרג הצלחה רק לפי רגיעה.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/anger/

Mindful Path