

A
$\times 10^{-2}$
$t_0 = 0\%$
$\tau_s = 0.91 \times N/2(p-1)$
$\log \rho(t_0, t_0 + t)$
$p = 2,\ N = 2000$
$p = 2,\ N = 1000$
$p = 3,\ N = 500$
$p = 4,\ N = 300$
Mean slope = 0.91
$t \times 2(p-1)/N$
$\times 10^{-1}$
B
$\times 10^{-2}$
$t_0 = 75\%$
$\tau_s = 1.02 \times N/2p$
$p = 2,\ N = 2000$
$p = 2,\ N = 1000$
$p = 3,\ N = 500$
$p = 4,\ N = 300$
Mean slope = 1.02
$t \times 2p/N$
$\times 10^{-1}$
C
$\times 10^{-1}$
$t_0 = 0\%$
$\tau_s = 0.73 \times N/K$
$\log \rho(t_0, t_0 + t)$
$K = 4,\ N = 2000$
$K = 8,\ N = 2000$
$K = 16,\ N = 1000$
$K = 32,\ N = 1000$
$K = 64,\ N = 500$
Mean slope = 0.73
$t \times K/N$
$\times 10^{-1}$
D
$\times 10^{-1}$
$t_0 = 75\%$
$\tau_s = 1.08 \times N/K$
$K = 4,\ N = 2000$
$K = 8,\ N = 2000$
$K = 16,\ N = 1000$
$K = 32,\ N = 1000$
$K = 64,\ N = 500$
Mean slope = 1.08
$t \times K/N$
$\times 10^{-1}$