Elravie Re2O

엘라비에 리투오 시술 가이드

Elravie Re2O Treatment Guide

믹싱 가이드 영상

리투오 단독

HA 혼합

믹싱 가이드

혼합	프로토콜	토탈 용량	적용 부위
Basic	Re2O 150mg + N/S **5cc**	5cc	Full Face
+ HA (Non-cross linked)	Re2O 150mg + N/S **3cc** + HA 2cc	5cc	Full Face
+ Lidocaine (2%)	Re2O 150mg + N/S **2.5cc** + HA **2cc** + Lidocaine 0.5cc	5cc	Full Face



01

별도 빈 주사기에 **N/S 5cc(또는 3cc)**를 충진하고, 리투오 주사기를 가볍게 탭핑하여 뭉친 입자를 풀어주면서 **내부 공기를 제거**합니다.



02

동봉된 커넥터로 두 주사기를 결착시켜 N/S를 리투오 쪽으로 밀어 옮겨줍니다.



03

리투오와 N/S가 잘 수화 되도록 **약 2분** 정도 **천천히** 흔든 후, 커넥터를 분리하여 **잔여 공기를 제거**합니다.



04

(HA 혼합 시술 시, **HA 2cc**를 연결하여 리투오 쪽으로 옮겨주고) 커넥터를 재결착하여 밀대를 번갈아 가며 왕복 **30회 이상을 빠르게** 믹싱합니다.



05

리투오 주사기로 내용물을 모두 옮긴 후, 커넥터를 제거하고 니들을 체결합니다.

✓ 믹싱 후 4시간 이내 사용 원칙으로 시간이 지나면 침전될 우려가 있어, **시술 직전 상태를 확인한 후** 다시 한 번 충분히 흔든 후 사용해주세요.

✓ 희석을 적게 하거나 충분한 믹싱이 되지 않았을 경우, 주입 시 파우더가 뭉치거나 니들이 막힐 수 있습니다. 반드시 **가이드에 따라 충분한 믹싱**을 진행해주세요.

시술 가이드

시술 부위		주입 방법	타겟 레이어	세부 사항
Face		**Needle** 30~33G / 4mm	Deep Dermis (45~60°)	2mm 이상 깊이 (<2mm: 통증 유발) 0.03~0.05ml/point
		Cannula 23/25G / 5cm	Immediate Subdermis	0.1ml/stroke
		Injector (더마샤인 프로)	최소 1.2mm 이상	Syr. Type: 5ml/5ml One dose: 0.0417ml Flow rate: Normal Total 120shots
		Injector (미라젯)	Deep Dermis	USP mode Spot size: 4mm Repetition: 30 Fluence: 0.8 Energy: 100
Under-eye / Nasolabial / Marionette		**Cannula** 23/25G / 5cm	Immediate Subdermis / Supraperiosteum ~ Subdermis	눈밑: 0.5~0.8ml/side 팔자: 1~1.5ml/side
Neck		**Needle** 30~32G / 4mm	Deep Dermis ~ Subcutaneous	0.025ml/point 좌측: 2ml / 중앙: 1ml / 우측: 2ml
		Cannula 25~26G / 5cm	Immediate Subdermis	5ml/side

- 눈가 또는 피부가 얇고 근육 움직임이 많은 부위는 **캐뉼라로 시술하는 것을 권장**합니다.
- 주입 층이 너무 얕지 않도록, 어느 한 포인트에 적정량을 초과하여 주입되지 않도록 유의해주세요.
- 최대한 **하부 진피에 가깝게 주입**하는 것이 좋습니다. (리쥬란보다 깊게)
- 주입 후에는 고르게 퍼질 수 있게 **엠보가 사라질 정도로 마사지**를 진행해주세요.
- 과거 스킨부스터 시술을 과하게 받은 환자의 경우, 조직이 단단해져 있을 확률이 높아 주입 시 특별한 주의가 필요합니다.

시술 후 관리

- 시술 직후 5분 이내 **LDM(초음파 마사지) 또는 지압**으로 부드럽게 마사지를 하면 **부기를 예방하고 분포가 고르게** 되도록 도와줍니다.
- 시술 후 충분한 **보습 관리**가 이루어지도록 환자에게 안내해주세요.
- 시술 후 **일시적 부종이나 홍반** 등이 발생할 수 있으며, 2일 이상 지속될 경우 내원 안내와 증상에 따라 처치해 주세요.
- 부종이나 홍반이 지속될 시 경구제(항히스타민제, 스테로이드)를 처방하면 1~2일 이내 증상이 완화됩니다.
- 리투오는 알레르기 반응을 일으키지 않습니다.
  다만, 체질에 따라 면역반응 기저질환이 있는 사람의 경우 주입 부위의 홍반이나 부종이 오랫동안 지속될 수 있습니다.
  시술 전 **환자와의 충분한 상담을 통해 과거 병력과 시술 이력을 확인**해주세요.

Elravie Re2O elraviere2o.com | Life and Creativity L&C BIO T 02-541-8557 F 02-541-8578