



MA202 - MATEMATIKA 2

Rekapitulacija gradiva

Lekcija 15

PRIRUČNIK ZA STUDENTE

MA202 - MATEMATIKA 2

Lekcija 15

REKAPITULACIJA GRADIVA

- ✓ Rekapitulacija gradiva
- ✓ Poglavlje 1: Obnavljanje: neodređeni i određeni integral
- ✓ Poglavlje 2: Obnavljanje: funkcija dve promenljive
- ✓ Poglavlje 3: Obnavljanje: diferencijalne jednačine
- ✓ Poglavlje 4: Obnavljanje: brojni, funkcionalni i Furijeovi redovi
- ✓ Poglavlje 5: Obnavljanje: višestruki integrali
- ✓ Poglavlje 6: Obnavljanje: krivolinijski integrali
- ✓ Poglavlje 7: Obnavljanje: površinski integrali
- ✓ Zaključak za lekciju 15

Copyright © 2017 – UNIVERZITET METROPOLITAN, Beograd. Sva prava zadržana. Bez prethodne pismene dozvole od strane Univerziteta METROPOLITAN zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta., kopiranjem, snimanjem, elektronskim putem, skeniranjem ili na bilo koji drugi način.

Copyright © 2017 BELGRADE METROPOLITAN UNIVERSITY. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of Belgrade Metropolitan University.

▼ Uvod

UVOD

Rekapitulacija gradiva.

U ovoj lekciji ćemo rekapitulirati celokupno gradivo koje pokriva ovaj kurs iz Matematike 2. Cilj ove lekcije je da se student pripremi za polaganje ispita.

▼ Poglavlje 1

Obnavljanje: neodređeni i određeni integral

ZADATAK 1

Metod parcijalne integracije.

Primer. *Primenom parcijalne integracije izračunati sledeće integrale*

a) $\int \arcsin x \, dx;$

b) $\int x \operatorname{arctg} x \, dx;$

Rešenje.

a) Ako je $u = \arcsin x$, $dv = dx$, tada je $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$, $v = x$, pa je

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x - \int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

U poslednjem integralu smo koristili smenu $t = 1 - x^2$, tj. $dt = -2x \, dx$.

b) Ako je $u = \operatorname{arctg} x$, $dv = x \, dx$, tada je $du = \frac{1}{1+x^2} dx$, $v = x^2/2$, pa je

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{arctg} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1 - 1}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 2

Integracija racionalnih funkcija.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \frac{(x^3 - x^2 + x + 1) dx}{x^2 - 9}; \quad c) \int \frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx.$$

$$b) \int \frac{(x^2 - 3x + 4) dx}{x^3 - 2x^2 + x};$$

Rešenje:

a) Na osnovu

$$\frac{x^3 - x^2 + x + 1}{x^2 - 9} = x - 1 + \frac{10x - 8}{x^2 - 9} = x - 1 + \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 3},$$

dobija se sistem jednačina

$$A + B = 10, \quad 3A - 3B = -8,$$

čije rešenje je $A = 11/3$, $B = 19/3$, pa je

$$\frac{x^3 - x^2 + x + 1}{x^2 - 9} = x - 1 + \frac{11}{3(x - 3)} + \frac{19}{3(x + 3)}.$$

Prema tome je

$$\begin{aligned} \int \frac{(x^3 - x^2 + x + 1) dx}{x^2 - 9} &= \int (x - 1) dx + \int \frac{11 dx}{3(x - 3)} + \int \frac{19 dx}{3(x + 3)} \\ &= \frac{x^2}{2} - x + \frac{11}{3} \ln |x - 3| + \frac{19}{3} \ln |x + 3| + C. \end{aligned}$$

b) U ovom slučaju za podintegralnu funkciju važi

$$\frac{x^2 - 3x + 4}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{x^2 - 3x + 4}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)} + \frac{D}{(x-1)^2},$$

odakle se dobija sistem jednačina

$$A + B = 1, \quad -2A - B + D = -3, \quad A = 4,$$

čije rešenje je $A = 4$, $B = -3$, $D = 2$.

$$\int \frac{(x^2 - 3x + 4) dx}{x^3 - 2x^2 + x} = 4 \int \frac{dx}{x} - 3 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{dx}{(x-1)^2}$$

c) Iz jednakosti

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} &= \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{D}{2x - 1} \\ &= \frac{(Ax + B)(2x - 1) + D(x^2 + 4)}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} \\ &= \frac{(2A + D)x^2 + (-A + 2B)x - B + 4D}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} \end{aligned}$$

dobija se sistem jednačina

$$2A + D = 1, \quad -A + 2B = -1, \quad -B + 4D = -21,$$

odakle je $A = 3$, $B = 1$ i $D = -5$. Prema tome važi

$$\frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} = \frac{3x + 1}{x^2 + 4} + \frac{5}{2x - 1},$$

pa je

$$\begin{aligned} \int \frac{(x^2 - x - 21) dx}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} &= \int \frac{(3x + 1) dx}{x^2 + 4} + \int \frac{5 dx}{2x - 1} \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{2x dx}{x^2 + 4} + \int \frac{dx}{x^2 + 4} + \int \frac{5 dx}{2x - 1} \\ &= \frac{3}{2} \ln(x^2 + 4) + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{5}{2} \ln |2x - 1| + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 3

Integracija trigonometrijskih funkcija.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \sin^4 2x \, dx; \quad b) \int \sin^5 x \, dx; \quad c) \int \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

Rešenje:

a) Polazeći od jednakosti $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$, dobija se

$$\begin{aligned} \int \sin^4 2x \, dx &= \int \left(\frac{1}{2}(1 - \cos 4x) \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 4x + \cos^2 4x) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(x - \frac{1}{2} \sin 4x + \int \frac{1}{2}(1 + \cos 8x) dx \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(x - \frac{1}{2} \sin 4x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} \sin 8x \right) + C \\ &= \frac{3}{8}x - \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{64} \sin 8x + C. \end{aligned}$$

b) Kako je $\int \sin^5 x \, dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x \, dx$. Smenom $t = \cos x$, $dt = -\sin x \, dx$, dobijamo

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x \, dx &= - \int (1 - t^2)^2 dt = - \int (1 - 2t^2 + t^4) dt \\ &= -t + \frac{2t^3}{3} - \frac{t^5}{5} + C = -\cos x + \frac{2 \cos^3 x}{3} - \frac{\cos^5 x}{5} + C. \end{aligned}$$

c) Smenom $t = \cos x$, $dt = -\sin x \, dx$, dobijamo

$$\begin{aligned} \int \cos^4 x \sin^3 x \, dx &= \int \cos^4 x (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx = - \int t^4 (1 - t^2) dt \\ &= - \int (t^4 - t^6) dt = -\frac{t^5}{5} + \frac{t^7}{7} + C = -\frac{\cos^5 x}{5} + \frac{\cos^7 x}{7} + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 4

Integracija trigonometrijskih funkcija - smena $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \frac{dx}{3 - \sin x + \cos x}; \quad b) \int \frac{\sin x \, dx}{4 \sin x - 3 \cos x}.$$

Rešenje:

a)

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C.$$

b)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 - \sin x + \cos x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 - \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{4+2t^2-2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 - t + 2} \\ &= \int \frac{dt}{(t - 1/2)^2 + 7/4} = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{t - 1/2}{\sqrt{7}/2} + C \\ &= 2 \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg}(x/2) - 1}{\sqrt{7}} + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 5

Integracija iracionalnih funkcija.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x+2}-1}; \quad b) \int \frac{\sqrt{x} \, dx}{\sqrt{x}+1}; \quad c) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{2x-5}+1};$$

Rešenje:

a) Smenom $t = \sqrt{x+2}$, tj. $t^2 = x+2$, $2t \, dt = dx$, dobija se

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x+2}-1} &= \int \frac{2t \, dt}{t-1} = 2t + 2 \ln |t-1| + C \\ &= 2\sqrt{x+2} + 2 \ln |\sqrt{x+2}-1| + C. \end{aligned}$$

b) Smenom $t = \sqrt{x}$, tj. $t^2 = x$, $2t \, dt = dx$, dobija se

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x} \, dx}{\sqrt{x}+1} &= \int \frac{2t^2}{t+1} \, dt = 2 \int \frac{(t^2-1)+1}{t+1} \, dt \\ &= 2 \int \frac{(t-1)dt}{t+1} + 2 \int \frac{dt}{t+1} = 2 \int (t-1)dt + 2 \int \frac{dt}{t+1} \\ &= t^2 - 2t + 2 \ln |t+1| + C = x - 2\sqrt{x} + 2 \ln |\sqrt{x}+1| + C. \end{aligned}$$

c) Smenom $t = \sqrt[3]{2x-5}$, tj. $t^3 = 2x-5$, $3t^2 \, dt = 2 \, dx$, dobija se

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{2x-5}+1} &= \frac{3}{2} \int \frac{t^2 \, dt}{t+1} = \frac{3}{2} \int \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{(\sqrt[3]{2x-5})^2}{2} - \sqrt[3]{2x-5} + \ln |1 + \sqrt[3]{2x-5}| \right) + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 6

Integracija iracionalnih funkcija – Ojlerove smene

Primer. Izračunati:

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 6x + 15}}; \quad b) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 10x - 9}};$$

Rešenje:

$$\begin{aligned} a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 6x + 15}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + 6x + 9) + 6}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+3)^2 + 6}} \\ &= \ln \left| x+3 + \sqrt{(x+3)^2 + 6} \right| + C. \quad \text{Smena } t = x+3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 10x - 9}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(25 - 10x + x^2) - 34}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-5)^2 - 34}} \\ &= \ln \left| x-5 + \sqrt{(x-5)^2 - 34} \right| + C. \end{aligned}$$

Napomena: Ovi integrali se rešavaju Ojlerovom smenom, ali je dozvoljeno na ispitu koristiti odgovarajući integral kao tablični (dat je u tablici integrala).

ZADATAK 7 – 1. DEO

Integracija iracionalnih funkcija – Metod Ostrogradskog.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx; \quad b) \int \sqrt{x^2 + 2} dx;$$

Rešenje:

a)

$$\int \frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = (Ax + B)\sqrt{x^2 + x + 1} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

Diferenciranjem prethodnog izraza dobija se

$$\frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = A\sqrt{x^2 + x + 1} + (Ax + B)\frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

Množenjem leve i desne strane sa $2\sqrt{x^2 + x + 1}$ dobija se

$$4x^2 + 2x + 6 = 2A(x^2 + x + 1) + (Ax + B)(2x + 1) + 2\lambda,$$

odakle se izjednačavanjem koeficijenata dobija sistem jednačina

$$4 = 4A, \quad 2 = 3A + 2B, \quad 6 = 2A + B + 2\lambda,$$

čije je rešenje $A = 1$, $B = -1/2$ i $\lambda = 9/4$. Dakle,

$$\int \frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = \left(x - \frac{1}{2}\right)\sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{9}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

Poslednji integral se napiše kao

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}},$$

što posle smene $t = x + 1/2$, $dt = dx$, postaje

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}} &= \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right| + C \\ &= \ln \left| (2x + 1) + \sqrt{x^2 + x + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

Na kraju je

$$\int \frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = \left(x - \frac{1}{2}\right)\sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{9}{4} \ln |(2x + 1) + \sqrt{x^2 + x + 1}| + C.$$

b)

$$\int \sqrt{x^2 + 2} dx = \int \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx = (Ax + B)\sqrt{x^2 + 2} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2}}.$$

Diferenciranjem poslednje jednakosti dobija se

$$\frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} = A\sqrt{x^2 + 2} + (Ax + B)\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2}} + \lambda \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}.$$

Množenjem leve i desne strane sa $\sqrt{x^2 + 2}$ sledi

$$x^2 + 2 = A(x^2 + 2) + (Ax + B)x + \lambda,$$

odakle se izjednačavanjem koeficijenata dobija sistem jednačina

$$2A = 1, \quad B = 0, \quad 2A + \lambda = 2,$$

čije rešenje je $A = 1/2$, $B = 0$ i $\lambda = 1$. Dakle,

$$\int \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 2} + \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx.$$

Poslednji integral je tablični, pa je

$$\int \sqrt{x^2 + 2} dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 2} + \ln \left| x + \sqrt{x^2 + 2} \right| + C.$$

ZADATAK 7 – 2. DEO

Integracija iracionalnih funkcija – Metod Ostrogradskog

c) Smenom $t = x^2$, $dt = 2x dx$, dobija se

$$\int \frac{x^3 + 3x}{\sqrt{5 - x^4 - 2x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{t + 3}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}} dt.$$

Sada je

$$\int \frac{t + 3}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}} dt = \left(A\sqrt{5 - t^2 - 2t} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}} \right).$$

Nakon diferenciranja poslednje jednakosti po t dobija se

$$\frac{t + 3}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}} = A \frac{-2t - 2}{2\sqrt{5 - t^2 - 2t}} + \lambda \frac{1}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}}.$$

Posle sređivanja sledi $t + 3 = -A(t + 1) + \lambda$, odakle je $A = -1$, $\lambda = 2$. Dakle,

$$\int \frac{t + 3}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}} dt = -\sqrt{5 - t^2 - 2t} + 2 \int \frac{dt}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}}.$$

Poslednji integral se rešava tako što se imenilac napiše kao $\sqrt{5 - t^2 - 2t} = \sqrt{6 - (t + 1)^2}$, pa je

$$\int \frac{t + 3}{\sqrt{5 - t^2 - 2t}} dt = -\sqrt{5 - t^2 - 2t} + 2 \arcsin \frac{t + 1}{\sqrt{6}}.$$

Konačno je

$$\int \frac{x^3 + 3x}{\sqrt{5 - x^4 - 2x^2}} dx = -\sqrt{5 - x^4 - 2x^2} + 2 \arcsin \frac{x^2 + 1}{\sqrt{6}} + C.$$

d) Smenom $t = e^x$, $dt = e^x dx$, dobija se

$$\int \frac{e^{3x} - e^{2x} + e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}} dx = \int \frac{e^{2x} - e^x + 1}{\sqrt{1 - e^{2x}}} e^x dx = \int \frac{t^2 - t + 1}{\sqrt{1 - t^2}} dt.$$

Dakle možemo pisati

$$\int \frac{t^2 - t + 1}{\sqrt{1 - t^2}} dt = (At + B)\sqrt{1 - t^2} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}}.$$

Posle diferenciranja poslednje jednakosti dobija se

$$\frac{t^2 - t + 1}{\sqrt{1 - t^2}} = A\sqrt{1 - t^2} + (At + B) \frac{-2t}{2\sqrt{1 - t^2}} + \lambda \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}.$$

Sređivanjem se dobija $A = -1/2$, $B = 1$ i $\lambda = 3/2$, pa je

$$\int \frac{e^{3x} - e^{2x} + e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}} dx = \left(-\frac{1}{2}e^x + 1 \right) \sqrt{1 - e^{2x}} + \frac{3}{2} \arcsin x + C.$$

ZADATAK 8

Integracija iracionalnih funkcija – Ojlerove smene.

Primer. *Izračunati*

$$I = \int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{1+x-x^2}}$$

REŠENJE: Uvodimo Ojlerovu smenu:

$$\sqrt{1+x-x^2} = tx - 1$$

$$1+x-x^2 = t^2x^2 - 2tx + 1, \quad x(1-x) = x(t^2x - 2t), \quad 1-x = t^2x - 2t$$

$$x = \frac{1+2t}{t^2+1}, \quad dx = -2 \cdot \frac{t^2+t-1}{(t^2+1)^2} dt$$

$$\sqrt{1+x-x^2} = tx - 1 = t \cdot \frac{1+2t}{t^2+1} = \frac{t^2+t-1}{t^2+1}$$

$$1+x = \frac{t^2+2t+2}{t^2+1}$$

$$I = -2 \int \frac{t^2+1}{t^2+2t+2} \cdot \frac{t^2+1}{t^2+t-1} \cdot \frac{t^2+t-1}{(t^2+1)^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1+(t+1)^2}$$

$$I = -2 \arctan(t+1) + C = -2 \arctan \frac{1+x+\sqrt{1+x-x^2}}{x} + C$$

ZADATAK 9

Integracija iracionalnih funkcija – Binomni diferencijal.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \frac{\sqrt{x} dx}{(1 + \sqrt{x})^2}; \quad b) \int \frac{x dx}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}; \quad c) \int \frac{dx}{x^6 \sqrt{x^2 - 1}}.$$

Rešenje:

- a) U ovom slučaju je $p = -2$, tj. p je ceo broj, pa se integral rešava smenom $t^2 = x$, $2t dt = dx$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x} dx}{(1 + \sqrt{x})^2} &= 2 \int \frac{t^2 dt}{(1 + t)^2} = 2 \left(t + 1 - 2 \ln |t + 1| - \frac{1}{t + 1} \right) + C \\ &= 2 \left(\sqrt{x} + 1 - 2 \ln |\sqrt{x} + 1| - \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \right) + C. \end{aligned}$$

- b) Sada je $m = 1$, $n = 2/3$ i $p = -1/2$, tj. p je razlomak, ali je broj $\frac{m+1}{n} = \frac{1+1}{2/3} = 3$ ceo. Ako uvedemo smenu $t^2 = 1 + \sqrt[3]{x^2}$, tj. $x = \sqrt{(t^2 - 1)^3}$, ili $x^{1/3} = \sqrt{t^2 - 1}$, tada dobijamo $2t dt = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} dx$, $dx = 3\sqrt{t^2 - 1} t dt$, pa je

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x^2}}} &= 3 \int \frac{(t^2 - 1)^2 t dt}{t} = 3 \int (t^2 - 1)^2 dt \\ &= \frac{3}{5} \left(\sqrt{1 + \sqrt[3]{x^2}} \right)^5 - 2 \left(\sqrt{1 + \sqrt[3]{x^2}} \right)^3 + 3\sqrt{1 + \sqrt[3]{x^2}} + C. \end{aligned}$$

- c) U ovom slučaju je $m = -6$, $n = 2$, $p = -1/2$, pa je $\frac{m+1}{n} + p = \frac{-5}{2} + \frac{-1}{2}$ ceo broj. Prema tome, može se uvesti smena $t^2 = 1 - x^{-2}$, $t dt = \frac{dx}{x^3}$, $x^{-2} = 1 - t^2$, pa je

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^6 \sqrt{x^2 - 1}} &= \int \frac{dx}{x^3 x^4 \sqrt{1 - x^{-2}}} = \int (t^2 - 1)^2 dt = \frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + t + C \\ &= \frac{(\sqrt{1 - x^{-2}})^5}{5} - 2 \frac{(\sqrt{1 - x^{-2}})^3}{3} + \sqrt{1 - x^{-2}} + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 10

Integracija raznih klasa funkcija.

Primer. Izračunati sledeće integrale:

$$a) \int \sqrt{9-x^2} dx; \quad b) \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+16}}; \quad c) \int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x^2} dx;$$

Rešenje:

a) Smenom $x = 3 \sin t$, dobija se $\sqrt{9-x^2} = 3 \cos t$ i $dx = 3 \cos t dt$, pa je

$$\begin{aligned} \int \sqrt{9-x^2} dx &= 9 \int \cos^2 t dt = \frac{9}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{9}{2} t + \frac{9}{4} \sin 2t + C \\ &= \frac{9}{2} t + \frac{9}{2} \sin t \cos t + C = \frac{9}{2} \arcsin(x/3) + \frac{1}{2} x \sqrt{9-x^2} + C. \end{aligned}$$

b) Nakon smene $x = 4 \operatorname{tg} t$, $dx = \frac{4 dt}{\cos^2 t}$ i $\sqrt{16+x^2} = \frac{4}{\cos t}$, dobija se

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+16}} = \int \frac{4 \frac{dt}{\cos^2 t}}{16 \operatorname{tg}^2 t \frac{4}{\cos t}} = \frac{1}{16} \int \frac{\cos t dt}{\sin^2 t}.$$

Dalje se koristi smena $u = \sin t$, $du = \cos t dt$ i sledi

$$\begin{aligned} \frac{1}{16} \int \frac{\cos t dt}{\sin^2 t} &= \frac{1}{16} \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{16 \sin t} + C = -\frac{1}{16 \cos t \operatorname{tg} t} + C \\ &= -\frac{\sqrt{x^2+16}}{16x} + C. \end{aligned}$$

c) Posle smene $x = \frac{5}{\cos t}$, $dx = \frac{5 \sin t dt}{\cos^2 t}$, koristeći relaciju $\sqrt{\frac{1}{\cos^2 t} - 1} = \operatorname{tg} t$, dobijamo

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x^2} dx &= \int \frac{\operatorname{tg} t \cos^2 t \sin t}{\cos^2 t} dt = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} dt \\ &= \int \frac{\sin^2 t \cos t}{\cos^2 t} dt. \end{aligned}$$

Dalje se uvodi smena $u = \sin t$, $du = \cos t dt$, i dobija se

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^2 t \cos t}{\cos^2 t} dt &= \int \frac{u^2}{1-u^2} du = -u + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\ &= -\sin t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin t}{1-\sin t} \right| + C \\ &= -\frac{\sqrt{x^2-25}}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\frac{\sqrt{x^2-25}}{x}}{1-\frac{\sqrt{x^2-25}}{x}} \right| + C \\ &= -\frac{\sqrt{x^2-25}}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+\sqrt{x^2-25}}{x-\sqrt{x^2-25}} \right| + C. \end{aligned}$$

ZADATAK 11

Integracija raznih klasa funkcija

Primer. *Izračunati*

$$a) \quad I = \int \frac{1}{(1+x)^2} \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}} dx \quad b) \quad I = \int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} dx$$

Rešenje:

a) *Smena:*

$$\sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}} = t \quad x = \frac{1-t^3}{1+t^3}, \quad dx = -\frac{6t^2}{(1+t^3)^2}, \quad 1+x = \frac{2}{1+t^3}$$

$$I = \frac{3}{2} \int t^3 dt = \frac{3}{8} t^4 + C = \frac{3}{8} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{4/3} + C$$

b)

$$\text{Smena: } \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = t, \quad \frac{x+1}{x-1} = t^2, \quad x = \frac{1+t^2}{t^2-1}, \quad dx = -\frac{4tdt}{(t^2-1)^2}$$

$$I = \int \frac{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - 1}{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + 1} dx = -4 \int \frac{tdt}{(t-1)(t+1)^3}$$

$$\frac{t}{(t-1)(t+1)^3} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{t-1} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{t+1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(t+1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(t+1)^3}$$

$$I = -\frac{1}{2} \ln |t-1| + \frac{1}{2} \ln |t+1| - \frac{1}{t+1} + \frac{1}{(t+1)^2} + C$$

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{t}{(t+1)^2} + C, \quad t = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

ZADATAK 12

Određena integracija: Metod smene

Primer. Izračunati:

$$a) \quad I = \int_4^5 x \sqrt{x^2 - 4x} \, dx \qquad b) \quad I = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{dx}{\sin x \cos^3 x}$$

Rešenje: $I = \int_4^5 x \sqrt{(x-2)^2 - 4} \, dx \quad x-2 = t, \, dx = dt$

$$\begin{aligned} I &= \int_2^3 (2+t) \sqrt{t^2 - 4} \, dt = 2 \int_2^3 \sqrt{t^2 - 4} \, dt + \int_2^3 t \sqrt{t^2 - 4} \, dt \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{t^2 - 4} - 2 \ln |t + \sqrt{t^2 - 4}| \right) \Big|_2^3 + \frac{1}{3} (t^2 - 4)^{3/2} \Big|_2^3 \\ &= \frac{14}{3} \sqrt{5} - 4 \ln \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Napomena. Oba od ovih integrala rešiti samostalno.

b) Smena: $\cos x = t$

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sin x \, dx}{(1 - \cos^2 x) \cos^3 x} = \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \frac{dt}{(1 - t^2) t^3}$$

$$\frac{1}{(1 - t^2) t^3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - t} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + t} + \frac{1}{t} + \frac{1}{t^3} \quad \text{primenjen je metod neodređenih koeficijenata - uraditi postupno za vežbu.}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \frac{dt}{1 - t} - \frac{1}{2} \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \frac{dt}{1 + t} + \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \frac{dt}{t} + \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \frac{dt}{t^3} \\ &= -\frac{1}{2} \ln(t^2 - 1) + \ln t - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2} \Big|_{1/2}^{\sqrt{2}/2} = \frac{1}{2} \ln 3 + 1 \end{aligned}$$

ZADATAK 13

Određena integracija: Metod parcijalne integracije

Primer. Izračunati sledeće određene integrale:

$$a) \quad I = \int_0^{1/2} x \ln \frac{1+x}{1-x} dx \quad b) \quad I = \int_0^1 \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2} dx$$

$$a) \quad u = \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad dv = x dx \quad du = \frac{2dx}{1-x^2}, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

$$I = \frac{x^2}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \Big|_0^{1/2} - \int_0^{1/2} \frac{x^2 dx}{1-x^2} = \frac{1}{8} \ln 3 - \int_0^{1/2} \frac{x^2 - 1 + 1}{1-x^2} dx$$

$$= \frac{1}{8} \ln 3 + x \Big|_0^{1/2} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{8} \ln 3$$

$$b) \quad u = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \quad dv = \frac{xdx}{(1+x^2)^2}, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}, \quad v = \frac{-1}{2(1+x^2)}$$

$$I = -\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (1+x^2)^{-3/2} dx = -\frac{1}{4} \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{1}{2} J$$

$$3a \quad J: \quad x = \tan t, \quad t \in [0, \pi/4]$$

$$J = \int_0^{\pi/4} (1 + \tan^2 t)^{-3/2} \cos^{-2} t dt = \int_0^{\pi/4} \cos t dt = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{4} \ln(1 + \sqrt{2})$$

ZADATAK 14

Primena određene integracije na određivanje površine ravnog lika

Primer. Odrediti površinu ograničenu sa krivom $y = x^3$ i pravama $y = 6 + x$ i $2y + x = 0$.

REŠENJE:

Presek pravih $y = 6 + x$ i $2y + x = 0$ je tačka $A(-4, 2)$, a presek krive $y = x^3$ sa pravom $2y + x = 0$ je tačka $O(0, 0)$ (koordinatni početak), dok je presek krive $y = x^3$ sa pravom $y = 6 + x$ tačka $B(2, 8)$. Svaka od ovih presečnih tačaka dobija se rešavanjem odgovarajućih sistema jednačina:

$$\text{tačka } A: \quad y = 6 + x, \quad 2y + x = 0;$$

$$\text{tačka } O: \quad y = x^3, \quad 2y + x = 0; \quad \text{tačka } B: \quad y = 6 + x, \quad y = x^3.$$


Tražena površina se dobija kao zbir $P = P_1 + P_2$, gde je

$$\begin{aligned} P_1 &= \int_{-4}^0 \left(6 + x - \left(-\frac{x}{2} \right) \right) dx = \int_{-4}^0 \left(6 + \frac{3x}{2} \right) dx = \left(6x + \frac{3x^2}{4} \right) \Big|_{-4}^0 \\ &= 24 - 12 = 12, \end{aligned}$$

$$P_2 = \int_0^2 (6 + x - x^3) dx = \left(6x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^2$$

$$= 12 + 2 - 4 = 10.$$

Prema tome je $P = P_1 + P_2 = 12 + 10 = 22$.



ZADATAK 15

Primena određene integracije na određivanje dužine luka krive.

Primer. Odrediti dužinu luka krive $f(x) = \ln x$ od tačke $A(1, 0)$ do tačke $B(\sqrt{3}, \frac{\ln 3}{2})$.

REŠENJE:

Kako je $f'(x) = 1/x$, to je $\ell = \int_1^{\sqrt{3}} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx$.

Smenom $x = \tan t$, $dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$, pri čemu je $\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\cos t}$, a nove granice

integracije postaju $\pi/4$ i $\pi/3$. Tako dobijamo

$$\ell = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{dt}{\sin t \cos^2 t} = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin t \cos^2 t} dt$$

$$= \left(\frac{1}{\cos t} + \ln |\tan(t/2)| \right) \Big|_{\pi/4}^{\pi/3} = 2 - \sqrt{2} - \frac{1}{2} \ln 3 - \ln \tan \frac{\pi}{8}.$$

ZADATAK 16


Primena određene integracije na određivanje zapremine rotacionog tela.

Primer. Odrediti zapreminu torusa koji se dobija obrtanjem kružnice $x^2 + (y - a)^2 = r^2$, oko x -ose, ako je $0 < r < a$.

REŠENJE:

Označimo sa f_1 i f_2 redom funkcije date sa $f_1(x) = a + \sqrt{r^2 - x^2}$ i $f_2(x) = a - \sqrt{r^2 - x^2}$, $|x| \leq r$. Tada je tražena zapremina $V = V_1 - V_2$, gde je $V_1 = \pi \int_{-r}^r f_1^2(x) dx$ i $V_2 = \pi \int_{-r}^r f_2^2(x) dx$. Prema tome je

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^r \left((a + \sqrt{r^2 - x^2})^2 - (a - \sqrt{r^2 - x^2})^2 \right) dx \\ &= \pi \int_{-r}^r \left(a^2 + 2a\sqrt{r^2 - x^2} + r^2 - x^2 - a^2 + 2a\sqrt{r^2 - x^2} - r^2 + x^2 \right) dx \\ &= 4a\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} = 8a\pi \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx. \end{aligned}$$



▼ Poglavlje 2

Obnavljanje: funkcija dve promenljive

ZADATAK 1

Određivanje lokalnih ekstrema funkcije dve promenljive.

Odredite lokalne ekstreme funkcije:

- (a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2 - 8y$
- (b) $f(x, y) = x^3 - 3xy - y^3$
- (c) $f(x, y) = xy - x^3 - y^3$
- (d) $f(x, y) = x^2 + y - e^y$
- (e) $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$
- (f) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$
- (g) $f(x, y) = x^4 + 2y^4 - 2x^2 - y^2$

Rešenje:

- (a)

$T_1(2, 6)$	minimum
-------------	---------
- (b)

$T_1(-1, 1)$	maksimum
$T_2(0, 0)$	nema ekstrema
- (c)

$T_1(0, 0)$	nema ekstrema
$T_2(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	maksimum
- (d)

$T_1(0, 0)$	nema ekstrema
-------------	---------------
- (e)

$T_1(4, 4)$	maksimum
-------------	----------
- (f)

$T_1(-2, -1)$	maksimum
$T_2(2, 1)$	minimum
$T_3(-1, -2)$	nema ekstrema
$T_4(1, 2)$	nema ekstrema
- (g)

$T_1(-1, -\frac{1}{2})$	minimum
$T_2(-1, 0)$	nema ekstrema
$T_3(-1, \frac{1}{2})$	minimum
$T_4(0, -\frac{1}{2})$	nema ekstrema
$T_5(0, 0)$	maksimum
$T_6(0, \frac{1}{2})$	nema ekstrema
$T_7(1, -\frac{1}{2})$	minimum
$T_8(1, 0)$	nema ekstrema
$T_9(1, \frac{1}{2})$	minimum

ZADATAK 2

Uslovni ekstremi.

a) Odredi ekstreme funkcije $f(x, y) = x^2 + y^2$ uz uslov $x^2 + 2y^2 = 1$.

Rešenje: Imamo stacionarne tačke $T_1 \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ i $T_2 \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $T_3(-1, 0)$ i $T_4(1, 0)$. U tačkama T_1 i T_2 funkcija ima minimum, a u tačkama T_3 i T_4 maksimum.

b) Odredite ekstreme funkcije $z = x + 2y$ uz uslov $x^2 + y^2 = 5$.

Rešenje. Stacionarne tačke: $P_1 = (1, 2)$ za $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ i $P_2(-1, -2)$ za $\lambda_2 = \frac{1}{2}$

Tačka P_1 je tačka lokalnog maksimuma i važi $z_{\max} = 5$.

Tačka P_2 je tačka lokalnog minimuma i važi $z_{\min} = -5$.

c) Odredite lokalne ekstreme funkcije $z = x^2 + y^2$ uz uslov $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$.

Rešenje. Tačka $(18/13, 12/13)$ za $\lambda = -\frac{72}{13}$ je lokalni minimum $z_{\min} = 36/13$.

d) Odredite ekstreme funkcije $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ uz uslov $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$.

Rešenje. $z_{\min} = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $z_{\max}(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = \sqrt{2}$

▼ Poglavlje 3

Obnavljanje: diferencijalne jednačine

OBIČNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE PRVOG REDA

Određivanje opšteg i partikularnog rešenja diferencijalne jednačine.

1. Odrediti opšte rešenje sledećih diferencijalnih jednačina:

- (a) $\sin x \cdot y' = y$
- (b) $(\sqrt{xy} + \sqrt{x})y' - y = 0$;
- (c) $3e^x \sin y dx = (e^x - 1) \cos y dy$;
- (d) $(x+1)y' = y - 1$;
- (e) $y' = (8x + 2y + 1)^2$;
- (f) $\frac{xy' - y}{x} = \sqrt{1 + (y')^2}$
- (g) $y - xy' = y \ln \frac{x}{y}$;
- (h) $2x^2 dy = (x^2 + y^2) dx$;
- (i) $xy' \cos \frac{y}{x} = y \cos \frac{y}{x} - x$;
- (j) $xy' - 2y = 2x^4$;
- (k) $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$;
- (l) $y' + 2y = \frac{3x^2 + 2x}{e^{2x}}$
- (m) $y' + y = \frac{x}{y}$;
- (n) $(2x + ye^x)dx + (\ln y + e^x)dy = 0$;
- (o) $(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2xydy = 0$.

2. Odrediti partikularna rešenja diferencijalnih jednačina:

- (a) $ydx + \operatorname{ctg} x dy = 0$, uz početni uslov $y(\frac{\pi}{3}) = -1$;
- (b) $(xy' - y) \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = x$, uz početni uslov $y(-1) = 0$;
- (c) $(1-x)(y' + y) = e^{-x}$, uz početni uslov $y(2) = 0$.

1. Rešenja su:

- (a) $y = C \operatorname{tg} \frac{x}{2}$
- (b) $2\sqrt{y} + \ln y = 2\sqrt{x} + C$
- (c) $(e^x - 1)^3 = C \sin y$
- (d) $y = 1 + C(x + 1)$
- (e) $\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(4x + y + \frac{1}{2}) = 2x + C$
- (f) $x^2 + y^2 = Cx$
- (g) $y = xe^{Cx}$
- (h) $\frac{2x}{x-y} = \ln |Cx|$
- (i) $\sin \frac{y}{x} = -\ln |x| + C$
- (j) $y = (x^2 + C)x^2$
- (k) $y = (x^2 + C)e^{-x^2}$
- (l) $y = (x^3 + x^2 + C)e^{-2x}$
- (m) $y^2 = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$
- (n) $x^2 + ye^x + y \ln y - y + C = 0$
- (o) $\frac{x^3}{3} + xy^2 + x^2 + C = 0$

2. Rešenja su:

- (a) $y = -2 \cos x$
- (b) $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\frac{x}{2} \operatorname{arctg} \frac{y}{x}}$
- (c) $y = -\ln |1 - x| e^{-x}$

LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE DRUGOG REDA SA KONSTANTNIM KOEFICIJENTIMA

Homogene i nehomogene. Metod neodređenih koeficijenata za (a) do (h), Metod varijacije konstanti pod (i).

Odrediti opšta rešenja sledećih diferencijalnih jednačina:

(a) $y'' + 3y' = 3$

(b) $y'' - 6y' + 9y = x^2$

(c) $y'' - y' - 6y = 3e^{2x}$

(d) $y'' + y' - 2y = e^{-2x}$

(e) $y'' + 3y' + 2y = xe^{-x}$

(f) $y'' - y = (x^2 - 3)e^{2x}$

(g) $y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + 4e^x$

(h) $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \cos x$

(i) $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$

Rešenje:

(a) $y = C_1 + C_2 e^{-3x} + x$

(b) $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + \frac{1}{9} x^2 + \frac{4}{27} x + \frac{2}{27}$

(c) $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{3x} - \frac{3}{4} e^{2x}$

(d) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{3} x e^{-2x}$

(e) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{2} e^{-x} (x^2 - 2x)$

(f) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^{2x} (\frac{1}{3} x^2 - \frac{8}{9} x - \frac{1}{27})$

(g) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{5} e^{2x} + 2e^x$

(h) $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} - (\cos x) e^{3x}$

(i) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln (\sin x)$

▼ Poglavlje 4

Obnavljanje: brojni, funkcionalni i Furijeovi redovi

ZADATAK 1

Brojni red – određivanje sume reda.

Ispitati konvergenciju i naći zbir redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, gde je:

$$(1^\circ) \quad a_k = \frac{1}{(3k-2)(3k+1)},$$

$$(2^\circ) \quad a_k = \sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k}.$$

Rešenje. (1°) Rastavljanjem a_k na delimične razlomke i sumiranjem sledi:

$$a_k = \frac{1}{3} \frac{1}{3k-2} - \frac{1}{3} \frac{1}{3k+1},$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right),$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}.$$

(2°) Sumiranjem sledi:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = 1 - \sqrt{2} + \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1},$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 - \sqrt{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = 1 - \sqrt{2}.$$

ZADATAK 2

Poredbeni kriterijum.

Ispitati konvergenciju redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, gde je:

$$a_k = \frac{1}{k} \left(\frac{2}{5} \right)^k$$

Rešenje. Zadatak se rešava primenom poredbenog kriterijuma.

Neka je $b_k = \left(\frac{2}{5} \right)^k$. Za $k \geq 1$ je $\frac{1}{k} \leq 1$, pa je $a_k \leq \left(\frac{2}{5} \right)^k = b_k$ za svako $k \in \mathbb{N}$.

Kako je $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^k$ konvergentan geometrijski red, to je i $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergentan.

Za vežbu:

Ispitati konvergenciju redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, gde je:

$$(1^{\circ}) \quad a_k = \frac{1}{\sqrt{(2k-1)(2k+2)}}, \quad (2^{\circ}) \quad a_k = \frac{5k+1}{\sqrt{k^6+3k^2+2}},$$

ZADATAK 3

Košijev koreni kriterijum.

Ispitati konvergenciju redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, gde je:

$$(1^{\circ}) \quad a_k = \left(\frac{3k}{k+5}\right)^k \left(\frac{k+2}{k+3}\right)^{k^2}, \quad (2^{\circ}) \quad a_k = k^2 \left(\frac{k}{2k-1}\right)^k.$$

Rešenje. Zadatak rešavamo primenom Cauchyevog kriterijuma.

(1^o) Za opšti član a_n nalazimo

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+5} \left(\frac{n+2}{n+3}\right)^n = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^n = 3e^{-1} > 1,$$

pa red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergira.

(2^o) ... pokazuje se da je $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{2/x} = 1$.

Prema prethodnom je

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{2/n} = \frac{1}{2} < 1$$

i red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira.

ZADATAK 4

Dalamberov kriterijum.

Ispitati konvergenciju redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, gde je:

$$(1^\circ) \quad a_k = \frac{3^k k!}{k^k}, \quad (2^\circ) \quad a_k = \frac{(2k+1)!!}{3^k (k!)^2}.$$

Rešenje. Zadatak rešavamo primenom D'Alambertovog kriterijuma.

(1°) Za opšti član a_n nalazimo

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{3^n n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = 3e^{-1} > 1,$$

pa red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergira.

(2°) Kako je

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)!!}{3^{n+1} ((n+1)!)^2} \frac{3^n (n!)^2}{(2n+1)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3(n+1)^2} = 0 < 1,$$

red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira.

ZADATAK 5

Košijev integralni kriterijum.

Ispitati konvergenciju redova $\sum_{k=2}^{\infty} a_k$, gde je:

$$(1^\circ) \quad a_k = k^2 e^{-\sqrt{k}}, \quad (2^\circ) \quad a_k = \frac{1}{k(\ln k)^p}.$$

Rešenje. Zadatak rešavamo primenom Cauchyevog integralnog kriterijuma.

(1°) Posmatramo funkciju $f(x) = x^2 e^{-\sqrt{x}}$. Ova funkcija je pozitivna i neprekidna za svako $x \geq 0$. Za $x \geq 16$ je $f'(x) = \frac{1}{2}(4 - \sqrt{x})x e^{-\sqrt{x}} \leq 0$, pa je $f(x)$ i nerastuća. Uzimamo $x_0 = 16$, $m = [x_0] = 16$ i

$$a_k = f(k) = k^2 e^{-\sqrt{k}} \quad (k \geq 16).$$

Smenom $t = \sqrt{x}$ izračunavamo nesvojstveni integral

$$\int_{16}^{+\infty} f(x) dx = \int_{16}^{+\infty} x^2 e^{-\sqrt{x}} dx = 2 \int_4^{+\infty} t^5 e^{-t} dt \quad \text{završiti za vežbu}$$

(2°) Za $x \geq 2$, funkcija $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}$ je neprekidna i pozitivna. Takođe, $f(x)$ je nerastuća za $x \geq e^{-p}$ jer je $f'(x) = -\frac{p + \ln x}{x^2(\ln x)^{p+1}} \leq 0$. Uzimajući $x_0 = \max\{2, e^{-p}\} \geq 2$, $m = [x_0] \geq 2$ i $a_k = f(k)$, smenom $t = \ln x$ za $p \neq 1$ nalazimo

$$\begin{aligned} \int_m^{+\infty} f(x) dx &= \int_m^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_{\ln m}^{+\infty} \frac{dt}{t^p} = \frac{t^{1-p}}{1-p} \Big|_{\ln m}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{t \rightarrow +\infty} t^{1-p} - \frac{(\ln m)^{1-p}}{1-p}. \end{aligned}$$

Kako je

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{1-p} = \begin{cases} +\infty, & p < 1, \\ 0, & p > 1, \end{cases}$$

to je

$$\int_m^{+\infty} f(x) dx = \begin{cases} +\infty, & p < 1, \\ -\frac{1}{1-p} (\ln m)^{1-p}, & p > 1. \end{cases}$$

Za $p = 1$ je

$$\int_m^{+\infty} f(x) dx = \int_m^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_{\ln m}^{+\infty} \frac{dt}{t} = \ln t \Big|_{\ln m}^{+\infty} = +\infty.$$

Dakle, red $\sum_{k=2}^{\infty} a_k$ konvergira za $p > 1$ i divergira za $p \leq 1$.

ZADATAK 6

Apsolutna i uslovna konvergencija.

Ispitati apsolutnu i uslovnu konvergenciju alternativnih redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$,
gde je:

$$\begin{aligned} (1^\circ) \quad a_k &= \frac{(-1)^k}{(k!)^3}, & (2^\circ) \quad a_k &= \frac{(-2)^k}{(k^2)!}, \\ (3^\circ) \quad a_k &= \frac{(-1)^{k+1}}{\ln(k+1)}, & (4^\circ) \quad a_k &= (-1)^{k-1} \tan \frac{1}{k}. \end{aligned}$$

Rešenje. (1°) Kako je $|a_n| = \frac{1}{(n!)^3}$ i

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^3}{[(n+1)!]^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^3} = 0 < 1,$$

red $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergira prema D'Alambertovom kriterijumu. Tada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ apsolutno konvergira.

(2°) Kako je

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n^2)!}{[(n+1)^2]!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(n^2 + 2n + 1)(n^2 + 2n) \cdots (n^2 + 1)} = 0 < 1, \end{aligned}$$

red $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergira, pa $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ apsolutno konvergira.

(3°) Za $x \geq 1$, funkcija $f(x) = x - \ln x$ raste i važi $f(1) = 1 > 0$. Zato je $f(x) > 0$, tj. $x > \ln x$, za svako $x \geq 1$.

Kako je $|a_k| = \frac{1}{\ln(k+1)}$, prema prethodnom sledi $\frac{1}{k+1} < \frac{1}{\ln(k+1)}$. Red $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergira. Prema porečbenom kriterijumu tada divergira i red $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

S druge strane, niz $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ je opadajući i važi $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, pa red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira prema Leibnizovom kriterijumu.

Dakle, red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ uslovno konvergira.

(4°) Kako je $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$, to je $\tan x \sim x$ kad $x \rightarrow 0$.

Prema prethodnom je

$$|a_k| = \tan \frac{1}{k} \sim \frac{1}{k},$$

pa $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ divergira kao i harmonijski red $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

Niz $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ opada i važi $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, pa $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira prema Leibnizovom kriterijumu.

Dakle, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ uslovno konvergira.

ZADATAK 7

Uniformna konvergencija funkcionalnog reda.

Na segmentu $[\alpha, \beta]$ za $0 < \alpha < \beta$ ispitati uniformnu konvergenciju reda $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, gde je

$$f_k(x) = \frac{x}{[1 + (k-1)x] (1 + kx)}.$$

Rešenje. Rastavljanjem $f_k(x)$ na delimične razlomke i sumiranjem sledi:

$$\begin{aligned} f_k(x) &= \frac{1}{1 + (k-1)x} - \frac{1}{1 + kx}, \\ S_n(x) &= \sum_{k=1}^n f_k(x) = 1 - \frac{1}{1 + nx}, \\ S(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 1, \quad x \in [\alpha, \beta]. \end{aligned}$$

Iz

$$|R_n(x)| = |S(x) - S_n(x)| = \frac{1}{1 + nx} \leq \frac{1}{1 + n\alpha} < \frac{1}{n\alpha},$$

za proizvoljno $\varepsilon > 0$ sledi $|R_n(x)| < \varepsilon$ kad je $\frac{1}{n\alpha} < \varepsilon$, tj. $n > \frac{1}{\alpha\varepsilon}$. Zato postoji

$N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{1}{\alpha\varepsilon} \right\rceil + 1 \in \mathbb{N}$ tako da je $|R_n(x)| < \varepsilon$ za svako $n \geq N(\varepsilon)$ i svako $x \in [\alpha, \beta]$.

Red $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ uniformno konvergira na svakom segmentu $[\alpha, \beta]$ sa $0 < \alpha < \beta$ ka funkciji $S(x) = 1$.

Ako je $|x| \geq r$, $0 < r < +\infty$, ispitati uniformnu konvergenciju reda

$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, gde je

$$f_k(x) = \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k}} \frac{1}{x}.$$

Rešenje. Zadatak rešavamo primenom Weierstrassovog kriterijuma.

Za $|x| \geq r$ je

$$|f_k(x)| = \frac{1}{k\sqrt{k}} \frac{1}{|x|} \leq \frac{1}{k\sqrt{k}} \frac{1}{r} = M_k.$$

Red $\sum_{k=1}^{\infty} M_k = \frac{1}{r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k}} = \frac{1}{r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3/2}}$ je konvergentan hiperharmonijski red, pa

$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ uniformno konvergira na $(-\infty, -r] \cup [r, +\infty)$ za svako r takvo da je $0 < r < +\infty$.

ZADATAK 8

Potencijalni (stepeni) redovi.

Ispitati konvergenciju potencijalnog reda $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$, gde je:

$$a_k = \frac{1}{k^p}$$

Rešenje.

Kako je

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^{p/n} = e^0 = 1,$$

red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$ konvergira za svako $x \in (-1, 1)$.

Za $x = 1$ dobijamo hiperharmonijski red koji konvergira za $p > 1$.

Za $x = -1$ dobijamo alternativni red $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^p}$. Ovaj red, prema apsolutno konvergira za $p > 1$, uslovno konvergira za $0 < p \leq 1$ i divergira za $p \leq 0$.

ZADATAK 9

Potencijalni (stepeni) redovi

(2°) Radijus konvergencije je

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 - 1) 2^{n+1}}{((n+1)^2 - 1) 2^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2n} = 2,$$

pa red konvergira za $x \in (-2, 2)$.

Za $x = 2$ se dobija red $\sum_{k=1}^{\infty} (k^2 - 1)$, a za $x = -2$ red $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (k^2 - 1)$. Oba brojna reda divergiraju. Zato stepeni red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$ konvergira za svako $x \in (-2, 2)$, tj. postoji zbir

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 - 1}{2^k} x^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)(k+1)}{2^k} x^k, \quad x \in (-2, 2).$$

Integracijom nalazimo

$$S_1(x) = \int S(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)(k+1)}{2^k} \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{2^k} x^{k+1} = x^3 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{2^k} x^{k-2},$$

odakle je

$$S_2(x) = \frac{S_1(x)}{x^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{2^k} x^{k-2}.$$

Ponovnom integracijom sledi

$$\begin{aligned} \int S_2(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{2^k} \frac{x^{k-1}}{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} x^{k-1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{2^{k-1}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^{k-1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^k = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{1}{2-x}, \end{aligned}$$

pa je

$$S_2(x) = \left(\frac{1}{2-x}\right)' = \frac{1}{(2-x)^2}.$$

Zato je

$$\begin{aligned} S_1(x) &= x^3 S_2(x) = \frac{x^3}{(2-x)^2}, \\ S(x) &= S_1'(x) = \left(\frac{x^3}{(2-x)^2}\right)' = \frac{x^2(6-x)}{(2-x)^3}, \quad x \in (-2, 2). \end{aligned}$$

Ispitati konvergenciju i naći zbir potencijalnih redova $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$, gde je:

$$(1^\circ) \quad a_k = \frac{1}{k 5^k}, \quad (2^\circ) \quad a_k = \frac{k^2 - 1}{2^k}.$$

Rešenje. (1°) Radijus konvergencije je

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) 5^{n+1}}{n 5^n} = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 5,$$

pa red konvergira za $x \in (-5, 5)$.

Za $x = 5$ se dobija harmonijski red koji divergira. Za $x = -5$ se dobija alternativni red $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ koji konvergira prema Leibnizovom kriterijumu.

Dakle, dati red $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$ konvergira za svako $x \in [-5, 5)$, tj. postoji zbir

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k 5^k} x^k, \quad x \in [-5, 5).$$

Dobijamo

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k 5^k} k x^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5^k} x^{k-1} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{5^{k-1}} \\ &= \frac{1}{5} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{5} \right)^{k-1} = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{5} \right)^k = \frac{1}{5} \frac{1}{1 - \frac{x}{5}} = \frac{1}{5-x}. \end{aligned}$$

Kako je $S(0) = 0$, integracijom na $[0, x]$ za $|x| < 5$ nalazimo

$$\begin{aligned} \int_0^x S'(t) dt &= S(t) \Big|_0^x = S(x) - S(0) = S(x), \\ \int_0^x S'(t) dt &= \int_0^x \frac{dt}{5-t} = -\ln |5-t| \Big|_0^x = -\ln |5-x| + \ln 5 = \ln \frac{5}{5-x}, \end{aligned}$$

pa je zbirna funkcija

$$S(x) = \ln \frac{5}{5-x}, \quad x \in [-5, 5).$$

Vrednost $x = -5$ je uključena zbog konvergencije reda i neprekidnosti funkcije $\ln \frac{5}{5-x}$ u $x = -5$.

ZADATAK 10

Razvoj funkcije u stepeni red.

Razviti u stepeni red funkcije:

$$(1^\circ) \quad f(x) = \cos^2 x, \quad (2^\circ) \quad f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

i odrediti oblast konvergencije dobijenih redova.

Rešenje. (1°)

$$\begin{aligned} f(x) = \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} (2x)^{2k} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k 4^k}{(2k)!} x^{2k}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

(2°) Rastavljanjem $f(x)$ na delimične razlomke, dobijamo

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{3}{x-3} - \frac{2}{x-2} \\ &= \frac{1}{\frac{x}{3} - 1} - \frac{1}{\frac{x}{2} - 1} = \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} - \frac{1}{1 - \frac{x}{2}}. \\ \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^k, \quad \frac{x}{2} \in (-1, 1), \\ \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^k, \quad \frac{x}{3} \in (-1, 1). \end{aligned}$$

Kako iz $\frac{x}{2} \in (-1, 1)$ sledi $x \in (-2, 2)$ i iz $\frac{x}{3} \in (-1, 1)$ sledi $x \in (-3, 3)$ i kako je $(-2, 2) \cap (-3, 3) = (-2, 2)$, to je

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^k - \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^k} - \frac{1}{3^k}\right) x^k, \quad x \in (-2, 2).$$

ZADATAK 11

Razvoj funkcije u stepeni red

Razviti u stepeni red funkciju

$$f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

i odrediti oblast konvergencije dobijenog reda.

Rešenje. Kako je

$$f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x),$$

tada je:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k, \quad x \in (-1, 1],$$

$$\ln(1-x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (-x)^k = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} x^k, \quad x \in [-1, 1)$$

i

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} x^k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left[(-1)^{k+1} + 1 \right] \frac{1}{k} x^k, \quad x \in (-1, 1).$$

Za $k = 2m$ je $(-1)^{k+1} + 1 = 0$, a za $k = 2m - 1$ je $(-1)^{k+1} + 1 = 2$, gde je $m \in \mathbb{N}$. Zato je

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{2m-1} x^{2m-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} x^{2k-1}, \quad x \in (-1, 1).$$

ZADATAK 12

Razvoj funkcije u Furijev red.

Naći Fourierov razvoj funkcije

$$f(x) = |x|, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

Na osnovu dobijenog rezultata naći zbir brojnog reda

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}.$$

Funkcija $f(x)$ je parna i zadata na intervalu $(-\pi, \pi)$. Fourierovi koeficijenti se nalaze :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{2}{n^2 \pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \quad (n \in \mathbb{N}), \\ b_n &= 0 \quad (n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

Kako je $(-1)^n - 1 = 0$ za $n = 2k$ i $(-1)^n - 1 = -2$ za $n = 2k-1$ ($k \in \mathbb{N}$), to je:

$$a_{2k} = 0, \quad a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{(2k-1)^2} \quad (k \in \mathbb{N}).$$


Fourierov red ima oblik:

$$F(x) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1} \cos(2k-1)x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x,$$

pri čemu je

$$F(\pm\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{\pi + \pi}{2} = \pi.$$

Grafik funkcije $F(x)$ je



Za $x = 0$ imamo $F(0) = f(0) = 0$ i

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2},$$

pa je

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Naći Fourierov razvoj funkcije

$$f(x) = x^2, \quad x \in (1, 3).$$

Na osnovu dobijenog rezultata naći sumu

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Funkcija $f(x)$ je zadata na intervalu $(\alpha, \beta) = (1, 3)$, pa za određivanje Fourierovih koeficijenata koristimo:

$$a_0 = \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \frac{2}{2} \int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3},$$

$$a_n = \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \cos \frac{2n\pi}{\beta - \alpha} x dx = \int_1^3 x^2 \cos n\pi x dx = \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

$$b_n = \frac{2}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \sin \frac{2n\pi}{\beta - \alpha} x dx = \int_1^3 x^2 \sin n\pi x dx = \frac{8}{n\pi} (-1)^{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Pri izračunavanju koeficijenata a_n, b_n ($n \in \mathbb{N}$), odgovarajući integrali su rešeni dvostrukom primenom parcijalne integracije.


Tada je:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2} a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\pi x + b_k \sin k\pi x) \\ &= \frac{13}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4(-1)^k}{k^2\pi^2} \cos k\pi x + \frac{8(-1)^{k+1}}{k\pi} \sin k\pi x \right), \end{aligned}$$

pri čemu je

$$F(1) = F(3) = \frac{f(1+0) + f(3-0)}{2} = \frac{1+9}{2} = 5.$$

Grafik funkcije $F(x)$



Za $x = 1$ imamo $F(1) = 5$ i

$$5 = \frac{13}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4(-1)^k}{k^2\pi^2} \cos k\pi + \frac{8(-1)^{k+1}}{k\pi} \sin k\pi \right).$$

Zbog $\cos k\pi = (-1)^k$ i $\sin k\pi = 0$ ($k \in \mathbb{N}$), iz poslednje jednakosti sledi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

▼ Poglavlje 5

Obnavljanje: višestruki integrali

ZADATAK 1

Izračunavanje dvojnog integrala.

Primer. *Izračunati:*

$$\iint_{\mathcal{D}} \frac{x^2}{1+y^2} dx dy, \quad \mathcal{D} = [0, 1] \times [0, 1]$$

$$\iint_{\mathcal{D}} (x^3 + y^3) dx dy, \quad \mathcal{D} \text{ je oblast ograničena pravama } y = x/2, y = x \text{ i } x = 4$$

Rešenje:

$$I = \int_0^1 x^2 dx \cdot \int_0^1 \frac{dy}{1+y^2}$$

$$I = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \cdot \arctan y \Big|_0^1 dy$$

$$\mathcal{D} = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, x/2 \leq y \leq x\}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{D}} (x^3 + y^3) dx dy &= \int_0^4 dx \int_{x/2}^x (x^3 + y^3) dy \\ &= \int_0^4 \left[x^3 y + \frac{y^4}{4} \right] \Big|_{y=x/2}^{y=x} dx \\ &= \int_0^4 \left[x^3(x - x/2) + \frac{1}{4}(x^4 - x^4/64) \right] dx \\ &= \frac{47}{64} \int_0^4 x^4 dx \\ &= \frac{752}{5} \end{aligned}$$

ZADATAK 2

Smena promenljivih u dvojnog integralu.

Primer. Izračunati:

$$\iint_{\mathcal{D}} (x^2 - y^2) dx dy, \quad \mathcal{D} : x + y = 1, \quad x + y = 3, \quad 2x - y = 2, \quad 2x - y = -1$$

Rešenje:

$$x + y = u, \quad 2x - y = v, \quad x = \frac{u + v}{3}, \quad y = \frac{2u - v}{3}, \quad J = -\frac{1}{3}$$

$$u \in [1, 3], \quad v \in [-1, 2]$$

$$I = \int_1^3 du \int_{-1}^2 \frac{u}{3} (2v - u) \cdot \frac{1}{3} dv$$

$$I = -\frac{14}{9}$$

ZADATAK 3

Polarne koordinate.

e

Primer. Izračunati:

$$a) \iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$b) \iint_D \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \mathcal{D} : x^2 + y^2 = 4x, \quad x^2 + y^2 = 8x, \quad y = 0, \quad y = x$$

Rešenje:

a) Uvodimo polarne koordinate:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad \rho \in [0, 1], \quad \varphi \in [0, \pi/2]$$

$$\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 \sqrt{a^2 - \rho^2} \rho d\rho = \frac{1}{3} a^3 \int_0^{\pi/2} d\varphi = \frac{a^3}{6} \pi$$

b) Uvodimo polarne koordinate:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad \rho \in [0, \pi/4], \quad \varphi \in [4 \cos \varphi, 8 \cos \varphi]$$

$$I = \iint_G \frac{\rho d\rho d\varphi}{\rho^4} = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_{4 \cos \varphi}^{8 \cos \varphi} \frac{d\rho}{\rho^3}$$

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} d\varphi \cdot \frac{1}{\rho^2} \Big|_{4 \cos \varphi}^{8 \cos \varphi} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{64 \cos^2 \varphi} - \frac{1}{16 \cos^2 \varphi} \right) d\varphi$$

$$I = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{64} - \frac{1}{16} \right) \int_0^{\pi/4} \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi}$$

$$I = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1-4}{64} \cdot \tan \varphi \Big|_0^{\pi/4} = \frac{3}{128}$$

ZADATAK 4

Primena dvojnog integrala na izračunavanje zapremine tela.

Izračunati zapreminu tela određenog na sledeći način:

- a) $x^2 + y^2 = 2x, x^2 + y^2 = 2y, z = x + 2y, z = 0$
b) $z = 0, z = \frac{x^2 + y^2}{2}, (x - 1)^2 + y^2 = 1$

Rešenje:

a) $V = \iiint_{\mathcal{D}} z dx dy, \quad \mathcal{D} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\} = \mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$
 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, K_1 : x^2 + y^2 = 2x, \rho = 2 \cos \varphi, K_2 : x^2 + y^2 = 2y, \rho = 2 \sin \varphi$

$$\begin{aligned} V &= \iint_{\mathcal{D}} (x + 2y) dx dy \\ &= \int_0^{\pi/4} (\cos \varphi + 2 \sin \varphi) d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi} \rho^2 d\rho + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\cos \varphi + 2 \sin \varphi) d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho \\ &= \dots \\ &= \frac{3}{4}\pi - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

b) $x = 1 + \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, \rho \in [0, 1], \varphi \in [0, 2\pi]$

$$\begin{aligned} V &= \iint_{\mathcal{D}} \frac{x^2 + y^2}{2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{(1 + \rho \cos \varphi)^2 + (\rho \sin \varphi)^2}{2} \cdot \rho d\rho \\ V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left(\frac{\rho}{2} + \rho^2 \cos \varphi + \frac{\rho^3}{2} \right) d\rho \\ V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{\rho^2}{4} + \frac{\cos \varphi}{3} \rho^3 + \frac{\rho^4}{8} \right) \Big|_0^1 \\ V &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{8} + \frac{\cos \varphi}{3} \right) d\varphi = \left(\frac{3}{8}\varphi + \frac{\sin \varphi}{3} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3}{4}\pi \end{aligned}$$

ZADATAK 5

Primena dvojnog integrala na izračunavanje površine ravnog lika.

Primer. Izračunati površinu ravnog lika određenog sa:

$$a) \quad \mathcal{D} : x^2 + y^2 \leq 2x, \quad |y| \leq x,$$

$$b) \quad \mathcal{D} : \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}, \quad y = 0$$

Rešenje:

$$a) \quad x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad J = \rho$$

$$\mathcal{G} : -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi$$

$$P(\mathcal{D}) = \iint_{\mathcal{D}} dx dy = \iint_{\mathcal{G}} \rho d\varphi d\rho$$

$$P(\mathcal{D}) = 2 \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho = 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{2 \cos \varphi}$$

$$P(\mathcal{D}) = 4 \int_0^{\pi/4} \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2} + 1$$

$$b) \quad P(\mathcal{D}) = \iint_{\mathcal{D}} dx dy$$

$$u = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, \quad v = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}$$

$$\mathcal{G} : v = u^2, \quad v = u, \quad J = -\frac{ab}{2}$$

$$P(\mathcal{D}) = \frac{ab}{2} \int_0^1 du \int_{u^2}^u dv = \frac{ab}{2} \int_0^1 (u - u^2) du$$

$$P(\mathcal{D}) = \frac{ab}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{ab}{12}$$

ZADATAK 6

Primena dvojnog integrala na izračunavanje površine dela površi.

Primer. Izračunati površinu dela konusa $x^2 + y^2 = z^2$ koji iseca cilindar $x^2 + y^2 = 2ax$.

Rešenje.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \mathcal{D} : x^2 + y^2 \leq 2ax, \mathcal{D} : (x - a)^2 + y^2 \leq a^2$$

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} P &= 2 \iint_{\mathcal{D}} \sqrt{2} dx dy \\ &= 2\sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho d\rho \\ &= 4\sqrt{2} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{2a \cos \varphi} d\varphi \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{\pi/2} 4a^2 \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= 4a^2 \sqrt{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi \\ &= 4\sqrt{2} a^2 \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/2} \\ &= 2\sqrt{2} a^2 \pi. \end{aligned}$$

ZADATAK 7

Trojni integrali.

1. Izračunaj:

Rešenja:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } \iiint_V z \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} y \leq 1-x \\ y \leq 1+x \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \\ z \leq 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} 1. & 2. \\ \text{(a) } \frac{1}{2} & \text{(a) } \frac{64\pi}{15} \\ \text{(b) } \frac{4}{7} & \text{(b) } \pi \\ & \text{(c) } \frac{\pi}{2} \\ & \text{(d) } \frac{3\pi}{4} \end{matrix} \\
 & \text{(b) } \iiint_V x \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} x \geq y^2 \\ x \leq 1 \\ z \geq 0 \\ z \leq x \end{cases}
 \end{aligned}$$

2. Izračunaj:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} z \geq x^2 + y^2 \\ z \leq 4 \\ x \geq 0 \end{cases} \\
 & \text{(b) } \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} z^2 \leq x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 \leq 2y \\ z \geq 0 \end{cases} \\
 & \text{(c) } \iiint_V \left(x^2 + \frac{y^2}{9}\right) \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{9} - 2x - z + 1 \leq 0 \\ z \leq 2 - 2x \end{cases} \\
 & \text{(d) } \iiint_V z \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} x^2 + y^2 \leq z \\ z \leq 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

3. Izračunaj:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } \iiint_V \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} z^2 \geq x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z \end{cases} \\
 & \text{(b) } \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx dy dz \text{ ako je } V \dots \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \geq 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \leq 0 \\ z \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

4. Odredi zapreminu tela V (primenom trostrukog integrala):

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } V \dots \begin{cases} x \geq z^2 \\ y \geq -1 \\ y \leq 1 \\ x \leq 1 \end{cases} & \text{(d) } V \dots \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z \geq 0 \\ z \leq 2y + 1 \end{cases} \\
 & \text{(b) } V \dots \begin{cases} x \geq z^2 + y^2 - 2z - 4y + 1 \\ 2z + x \leq 8 \\ z \geq 0 \end{cases} & \text{(e) } V \dots \begin{cases} z^2 \geq x^2 + y^2 \\ z^2 \leq 3(x^2 + y^2) \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \end{cases} \\
 & \text{(c) } V \dots \begin{cases} z = 1 - x^2 - y^2 \\ y + z = 1 \end{cases} & \text{(f) } V \dots \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \geq 2z \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z \end{cases}
 \end{aligned}$$

Rešenja:

3.

4. Zapremine su:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } 2\pi & \text{(a) } \frac{8}{3} & \text{(d) } \pi \\
 & \text{(b) } \frac{15\pi}{8} & \text{(b) } \frac{121\pi}{4} & \text{(e) } \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\pi}{3} \\
 & & \text{(c) } \frac{\pi}{32} & \text{(f) } \frac{28\pi}{3}
 \end{aligned}$$

▼ Poglavlje 6

Obnavljanje: krivolinijski integrali

ZADATAK 1

Krivolinijski integral prve vrste

1. Izračunaj:

- (a) $\int_K xy \, ds$ ako je K deo prave $y = -2x + 2$ u prvom kvadrantu.
- (b) $\int_K (x + y) \, ds$ ako je K rub trougla $\triangle ABC$ zadatog tačkama $A(1, 2)$, $B(2, 1)$, $C(2, 4)$.
- (c) $\int_K xy \, ds$ ako je K luk elipse $16x^2 + 9y^2 = 144$ između tačaka $A(0, 4)$ i $B(\frac{3\sqrt{2}}{2}, 2\sqrt{2})$.
- (d) $\int_K \sqrt{xy} \, ds$ ako je K rub ravanskog lika određenog sa $y \geq x^2$ i $x \geq y^2$.
- (e) $\int_K x \, ds$ ako je K deo kružnice $(x - \sqrt{2})^2 + (y + 2)^2 = 8$ u 1. kvadrantu.

2. Izračunaj:

- (a) $\int_K x \, ds$ ako je K luk prostorne krive:
$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}e^t \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}e^t \\ z = e^{\frac{3}{2}t} \end{cases}$$
 između tačaka $O(0, 0, 0)$ i $A(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$;
- (b) $\int_K (x^2 + y^2 + z^2) \, ds$ ako je K luk zavojnice
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}, t \in [0, 2\pi];$$
- (c) $\int_K (2x^2 + y^2) \, ds$ ako je K kriva koja predstavlja presek površi $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ i $z = 2 - x$. (Napomena: Ovdje je potrebno parametrizirati zadanu krivu. Uočite da se z može izraziti preko varijable x , a da se x i y mogu parametrizirati tako da zadovoljavaju jednačinu cilindra.)

Rešenje: 1.

- (a) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- (b) $\frac{3}{2}(9 + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{5})$
- (c) $\frac{1}{7}(125\sqrt{2} - 108)$
- (d) $\frac{5\sqrt{5}-1}{6}$
- (e) $4\sqrt{3} - 4\sqrt{2} + \frac{5\pi}{3}$

2.

- (a) $2\sqrt{2} - 1$
- (b) $2\pi\sqrt{a^2 + b^2} \left(a^2 + \frac{4}{3}b^2\pi^2\right)$
- (c) $4\sqrt{2}\pi$

ZADATAK 2

Krivolinijski integral druge vrste.

3. Izračunaj

- (a) $\oint xydx + xdy + ydy$ ako je K kontura trougla sa temenima $O(0, 0)$, $A(1, 1)$ i $B(1, 2)$ koja se prolazi u pozitivnom smeru.
- (b) $\int_K x^2 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$ ako je K deo prave od tačke $A(1, 2, 3)$ do tačke $B(-1, 2, 1)$.
- (c) $\int_K xdx + ydy - z dz$ ako je K luk zadat sa $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = \frac{1}{t} \end{cases}, t \in [1, 2]$.

Rešenja:

3.

- (a) $\frac{1}{6}$
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) $\frac{75}{8}$

▼ Poglavlje 7

Obnavljanje: površinski integrali

ZADATAK 1

Površinski integrali.

1. Izračunaj:

- (a) $\iint_S \sqrt{1+z^2} dS$ ako je S deo površi $x^2 + y^2 = z^2$ određen sa $-2 \leq z \leq 0$ i $y \geq 0$;
- (b) $\iint_S z^2 dS$ ako je S deo površi $x^2 + z^2 = 1$ određen sa $z \geq 0$ i $-1 \leq y \leq 1$;
- (c) $\iint_S (z^2 - y^2) dS$ ako je S deo površi $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ određen sa $y \geq x^2 - 1$ i $y \leq 0$;
- (d) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$ ako je S površ koju $x + z = 0$ (ravan) odseca od sfere $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
- (e) $\iint_S (x^2 + z^2) dS$ ako je S deo površi $x^2 + z^2 = 2y$ (konus) koji odseca ravan $y = 1$.

2. Izračunaj:

- (a) površinu dela površi $y^2 + z^2 = 1$ određenog sa $z \geq 0$ i $0 \leq x \leq 1$;
- (b) površinu dela površi $x^2 + y^2 = 2$ što ga odsijeca sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$;
- (c) površinu dela površi $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ određenog sa $x \geq 0, y \leq 0$ i $z \leq 0$;

3. Izračunaj:

- (a) $\iint_S (\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} - \frac{z}{4}) dxdy$ ako je S donji deo ravni $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ u prvom oktantu.
- (b) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dxdy$ ako je S unutrašnja strana dela sfere $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ određenog sa $z \geq 0, x \geq 0$.
- (c) $\iint_S (x^2 + \frac{y^2}{4} + z) dxdy$ ako je S unutrašnja strana konusa $x^2 + \frac{y^2}{4} = z^2$ određenog sa $z \geq 0, z \leq 2$.
- (d) $\iint_S (z^2 + 2xy) dxdy$ ako je S unutrašnja strana cilindra $x^2 + y^2 = 1$.
- (e) $\iint_S z dxdy$ ako je S unutrašnja strana sfere $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (Pažnja: sferu S je potrebno podeliti na dva dela)
- (f) $\iint_S (z^2 + y) dxdy$ ako je S spoljašnja strana dela paraboloida $y = x^2 + z^2$ odsečenog ravni $y = 4$. (Pažnja: paraboloid S je potrebno podeliti na dva dela)

4. Izračunaj:

- (a) $\iint_S (\frac{x}{2} + y - \frac{z}{4}) dx dz$ ako je S deo ravni $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ u prvom oktantu i to ona strana koja se "ne vidi" iz koordinatnog početka.
- (b) $\iint_S \sqrt{x^2 + y} dx dz$ ako je S donja strana ravni $x + z = 1$
- (c) $\iint_S [(y-1)^2 + (x-1)^2] dx dz$ ako je S deo ravni $y + z = 1$ odsečen cilindrom $(x-1)^2 + z^2 = 1$ i to ona strana koja se "vidi" iz koordinatnog početka.
- (d) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dx dz$ ako je S unutrašnja strana dela sfere $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ određenog $z \geq 0$, $x \geq 0$.

5. Izračunaj:

- (a) $\iint_S (\frac{x}{2} - \frac{2y}{3} - \frac{3z}{4}) dy dz$ ako je S deo ravni $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ u prvom oktantu i to ona strana koja se "vidi" iz koordinatnog početka.
- (b) $\iint_S xy dy dz$ ako je S unutrašnja strana dela paraboloida $x^2 + y^2 = z$ određenog $z \leq 4$, $x \geq 0$.
- (c) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dy dz$ ako je S spoljašnja strana dela sfere $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ određenog $z \geq 0$, $x \geq 0$.
- (d) $\iint_S x dy dz$ ako je S spoljašnja strana sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

6. Izračunaj:

- (a) $\iint_S (x^2 - z^2) dx dy + (y + 2x - 2) dx dz + z(2x - 2) dy dz$ ako je S deo ravni $2x + y = 2$ u prvom oktantu određen sa $z \geq 0$, $z \leq 3$ i to ona strana koja se "ne vidi" iz koordinatnog početka.
- (b) $\iint_S (x - y^2 - z) dx dy + (y^2 + z - 1) dx dz + (x^2 + y^2) dy dz$ ako je S donja strana onog dela cilindra $z = 1 - y^2$ koji odseca cilindar $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

REŠENJA ZADATKA 1

Površinski integrali

Rešenja.

1.

- (a) $\frac{\sqrt{2}}{3}(5\sqrt{5} - 1)\pi$
 (b) π
 (c) $\frac{4\sqrt{2}}{13}$
 (d) $\frac{\pi}{2}$
 (e) $\frac{4}{13}(1 + 6\sqrt{3})\pi$

2.

- (a) π
 (b) 8π
 (c) 2π

3.

- (a) -2
 (b) -8π
 (c) $\frac{80}{3}\pi$
 (d) 0
 (e) $-\frac{4}{3}\pi$
 (f) 0

4.

- (a) 4
 (b) 0
 (c) $-\pi$
 (d) 0

5.

- (a) 8
 (b) 0
 (c) 8π
 (d) $\frac{4}{3}\pi$

6.

- (a) -9
 (b) 0

✓ Zaključak za lekciju 15

REKAPITULACIJA GRADIVA

Obnavljanje gradiva i priprema za ispit

U ovoj lekciji smo rekapitulirali znanje stečeno u vezi sa

1. Integralima – neodređenim, određenim i nesvojstvenim
2. Funkcijama više promenljive – neprekidnost, lokalne ekstremne vrednosti, uslovni lokalni ekstremi
3. Diferencijalnim jednačinama I i II reda
4. Redovima – brojnim, funkcionalnim i Furijevim redovima
5. Višestrukim integralima – dvojnim i trojnim integralima
6. Krivolinijskim integralima I i II vrste
7. Površinskim integralima I i II vrste

