

Semana 2

Consolidación 2 Tema I

Acápites 1.8

Nervios craneales.

1. Sobre las características morfofuncionales de los nervios motores oculares, marque con una (X) los planteamientos correctos:

- a) ☐ El nervio Oculomotor inerva los músculos recto lateral y oblicuo superior del ojo.
- b) ☐ El nervio Troclear no establece relaciones en su trayecto con el resto de los nervios oculares.
- c) ☐ Los nervios craneales III, IV y VI entran a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior acompañados del ramo oftálmico del trigémino.
- d) ☐ El III nervio craneal inerva en el globo ocular músculos extrínsecos e intrínsecos.

2. Sobre las características morfofuncionales del nervio trigémino, marque con una (X) los planteamientos correctos:

- a) ☐ Presenta varios ramos en cuyos trayectos se encuentran pequeños ganglios vegetativos.
- b) ☐ Su ramo lingual lleva fibras motoras a la lengua.
- c) ☐ Su distribución sensitiva en la piel de la cara limita con los ramos cutáneos del plexo cervical.
- d) ☐ Su ramo oftálmico inerva los músculos lisos del ojo.
- e) ☐ Emerge del sistema nervioso central a nivel del puente.

3. Sobre las características morfofuncionales de los nervios craneales, escriba una (V) en los planteamientos verdaderos y una (F) en los falsos:

- a) ☐ Los nervios craneales V, VII, IX y XII emiten ramos para la inervación de la lengua.
- b) ☐ El nervio Glosofaríngeo inerva al músculo temporal a través de su ramo aurículotemporal.
- c) ☐ Los nervios craneales VII y IX inervan la mucosa del dorso de la lengua.
- d) ☐ La rama oftálmica del Trigémino es la responsable de la formación de pliegues o arrugas horizontales en la piel de la frente por contracción muscular.
- e) ☐ El nervio hipogloso se clasifica como motor y sus fibras están dirigidas a la musculatura de la lengua.
- f) ☐ El nervio hipogloso participa junto con fibras nerviosas del plexo cervical en la formación del asa cervical.
- g) ☐ El nervio Glosofaríngeo emite ramos tonsilares, faríngeos y linguales.

- h) ____ El nervio vago en su porción torácica da origen al nervio laríngeo inferior o recurrente.
- i) ____ Los nervios Glosofaríngeo, Vago y Accesorio tienen comunidad en su emergencia del cráneo por el agujero yugular.
- j) ____ Los nervios Facial y Vestíbulooclear son similares por el origen real de sus fibras.


4. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los nervios craneales, analiza las situaciones siguientes e identifícalas como verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda.

- a) ____ La asimetría de la cara por atrofia del músculo masetero puede ser expresión de una parálisis del trigémino de ese lado.
- b) ____ Las lesiones destructivas del oído medio no encierran peligro para la integridad morfofuncional de ninguno de los nervios craneales.
- c) ____ Las lesiones del plexo parotídeo se acompañan de una disminución de la secreción glandular y muy especialmente de la glándula parótida.
- d) ____ Las lesiones de la porción intrapetrosa del facial pueden provocar trastornos sensitivos, motores vegetativos y motores somáticos.
- e) ____ La asimetría expresiva de la cara puede ser una manifestación de lesión del nervio Trigémino.
- f) ____ Una lesión destructiva a nivel del hueso temporal puede ocasionar trastornos del gusto por lesión del nervio facial.
- g) ____ Una fractura de base de cráneo que deforme el agujero yugular puede lesionar los nervios Glosofaríngeo, Vago y Accesorio.

5. Utilizando figuras de la galería de imágenes identifica los nervios craneales.

1.9 Sinapsis.

1. Identifica los componentes de una sinapsis neuroneuronal en el siguiente esquema:



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

2. Teniendo en cuenta las bases iónicas y características de los potenciales postsinápticos relacione ambas columnas. Se repiten opciones

Columna A

- a) ___ Es producido por incrementos de la permeabilidad de la membrana a los iones potasio o cloruro.
- b) ___ Se suma espacial y temporalmente.
- c) ___ Cumple la ley del todo o nada.
- d) ___ Es producido por incrementos de permeabilidad de la membrana a los iones de sodio.
- e) ___ Al originarse, la membrana postsináptica se hace

Columna B

1. Potencial postsináptico excitatorio.
2. Potencial postsináptico inhibitorio.
3. Ambos
4. No corresponde.

más negativa en el interior.

3. Relacione las alteraciones del medio y algunos medicamentos de la columna A con las modificaciones de la excitabilidad neuronal de la columna B. Se repiten opciones.

Columna A	Columna B
a) ☐ Acidosis.	1. Aumenta (mayor despolarización).
b) ☐ Alcalosis.	2. Disminuye (menos despolarización).
c) ☐ Cafeína.	3. No varía.
d) ☐ Hipoxia.	
e) ☐ Estricnina.	

4. Con relación a las sinapsis neuroneuronales. Responde si las expresiones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F):

- a) ☐ La sumación espacial es posible por la baja resistencia del citoplasma neuronal.
- b) ☐ Los anestésicos aumentan el umbral de excitación de la zona inicial del axón.
- c) ☐ El aporte insuficiente de O_2 puede producir convulsiones por excitación sináptica.
- d) ☐ La integración sináptica se produce en el cono axónico.
- e) ☐ En la sinapsis química la conducción del impulso nervioso es bidireccional.
- f) ☐ La fatiga sináptica constituye un mecanismo de protección del sistema nervioso.
- g) ☐ Las sustancias que compiten con la acetilcolina por el receptor de la membrana postsináptica favorecen la transmisión del impulso.
- h) ☐ El bloqueo de los receptores de la membrana postsináptica impide la transmisión del impulso nervioso.
- i) ☐ Cuando el calcio en el líquido extracelular disminuye, la transmisión sináptica aumenta.

5. Dos neurotransmisores diferentes, excitatorio e inhibitorio, provocan dos tipos de potenciales postsinápticos (A y B). Diga a qué tipo de neurotransmisor corresponde cada gráfico. Fundamente teniendo en cuenta las bases iónicas de los potenciales postsinápticos.

