

Orientaciones a los estudiantes. Práctica docente. Semana 12.

2.10.3 Órgano de la audición y del equilibrio.

Práctica docente.

Durante la práctica docente en la comunidad, deberás junto a tu profesor y demás compañeros.

- Destacar la importancia práctica del conocimiento de las características morfofuncionales del órgano del oído y del equilibrio en situaciones tales como:
 - a) La extracción de cuerpos extraños del conducto auditivo externo.
 - b) La visualización de las paredes del conducto auditivo externo y la membrana timpánica mediante la técnica de la otoscopia.
 - c) Familiarizarte con el reconocimiento de procesos inflamatorios del oído externo, medio e interno.
 - d) Interpretar las consecuencias de una perforación de la membrana timpánica para la calidad de percepción auditiva.
 - e) Interpretar las consecuencias de una pérdida de movilidad en las articulaciones de los huesecillos del oído sobre la calidad de la percepción auditiva.
 - f) Familiarizarte con la exploración de las capacidades funcionales del sistema auditivo, a través de la realización de las pruebas de Weber y Rinné con la ayuda de un diapasón, que te permiten orientarte en el tipo de sordera: de conducción o nerviosa.

Prueba de Weber: Se coloca el diapasón vibrando en el vértice del cráneo, en la unión de ambos huesos parietales y se comprueba si se percibe por igual la vibración en ambos oídos. En caso de un trastorno de conducción se percibe mejor en el lado afectado, mientras que en un trastorno nervioso, no es percibido en el oído afectado.

Prueba de Rinné: Se coloca el diapasón vibrando en el proceso mastoideo del hueso temporal y se mide el tiempo que se percibe la vibración, el cual se denomina tiempo de conducción ósea (T_o); posteriormente cuando se deja de percibir la vibración por esta vía, se coloca las ramas del diapasón frente al conducto auditivo externo y se mide el tiempo hasta que se deje de percibir la vibración acústica, denominándose tiempo de conducción aérea (T_a). Se hacen tres mediciones del T_o y del T_a y se promedian, luego se calcula la relación entre ambos promedios (T_a/T_o), el cual es aproximadamente igual a 2. Si esta relación es inferior a 2 nos orienta sobre una posible sordera de conducción.

- g) Familiarizarte con aquellos medicamentos que pueden provocar efectos secundarios lesionando el receptor o el nervio auditivo como por ejemplos: kanamicina, gentamicina y estreptomina.
- h) Conocer los factores de riesgo que pudieron haber incidido sobre el desarrollo del sistema auditivo en los pacientes con sordera congénita detectados en la comunidad.
- i) Hacer profilaxis de la sordera producto de ruidos intensos del medio.
- j) Familiarizarte con la técnica de exploración del nistagmo como medio de evaluar la función vestibular.
- k) Realizar pruebas de coordinación estáticas y dinámicas que contribuyen al diagnóstico de lesiones vestibulares.
- l) Familiarizarte con el empleo de métodos de estudios para evaluar las condiciones morfofuncionales de las estructuras del órgano de la audición y el equilibrio, como: audiometría, potenciales evocados auditivos, pruebas vestibulares y estudios radiográficos entre otras.