

Semana 9

Respuestas a la consolidación 9.

Contenidos: 2.4 y 2.5

1. Sobre las características morfofuncionales del suelo pelviano. Coloca en el espacio en blanco el número correspondiente a la respuesta correcta.

a) 3 Está integrado por dos planos de los cuales:

1. Uno se sitúa en la parte anterior o urogenital y otro en la parte posterior o anal.
2. Ambos son aponeuróticos.
3. Uno es profundo y constituye el diafragma pelviano y otro superficial constituye el periné propiamente dicho.

b) 1 El diafragma pelviano.

1. Está constituido por los músculos elevador del ano y coccígeo.
2. Ocupa solamente el triángulo anal.
3. Es responsable de proteger las estructuras eréctiles de los genitales externos.

c) 2 Las fosas isquiorrectales.

1. Son los espacios que quedan situados entre los triángulos urogenital y anal.
2. Se sitúan entre la cara inferior del elevador del ano y las ramas isquiopubianas.
3. Se sitúan entre ambos músculos transversos del periné.

2. Sobre las características morfofuncionales de las estructuras que conforman el suelo pelviano. Escriba (V) en caso de que sean verdaderos y (F) en el caso de que sean falsos los siguientes planteamientos:

- a) V El músculo elevador del ano es el componente principal del diafragma pelviano.
- b) V El diafragma pelviano tiene forma de embudo dirigido hacia atrás y abajo.
- c) F El músculo coccígeo forma parte del diafragma urogenital.
- d) F Los agujeros para el paso de estructuras como la uretra, la vagina y el recto se encuentran protegidos por un borde tendinoso.
- e) V Las fibras musculares del diafragma pelviano tienen una amplia inserción en las paredes anterior y laterales de la pelvis.

- f) V Los músculos del suelo pelviano participan en la defecación, la micción y el parto.


3. Establezca una comparación entre los componentes del suelo pelviano en ambos sexos.

En cuanto al plano profundo o diafragma pelviano no existen diferencias esenciales de constitución entre los sexos; sólo que a través de la puerta del elevador del ano en el sexo femenino pasa además de la uretra y el recto, la vagina.

En el plano profundo del periné el sexo masculino presenta el músculo transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra, mientras que en el sexo femenino el músculo transverso profundo está representado sólo por fibras musculares lisas y en su lugar se encuentran dos pequeños vientres asociados a la apertura de la uretra y la vagina (músculo compresor de la uretra y uretrovaginal). El músculo esfínter externo de la uretra está presente en ambos sexos con la función de mantener cerrada la uretra. Este plano profundo del periné sólo está presente en el triángulo anterior o urogenital.


El plano superficial del periné en el triángulo anal contiene en ambos sexos sólo el músculo esfínter externo del ano. En el triángulo urogenital se encuentran el músculo transverso superficial en ambos sexos, además de los músculos bulboesponjosos e isquiocavernosos. El bulboesponjoso en el sexo femenino se origina en el centro perineal, como en el sexo masculino pero en lugar de unir sus fibras en un rafe medio como en este; se extiende a ambos lados del orificio vaginal en forma de paréntesis. En el sexo femenino existe un músculo adicional, el constrictor de la vulva ausente en el sexo masculino. En ambos sexos estos músculos contribuyen a la función eréctil.

4. En la siguiente imagen. Identifica con el número correspondiente, los músculos elevador del ano (1) y las fosas isquiorrectales (2).




5. En la siguiente imagen identifica las tres estructuras señaladas que atraviesan el suelo de la pelvis.

- a) _Uretra_
- b) _Vagina_
- c) _Recto_




6. En la imagen que se muestra correspondiente a una vista superior del suelo pélvico. Identifica los músculos elevador del ano (1) y coccígeo (2).



7. En la siguiente imagen identifica los límites y las porciones de la región denominada periné utilizando la leyenda siguiente:

- a) Sínfisis del pubis.

- b) Vértice del cóccix
- c) Tuberosidades isquiáticas
- d) Triángulo urogenital
- e) Triángulo anal



8. Sobre el embarazo, selecciona la respuesta correcta en cada caso colocando en el espacio en blanco el número correspondiente.

- a) 2 La secreción de gonadotropina coriónica humana por las células trofoblásticas es máxima en el:
 - 1. Tercer trimestre.
 - 2. Primer trimestre.
 - 3. Segundo trimestre.
- b) 1 Para que no ocurra el aborto en las primeras semanas del embarazo, es importante que:
 - 1. La secreción de progesterona sea superior a la de estrógenos.
 - 2. Exista más secreción de estrógenos que de progesterona.
 - 3. Exista el mismo nivel de secreción de estrógenos que de progesterona.
- c) 2 El feto recibe suficiente oxígeno por difusión a pesar de la baja presión parcial de este gas en la sangre fetal porque:
 - 1. La concentración de hemoglobina en la sangre materna es más elevada que en la fetal.
 - 2. La concentración de hemoglobina en la sangre fetal es más elevada que en la materna.
 - 3. La membrana placentaria es más permeable al oxígeno que a otros gases.

- d) 2 La gonadotropina coriónica:
1. Favorece el depósito de grasa en las mamas.
 2. Impide la involución normal del cuerpo amarillo.
 3. Disminuye la utilización de ácidos grasos por la madre.
- e) 2 Los estrógenos:
1. Disminuyen las contracciones uterinas.
 2. Favorecen el crecimiento del útero y los genitales externos.
 3. Disminuyen la utilización de glucosa por la madre.
- f) 1 La somatomamotropina coriónica humana:
1. Disminuye la utilización de glucosa por la madre.
 2. Aumenta la absorción de sodio y agua en los túbulos renales.
 3. Aumenta las contracciones uterinas.
- g) 2 La FSH y LH durante el embarazo se encuentran:
1. Aumentadas.
 2. Disminuidas.
 3. No varían.

9. Menciona algunas adaptaciones fisiológicas de la madre durante el embarazo.

- ❖ Crecimiento del útero, genitales externos y mama.
- ❖ Aumento del volumen sanguíneo.
- ❖ Aumento del gasto cardíaco.
- ❖ Aumento de la eliminación de orina.
- ❖ Aumento de la secreción de todas las glándulas endocrinas excepto las gónadas.
- ❖ Aumento de la respiración.

10. Sobre parto normal y lactancia. Escribe en el espacio en blanco verdadero (V) ó falso (F) según corresponda.

- a) V El aumento de la relación estrógenos/progesterona, aumenta la irritabilidad uterina cerca del término de la gestación.
- b) F El alumbramiento es la salida del feto al exterior.
- c) V La irritación del cuello uterino, aumenta las contracciones del fondo.
- d) V La prolactina favorece la formación de la leche.
- e) F La progesterona favorece el crecimiento del estroma de la mama.
- f) V La oxitocina aumenta las contracciones uterinas.
- g) F Los estrógenos le dan carácter secretor a la mama.
- h) F La somatomamotropina coriónica humana favorece la eyección láctea.

11. Menciona algunos beneficios de la lactancia materna para la madre y el recién nacido.

Madre.

- ❖ Disminuye el riesgo de cáncer de mama.
- ❖ Favorece la involución del útero.
- ❖ Tiene un efecto psicológico positivo.
- ❖ Es más económica.
- ❖ Es más cómoda porque siempre está preparada y con la temperatura adecuada.

Recién nacido.

- ❖ Contiene todos los requerimientos nutricionales.
- ❖ Contiene las inmunoglobulinas que lo protegen de agentes extraños en las primeras etapas de la vida.
- ❖ Tiene un efecto psicológico favorable para su vida futura.
- ❖ Tiene la temperatura adecuada.