

今井达也 MLB 调整方案：短期多局牛棚，达标后逐级重返先发

数据窗口：2026 年 3 月 29 日至 8 月 12 日

杨炎新 3230102355

建议先保留 3—4 周多局牛棚，优先修复抢好球能力，并逐步恢复对左打的变速球。先至少积累 60 个打席，此后按滚动最近 60 个打席检查好球区率、首球好球率和保送率；全部达标后，再按 45、60、75 球增加负荷。现有证据不支持立即永久转为后援，也不足以凭两次牛棚登板认定问题已经解决。

一、三个诊断事实

- 现有公开数据不支持整体球威衰退。** K%在不同联盟环境下均为 27.8%，逐球 Whiff%为 32.3%，四缝线均速 94.9 mph；主要异常集中在 BB%由 7.0%升至 14.6%、Zone%为 43.6%和首球好球率为 51.7%。
- 球种调整要先解决左打。** 滑球使用 45.3%、Whiff 40.6%、官方 Run Value +4（投手视角，正值有利），仍可作为终结球。按逐球重算，四缝线对右打 RV/100 为+1.47，对左打为-1.27，左打 Whiff 只有 15.4%。调整重点应放在对左打的四缝线落点，并恢复变速球与四缝线的速度分层，而非全面削减直球。
- 变速球有历史基础，但 MLB 样本很小。** 该球在 NPB 2025 使用 12.7%、均速 84.7 mph、Whiff 41.6%；到 MLB 后仅 29 球、使用 2.3%、均速 86.8 mph，与四缝线速度差由约 10.1 缩至 8.0 mph。MLB 的 62.5% Whiff 来自 8 次挥棒中的 5 次，不能据此判断该球已经有效。

诊断：三振能力保留，控球与球种结构发生退化

NPB 2025 与 MLB 2026（截止 8 月 12 日）




图 1 核心诊断指标；跨联盟价值指标不作同尺度比较

两次牛棚登板共 89 球、23 个打席，Zone%、首球好球率和 Whiff%分别为 46.1%、73.9%和 40.0%。方向积极，但样本小，且角色、日期、健康恢复和对手同时变化，只能把牛棚视为校准环境。

二、执行安排

阶段	负责人	窗口	观察与动作	未达标处理
A 校准	投手教练、医疗组	3—4 周；每次 1—2 局	医疗检查先行；可尝试固定热身与节奏；变速球速度差不再低于约 8 mph，并尝试向 9—10 mph 恢复；使用率逐步到 8%—12%，优先面对左打	有疼痛、疲劳或动作异常即停止加量；由球队复查握法、释放与健康
B 过程	投手教练、分析组	先积累≥60 打席；此后滚动最近 60 打席	Zone≥46%；首球好球≥60%；BB≤10%；同时检查变速球位置、移动和接触质量	10%<BB≤12%：维持；BB>12%或 Zone、首球持续未达：回 A
C 负荷	教练组	45→60→75 球；每阶至少两次	对比前后半段进区、球速与球种执行；过程门槛继续成立	任一门槛未达：暂停；BB>12%或控球持续未达：回 A；仅当前负荷下执行、球速或健康恶化：退一阶
D 角色	教练组、管理层	完成 60—75 球阶段后评估	健康且过程稳定则回传统先发；若仅第三轮反复失效，评估一轮打线左右或四至五局短先发	不以单场 ERA 或一次高光改变长期角色

以上阈值是便于执行和复盘的暂定管理规则，并非从 23 个牛棚打席估出的能力真值。公开数据未覆盖动作、握法与医疗信息，医疗判断始终先于统计阈值。

三、每次复盘只看四组问题

- 抢好球：Zone%、首球好球率和 BB%是否同步改善。
- 变速球：速度差、落点、移动和接触质量是否在增加使用率时保持稳定。
- 负荷：球数增加后，四缝线球速与进区率是否在后半段下降。
- 样本：牛棚、变速球和第三轮样本是否已经足以改变当前判断。

四、结论

现有数据支持“短期校准、达标后逐级回归”。若过程指标未改善，继续先发会增加球数和保送问题在长局数中再次暴露的风险；若指标在扩大样本后保持稳定，则没有必要因为两次牛棚表现就永久改变角色。

来源与版本： MLB StatsAPI、Baseball Savant、NPB 官方、NPB Basement 及 MLB.com 背景报道。完整 URL、快照、分母和代码见配套底稿；仓库为 github.com/youth-flow/MLB-Analytics，分析版本为 commit 9c8033d，核查结果见《底稿 04 MLB 复现与交付核查说明》。