§ 17008

羥乙烯高級脂肪族醇

Oxyethylene Higher Aliphatic Alcohol

1. 外　　觀　：白～淡黃色之粉末，薄片，或蠟狀硬塊，無臭，無味，或略具特異臭氣。
2. 溶　　狀　：本品 0.5 g 溶於二氧六圜（Dioxan）10 mL 時，其溶液應為「殆澄明」。
3. 羥 基 價　：精確稱取本品約 1.5 g 放入長頸圓底燒瓶中，加無水醋酸，吡啶（Pyridin）試液 5 mL，燒瓶口上置漏斗，於 95～100 ℃油鍋中加熱 1 小時，冷後以水 1 mL 溶洗漏斗上之附著物，於燒瓶中充分振盪混合後，再於油鍋中加熱 10 分鐘，冷後以中性乙醇 5 mL 洗滌漏斗及燒瓶頸，即以 0.5 N 氫氧化鉀乙醇溶液滴定之。（指示劑：酚酞試液 1 mL）另以同樣方法作空白試驗，依下式計算羥基價時，其值應為 155～187（酸價視為 0）。

$$\text{羥基價} = \frac{0.5N\text{氫氧化鉀乙醇溶液消耗 量（ml）} \times 28.05}{\text{試料採取量（g）}}$$

4. 重 金 屬　：40 ppm 以下（以 Pb 計）。
5. 聚氧乙烯（polyoxyethylene）：本品 0.5 g 加水 20 mL，加熱充分振盪混合，冷後過濾，取濾液 10 mL 加硫氰酸銨硝酸鈷試液 10 mL，充分振盪混合再加氯仿 10 mL，振盪混合後，放置時，氯仿層不得呈藍色。
6. 熾 灼 殘 渣　：0.5 %以下。
7. 分　　類　：食品添加物第（十七）類。
8. 用　　途　：其他。