
§ 16021

交酯化蓖麻酸聚合甘油酯


Polyglycerol Esters of Interesterified Ricinoleic Acids

一般結構式為：



n 的平均值約為 3，且 R1、R2、R3 可為氫或蓖麻酸本身所構成之線性聚合物，

因此結構式變為以下：



m 的平均值在 5~8 之間

1. 定　　義　：本品為聚甘油與濃縮的蓖麻油脂肪酸進行酯化所得。
2. 外　　觀　：高度黏稠狀液體。
3. 特 性 鑑 別　：（1）脂肪酸：通過測試。

（2）蓖麻酸：由（1）釋放出之脂肪酸，其羥價（Hydroxyl value）應與蓖麻油脂肪酸之羥價相當，約 150-170。

（3）甘油及聚甘油：將 5 到 20 μL 取自（1）試驗之水層液體點在濾紙上（Whatman No. 3 或同等級）形成一漬點，並將甘油對照組點在樣品旁邊，在異丙醇：水=90：10 之溶液下進行下降層析法 36 小時後取出濾紙，經溶於丙酮之高錳酸鹽類或硝酸銀噴灑於濾紙上，甘油漬點之移動距離為 40 公分，聚甘油漬點在甘油漬點的下方。

4. 溶　解　度　：不溶於水及乙醇，可溶於乙醚、碳氫化合物及含鹵素之碳氫化合物。
5. 聚　甘　油　：聚合甘油中，甘油聚合度為 2、3、4 之聚合甘油含量應高

於 70 %，且甘油聚合度為 7 以上（包含 7）之聚合甘油含量應不得超過 10 %。

6. 鉛：2 mg/kg 以下。

7. 分類：食品添加物第（十六）類。

8. 用途：乳化劑。