第（十二）類 粘稠劑（糊料）

§ 12051


刺槐豆膠
Carob Bean Gum

別　　名　Locust Bean Gum、INS No. 410

定　　義　：為豆科植物刺槐豆 *Ceratonia siliqua (L.) Taub.(Fam. Leguminosae)*之磨碎種子胚乳，為一高分子量聚半乳甘露醣(分子量約 50,000-3,000,000)，甘露糖與半乳糖比例約為 4:1。刺槐豆之種子核仁經稀硫酸、加熱及機械處理後脫殼，去除胚芽後，胚乳經粉碎及篩分可得天然刺槐豆膠，亦有可能經乙醇及異丙醇清洗以控制微生物數量。

C.A.S.編號　9000-40-2

結構式



外觀特性鑑別　白色到淺黃色，幾近無臭之粉末。

溶解度　不溶於乙醇。

凝膠試驗　本品懸浮液中加少量硼酸鈉試液，應產生凝膠。

黏度試驗　取本品 2 g 置於 400 mL 燒杯中，加異丙醇約 4 mL 潤濕本品，加水 200 mL，經劇烈攪拌直至完全且均勻分散。取本品分散液 100 mL 至 400 mL 燒杯中，於沸水浴中加熱約 10 分鐘後冷卻至室溫，經加熱冷卻後之分散液黏度顯著上升。

組成成分　應存在半乳糖及甘露糖。

鏡檢試驗　於載玻片上滴加含 0.5%碘及 1%碘化鉀之混合溶

液數滴，置入少量本品，於顯微鏡下檢視，本品應含有分散長管細胞狀顆粒，其為褐色內容物應顯著少於關華豆膠。

純　　度

乾燥減重	14%以下(105℃，5 小時)。
灰分	1.2%以下(800℃，3-4 小時)。
酸不溶物	4.0%以下。
蛋白質	7.0%以下。
澱粉	本品分散液(1→10)加入幾滴碘試液，不生成藍色。
溶劑殘留	單獨或混合使用乙醇或異丙醇，其總殘留量應在1%以下。
鉛	2 mg/kg 以下。

分　　類：食品添加物第(十二)類；
食品添加物第(十六)類。

用　　途：粘稠劑(糊料)；乳化劑。