§ 08041

檸檬酸亞鐵鈉
（琥珀酸檸檬酸鐵鈉）
Sodium Ferrous Citrate
（Iron and Sodium Succinate Citrate）

1. 含　　量：本品應含鐵 10.0～11.0 ％。
2. 外觀及性狀：本品呈白綠色～黃綠色粉末，無臭，具弱鐵味。
3. 鑑　　別：（1）取本品水溶液（本品 1 g 溶於水 100 g）5 mL，加入稀鹽酸（本品 1 g 溶於水 3 g）1 mL 和新配製的鐵氰化鉀溶液（本品 1 g 溶於水 10 g）0.5 mL，會有藍色產生。

（2）取本品水溶液（本品 1 g 溶於水 100 g）5 mL，加入氨水 2 mL，會有紅棕色產生，但不產生沉澱。

（3）取本品 3 g，在 500～600 ℃燃燒 3 小時，其殘渣鈉離子試驗呈陽性反應。

（4）取本品 0.5 g，加入水 5 mL 和氫氧化鉀水溶液（本品 1 g 溶於水 25 g）10 mL，於水浴中加熱 10 分鐘，並時時攪拌均勻。而後冷卻、過濾，取一部分的濾液，以稀醋酸（本品 1 mL 加水 1 mL）中和後加入過量的氯化鈣溶液（本品 3 g 溶於水 40 g），經煮沸後會有白色結晶性沉澱生成。收集沉澱物，取一部分加入氫氧化鈉試液（本品 1 g 溶於水 25 g），沉澱並不會溶解。另取一部份沉澱物加入稀鹽酸（本品 1 mL 加水 3 mL），則沉澱溶解。

4. 三 價 鐵 鹽：本品 2.0 g 置玻璃栓三角瓶中，以鹽酸 5 mL 及水 30 mL 溶解，再加入碘化鉀 4 g，並加栓塞放置於暗處 1 分鐘，次加澱粉試液 2 mL 充分振盪混合時，雖有呈色，但若再加 0.1 N 的硫代硫酸鈉溶液 1 mL，則顏色應立即消失。
5. 酒 石 酸 鹽：本品 1.0 g 加水 5 mL 及氫氧化鉀試液（本品 1 g 加水至 15 mL）10 mL，於水浴中充分攪拌加熱 10 分鐘，冷卻後過濾，

取濾液 5 mL 以稀醋酸（本品 1 mL 加水至 4 mL）使成弱酸性，再加醋酸 2 mL，放置 24 小時後，不得生成白色結晶性沉澱。

6. 硫　酸　鹽　：0.48 %以下（以 SO_4 計）。
7. 　　砷　　：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
8. 重　金　屬　：20 ppm 以下（以 Pb 計）
9. 分　　類　：食品添加物第（八）類。
10. 用　　途　：營養添加劑。