§ 03007

異抗壞血酸

Erythorbic Acid

分子式：$C_6H_8O_6$　　分子量：176.13

1. 含　　量　：99.0 %以上。
2. 外觀及性狀　：白色或帶黃色之白色結晶或結晶性粉末，無臭，具酸味，可溶於水及酒精，微溶於甘油。
3. 鑑　　別　：（1）本品 0.1 g 溶於偏磷酸溶液（偏磷酸 1 g 溶於水 50 mL）100 mL，取此溶液 5 mL，逐滴加入碘試液至產生微黃色，再加入硫酸銅溶液（硫酸銅 1 g 溶於水 1000 mL）及吡咯（pyrrole）各 1 滴，以 50～60 ℃水浴加熱 5 分鐘，應呈藍或藍綠色。
   （2）本品水溶液（本品 1 g 溶於水 100 mL）10 mL，加入高錳酸鉀溶液（高錳酸鉀 1 g 溶於水 300mL）1 mL，溶液之粉紅色應立即消失。
4. 熔 融 溫 度　：166～172 ℃。
5. 比 旋 光 度　：〔α〕$^{20}_{D}$＝－16.2°～－18.2°（精確秤取本品約 1 g 溶於新煮沸冷卻之水使成 10 mL）。
6. 砷　　：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
7. 重 金 屬　：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
8. 乾 燥 減 重　：0.40 %以下（矽膠減壓乾燥器，3 小時）。
9. 熾 灼 殘 渣　：0.30 %以下。
10. 分　　類　：食品添加物第（三）類。
11. 用　　途　：抗氧化劑。