§ 03015

混合濃縮生育醇

Tocopherols Concentrate, Mixed

1. 性　　狀：混合濃縮生育醇概分兩類：高阿爾發類（high–α type）與低阿爾發類（low–α type）。皆由食用植物油製品以減壓蒸氣蒸餾法（Vacuum steam distllation）製得，且均含一定最低限量之總生育醇，唯其 d–生育醇（d–tocopherols）之含量則各異。高阿爾發類者含相對較高量之 d–α–生育醇，因此可視為是一種維生素 E（Vitamine E），同時亦是一種抗氧化劑；低阿爾發類者則含相對較高量之 d–β–，d–γ–與 d–δ–生育醇，而 d–α–生育醇之含量則較少，因此不被視為是一種維生素 E，而僅被視為是一種抗氧化劑。上述二類為調整所需之總生育醇含量，可加入一種食用植物油，且各型（forms）生育醇可經由適當之物理或化學方法加以調整。本品外觀呈棕紅～紅色，透明而具黏性之油狀物，帶溫和之特異臭及味。本品可能呈現微結晶型臘狀成份之輕微分離現象；在空氣中及曝於光線下，會慢慢氧化而變暗色，於鹼性介質中尤然。本品不溶於水，可溶於酒精；與丙酮、氯仿、乙醚及植物油可互相混合。

2. 鑑　　別：甲、取本品約 50 mg 溶於 10 mL 之無水酒精中，然後一邊旋拌，一邊加入 2 mL 之硝酸，並於 75 ℃下加熱 15 分鐘，則此溶液展現出鮮紅～橙色。

乙、高阿爾發類：分析調製品（assay preparation）層析譜之主峯（溶媒峯除外）滯留時間與標準調製品（standard preparation）一致，且均與分析時之內部標準品（internal standard）峯成比例。低阿爾發類：分析調製品層析譜之第三主峯（在內部標準品峯正前出現之波峯）滯留時間與標準製品一致，且均與分析時之內部標準品峯成比例。

3. 含　　量：高阿爾發類者：總生育醇含量不得低於 50.0 %，且其中 d–α–生育醇（$C_{29}H_{50}O_2$）不得低於總生育醇量之 50.0 %，而 d–β–，d–γ–（$C_{28}H_{48}O_2$）與 d–δ–生育醇（$C_{27}H_{46}O_2$）量之總和不得低於總生育醇量之 20.0 %；低阿爾發類者：總生育醇含量不得低於 50.0 %，且其中 d–β–，d–γ–與 d–δ–生育醇之總合不得低於總生育醇量之 80.0%。

4. 酸　　度：適。

5. 鉛　　：10 ppm 以下。

6. 重 金 屬：0.004 %以下（以 Pb 計）。

7. 比旋光度：〔α〕$^{25}_{D}$：高阿爾發類者不得低於＋24°；低阿爾發類者不得低於＋20°。

8. 分　　類：高阿爾發類者：食品添加物第（三）類；第（八）類。
低阿爾發類者：食品添加物第（三）類。

9. 用　　途：高阿爾發類者：抗氧化劑；營養添加劑。
低阿爾發類者：抗氧化劑。