§ 09021

銅葉綠素

Copper Chlorophyll

1. 外　　觀　：暗綠色塊、片、粉末或黏稠液，具特異臭。
2. 比吸光度　：本品約 10 mg 精確稱定後，溶於乙醚 50 mL，加氫氧化鈉，甲醇溶液（1→100）2 mL 振盪混合後，加迴流冷凝器於水浴上加熱 30 分鐘，冷後每次以水 10 mL 萃取三次，萃取液加磷酸緩衝液（pH 7.5）使成 200 mL，於波長 405 nm 測定吸光度時，其 $E_{1\,cm}^{1\,\%}$應為 62 以上。
3. 　　砷　　：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
4. 鹽基性煤焦色素　：本品乙醚溶液（1→200）5 mL，加醋酸 1 mL 及水 5 mL 振盪混合，以水濕潤之濾紙過濾，令乙醚層留存於濾紙上時，其濾液應無色。
5. 酸性煤焦色素，無機鐵鹽及銅鹽　：準用「銅葉綠素鈉」之「酸性煤焦色素」及「無機鐵鹽及銅鹽」項之試驗法，但以本品丙酮溶液（1→300）約 0.01 mL 供試。
6. 乾燥減重　：1.5 %以下（105 ℃，2 小時）。
7. 熾灼殘渣　：2.2 %以下（105 ℃乾燥 2 小時後測定）。
8. 分　　類　：食品添加物第（九）類。
9. 用　　途　：著色劑。