§ 07021

硬脂酸鎂

Magnesium Stearate

別　　名：Magnesium distearate, dibasic magnesium stearate, INS No. 470(iii)

定　　義：本品係來自食用油脂中獲得之脂肪酸鎂鹽混合物。本品主要由不同比例的硬脂酸鎂和棕櫚酸鎂組成。本品透過以下 2 種方法之一製備：a) 直接方法，利用脂肪酸直接與鎂源反應，如氧化鎂，反應形成脂肪酸之鎂鹽；b) 間接方法，利用脂肪酸與氫氧化鈉於水中反應產生鈉皂，並加入鎂鹽後取得沉澱物。

化學名稱　　：Magnesium stearate, magnesium octadecanoate, fatty acids C_{16}-C_{18} magnesium salts

C.A.S.編號　　：557-04-0 (magnesium stearate)
91031-63-9 (fatty acids C_{16}-$_{18}$ magnesium salts)

化學式　　：$Mg(C_{18}H_{35}O_2)_2$ (magnesium distearate)

分子量　　：591.27 (magnesium distearate)

含量　　：鎂：4.0%以上，5.0%以下 (以乾基計)。
脂肪酸：就脂肪酸部分，硬脂酸 40.0%以上，總硬脂酸及棕櫚酸 90.0%以上。

外　　觀：灰白色至白色，極精細之粉末；觸感油膩

特　　性

鑑　　別

溶　解　度：幾乎不溶於水

鎂　　：陽性

脂肪酸組成　　：個別脂肪酸符合定義所述之規格

純　　度

乾 燥 減 重：6%以下 (105℃，1 g 乾燥至恆重)

酸 度 或 鹼 度：通過試驗

不 皂 化 物：2%以下

鎘　　：1 mg/kg 以下。

鉛　　：2 mg/kg 以下。

鎳　　：3 mg/kg 以下。

分　　類：食品添加物第（七）類。

用　　途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。