§ 17015

皂樹皮萃取物
Quillaia Extracts

別　　名：Quillaja extract, Soapbark extract, Quillay bark extract, Bois de Panama, Panama bark extract, Quillai extract; INS No. 999

定　　義：本品係由 *Quillaja saponaria* Molina (*Rosaceae* 屬) 磨碎內層樹皮或木材 (包括莖與枝) 之水抽出物而製得 (Type 1) 或以色層分離或水相超過濾萃取 (Type 2)。本品含有由 quillaic acid 的配醣體所組成之數種類三萜稀皂素 (triterpenoid saponins, QS)。其他成分以多酚類及單寧為主，與少量糖類與草酸鈣。商業化產品有液態或噴霧乾燥粉末型態；噴霧乾燥粉末者可能使用乳糖、麥芽糖醇或麥芽糖糊精作為載體；液態產品可能使用苯甲酸鈉或乙醇保藏。

C.A.S.編號　：68990-67-0

分子量　　：皂素單體約 1800 至 2300，與具有 8 ~ 10 個單醣單元之三萜類一致

含量　　：皂素含量
Type 1：20%~26%，以乾基計
Type 2：65%~90%，以乾基計

外　　觀：Type 1：紅褐色液體或淺棕色粉末，帶有粉紅色調
Type 2：淺紅棕色液體或粉末

特　　性

鑑　　別

溶　解　度：極易溶於水，不溶於乙醇、丙酮、甲醇及丁醇

起　泡　性：取本品粉末型態 0.5 g 溶於水 9.5 g 或本品液體型態 1 mL 溶於水 9 mL。取本品水溶液 1 mL 置於裝有水 350 mL 之 1000 mL 量筒中，覆蓋量筒，劇烈搖晃 30 次，然後靜置。30 分鐘後記錄起泡液位 (mL)，其基準

值：
Type 1：150 mL。
Type 2：260 mL。

色層分析：本品主要波峰之滯留時間應與標準品中主要皂素波峰(QS-18)之滯留時間相符。

顏色及濁度：粉末型態測定：取本品 0.5 g 溶解於水 9.5 g。水溶液不應呈混濁。水溶液以水為對照，於波長 520 nm 測定吸光度，其吸光度：
Type 1：1.2 以下。
Type 2：0.7 以下。

純度

水分：6%以下 (粉末型態，Karl Fischer 法)

乾燥減重：液體型態 2 g，105℃，5 小時：
Type 1：50 ~ 80%
Type 2：50 ~ 90%

pH：3.7 ~ 5.5 (4%水溶液)

灰分：Type 1：14%以下
Type 2：5%以下
以乾基計，粉末型態取 1.0 g 測定，液態者則以乾燥減重之殘渣測定

單寧：8%以下 (以乾基計)

鉛：2 mg/kg 以下

分類：食品添加物第（十七）類。

用途：其他。