§ 12003

乾酪素

Casein

1. 含　　量：本品應含氮 14.7～16.0 ％（110 ℃乾燥 3 小時後定量）。
2. 外　　觀：白～淡黃白色，粒或粉末，無臭，無味，或略具特異芳香。
3. 溶　　狀：本品於減壓硫酸乾燥器乾燥 4 小時後，磨成微細粉末，取其 0.1 g 加水 30 mL 振盪混合，放置 10 分鐘後，加 0.1 N 氫氧化鈉液 2 mL，一面於 60 ˚C 加熱 1 小時，一面振盪混合使之溶解，冷後加水使成 100 mL 時，其溶液應無色且濁度應在「微濁」以下。
4. 液　　性：本品 1.5 g 加水 30 mL，振盪混合 10 分鐘後過濾，濾液之 pH 值應為 3.7～6.5。
5. 水可溶物：1 ％以下。
6. 脂　　肪：1.5 ％以下。
7. 砷　　：1 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
8. 重金屬：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
9. 乾燥減重：12 ％以下（100 ℃，3 小時）。
10. 熾灼殘渣：2.5 ％以下（100 ℃乾燥 3 小時後測定）。
11. 分　　類：食品添加物第（十二）類。
12. 用　　途：黏稠劑（糊料）。