§ 11017

乳酸
Lactic Acid

別　　名　INS No. 270

定　　義　乳酸係以糖類發酵或化學合成方法製成，包括: 乳酸、乳酸鹽和乳酸交酯。常見市售產品有 50-90%的溶液。固態產品含有約 100-125%可滴定乳酸。（備註：乳酸為易吸濕特性，經煮沸或蒸餾濃縮時會產生縮合產物，該縮合產物以水稀釋、加熱時會水解產生乳酸）。

化學名稱　Lactic acid,
2-hydroxypropanoic acid,
2-hydroxypropionic acid

C.A.S.編號　50-21-5
(L-: 79-33-4;
D-: 10326-41-7;
DL-: 598-82-3)

分子式　$C_3H_6O_3$

分子量　90.08

含量　標示含量之 95.0%-105.0 %（以 $C_3H_6O_3$ 濃度計）

外　　觀　無色糖漿狀液或白色至淡黃色固體或粉末。

特　　性

鑑　　別

溶解度　液態：可溶於水與乙醇
固體：略溶於水，可溶於丙酮

酸試驗　10%乳酸溶液，於石蕊試紙上呈酸性反應。

乳酸鹽試驗　通過測試。

純　　度

硫酸化灰分　0.1% 以下。

氯化物　0.2% 以下(以 Cl 計)。

硫酸鹽	0.25% 以下(以 SO_4 計)。
鐵	10 mg/kg 以下。
氰化物	通過試驗(約 1 mg/kg 以下)。
檸檬酸、草酸、酒石酸、磷酸	本品 1 g(由標示濃度計算之乳酸量)溶於水 10 mL，加氫氧化鈣試液 40 mL，煮沸 2 分鐘時，不得混濁。
糖	取本品 40%溶液(由標示濃度計算之乳酸濃度，若標示濃度低於 40%則毋需稀釋) 5 滴加入熱的鹼性酒石酸銅試液 10 mL 中，不得有紅色沉澱產生。
易碳化物	取儲存於 15 ℃之本品 40%溶液(由標示濃度計算之乳酸濃度，若標示濃度低於 40%則毋需稀釋) 5 mL 小心覆蓋於 5 mL 儲存於 15 ℃之硫酸試液之上，於 15 分鐘內兩溶液界面處不得呈暗灰色。
鉛	2 mg/kg 以下。
分類	食品添加物第（十一）類。
用途	調味劑。